

Information om Synalar® 0,025 % med chionoform, creme

Fluocinolonacetomid 0,25 mg/g + clioquinol 30 mg/g

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis De har spørgsmål til behandlingen.
- Lægen har ordineret Synalar med chionoform til Dem personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Synalar med chionoform.
3. Sådan skal De bruge Synalar med chionoform.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

- Synalar med chionoform indeholder et stærkt binyrebarkhormon (kortikosteroid), der dæmper hævelse og irritation. Synalar indeholder desuden chionoform, der virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe.
- De kan bruge Synalar til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis, når huden også er betændt.
- Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Synalar med chionoform

Brug ikke Synalar med chionoform hvis:

- De er overfølsom over for fluocinolonacetomid, clioquinol, iod eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Synalar med chionoform creme.
- De ikke har udslæt, eksem eller psoriasis, selvom der er betændelse i huden.

Brug ikke Synalar mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Betændelse med røde knopper omkring mund og næse (perioral dermatit).
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelses-sår, skoldkopper eller helvedesild).
- Hudsygdomme hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler

- De bør ikke bruge Synalar længere end aftalt med lægen. Dette gælder især hos børn.
- De bør undgå længerevarende brug på store hudområder og på den sarte hud i ansigt, armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Børn bør ikke bruge lufttæt forbindelse på det behandlede område.

- De må ikke pludselig stoppe med at bruge Synalar, da det kan forværre deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Hvis De undtagelsesvis bruger Synalar i ansigtet, skal De undgå at få det i øjnene eller at smøre det rundt om øjnene.

Kontakt lægen hvis:

- De har været i behandling i 4 uger, da De ikke bør fortsætte behandlingen uden at lægen igen har set på Deres hudsygdom.
- De får irritation eller øget følsomhed af huden.
- Der kommer betændelse i huden.
- Barnet får fedme af kroppen, kuglerundt, rødt ansigt, striber på huden, især på maven.
- Barnet ikke vokser eller tager normalt på i vægt.
- Barnet får vedvarende hovedpine.

Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Synalar i lang tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Synalar, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Synalar.

Det er vigtigt, at De kun bruger Synalar til den hudsygdom, som lægen har ordineret den til. Synalar med chionoform må kun bruges af én person.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Synalar med chionoform

- Indeholder cetyl- og stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
- Indeholder propylenglycol, som kan give irritation af huden.
- Indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat, som kan give allergi. Allergien kan komme efter behandlingen.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Synalar med chionoform efter lægens anvisning.

Amning:

De kan bruge Synalar med chionoform i kort tid, selvom De ammer. Spørg lægen. De må ikke bruge Synalar med chionoform på brystet. Synalar med chionoform bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Synalar med chionoform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Synalar med chionoform sammen med anden medicin.

3. Sådan skal De bruge Synalar med chionoform

Dosering

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1–3 gange daglig. Gnid cremen forsigtigt, men grundigt ind i huden. Dæk herefter området med en forbindelse, da Synalar med chionoform kan give pletter på tøjet. Hvis De skal bruge en forbindelse, er det særlig vigtigt, at De renser huden omhyggeligt før påsmøring af cremen. Kassér cremen når behandlingen er overstået. Børn: De må kun bruge Synalar med chionoform til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De brugt for meget Synalar med chionoform?

Ved overdreven eller langvarig brug kan De få fedme, kuglerundt, rødt ansigt, træthed, væggtab, farveforandringer i huden. Kontakt Deres læge.

Har De glemt at bruge Synalar med chionoform?

Hvis De har glemt en dosis, påsmør den, så snart De kommer i tanke om det.

4. Bivirkninger

Synalar med chionoform kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis De bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger:

• Hyppighed ikke kendt:

- Alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt, rødt ansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

- **Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):
 - Tynd hud, som let går i stykker, Udvidelse af de små blodkar i huden, på huden (strækmærker).
- **Hyppighed ikke kendt:**
 - Ny betændelse på det behandlede område, sløring og forværring af betændelse i huden, mindre blødninger i huden, betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea), hvide eller brune pletter på huden (pigmentforandringer), sløring og udvikling af kontakteksem, bumser.

- Der kan desuden komme brændende fornemmelse i huden, kløe, lokal irritation, tørhed, betændelse i hårrødderne, uønsket hårvækst, betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), laset og opblødt hud, udslet med små blærer, forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

- Opbevar Synalar med chionoform med chionoform utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Synalar med chionoform efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Afllever altid medicinrester på apoteket.

Synalar 0,025% med chionoform, creme indeholder:

- De aktive stoffer i Synalar med chionoform er fluocinolonacetonid og clioquinol.
- Desuden indeholder Synalar med chionoform hjælpestofferne: propylenglycol, sorbitanstearat, polysorbat, cetostearylalkohol, paraffinolie, dinatriumedetat, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), vandfri citronsyre og rensat vand.

Produktets udseende

- Synalar med chionoform er en off-white til brungul creme.
- Synalar med chionoform fås i en aluminiumstube.

Pakningsstørrelser:

15 g (aluminiumtub).

Markedsføring i Danmark:

Bioglan Pharma AB
Box 50577
202 15 Malmö
Sverige

Fremstiller:

Bioglan AB
Box 50310
20213 Malmö
Sverige

Revideret november 2006