

Asasantin® Retard 200 mg/25 mg depotkapsler, hårde

Dipyridamol/Acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Asasantin® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Asasantin® Retard
3. Sådan skal du tage Asasantin® Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Asasantin® Retard hører til gruppen af medicin som forebygger blodpropper. Asasantin® Retard virker ved at hæmme blodpladernes sammenklumpningsevne. Du kan tage Asasantin® Retard til forebyggelse af blodpropper, hvis du tidligere har haft blodprop i hjernen.

Lægen kan have givet dig Asasantin® Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ASASANTIN® RETARD**Tag ikke Asasantin® Retard**

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for acetylsalicylsyre, dipyridamol, andre salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du har et aktivt mavesår.
- Hvis du har en lidelse som giver øget risiko for blødning.
- Hvis du er gravid i 3. trimester.
- Hvis du har en sjælden arvelig tilstand hvor du ikke tåler saccharose eller lactose.
- Hvis du er et barn eller er ung med febersygdomme eller virusinfektioner.

Vær ekstra forsigtig med at tage Asasantin® Retard

Tal med lægen, inden du tager Asasantin® Retard, hvis du

- Har en alvorlig hjertesygdom (f. eks. ustabil angina pectoris eller nylig blodprop i hjertet).
- Har en forsnævring af hjerteklapperne, lige før hovedpulsåren (aorta).
- Har øget risiko for blødning enten pga. en lidelse eller pga. medicinsk behandling.
- Har en kredsløbsforstyrrelse (fx ubehandlet hjertesvigt).
- Har myastenia gravis.
- Har astma eller andre øvre luftvejslidelser.
- Har kronisk eller hyppigt tilbagevendende mavegener.
- Har nedsat nyre- eller leverfunktion.
- Lider af glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
- Er overfølsom over for visse lægemidler med smertestillende og betændelseshæmmende effekt som non-steroid anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Asasantin® Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Der er en risiko for dannelse af galdesten hos ældre patienter, som har været i dipyridamol behandling i flere år.

Hovedpine og migræneagtig hovedpine, der kan optræde specielt ved start af behandling med Asasantin® Retard, bør ikke behandles med acetylsalicylsyre.

Hvis du skal have foretaget en stresstest af dit hjerte med dipyridamol, skal du oplyse dette til det hospital, hvor du skal have foretaget testen. Det kan være nødvendigt at holde pause med Asasantin® Retard inden testen foretages for ikke at få et forkert resultat.

Tal med den læge, som skal foretage testen af dit hjerte inden du møder på hospitalet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- Smertestillende medicin, der indeholder ibuprofen eller acetylsalicylsyre.
- Medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (adenosin).
- Visse typer af medicin mod myasthenia gravis.
- Blodfortyndende medicin (coumarinderivater og heparin).
- Midler, der påvirker blodpladernes sammenklumpning (clopidogrel eller ticlopidin).
- Visse midler mod epilepsi (valproat og fenytoin).
- Visse midler mod urinsyreghigt (f. eks. probenecid).
- Visse vanddrivende lægemidler (indeholdende spironolacton).
- Midler mod forhøjet blodtryk.
- Lægemidler mod sukkersyge.
- Produkter der indeholder methotrexat.
- Visse lægemidler med smertestillende og betændelseshæmmende effekt som non-steroid anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-produkter).
- Kortikosteroider (binyrebarkhormon).
- Alkohol (kun ved kronisk misbrug).
- Midler mod depression (SSRI'er).
- Medicin mod astma (teofyllin og xantiner).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Asasantin® Retard, eller Asasantin® Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Asasantin® Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Asasantin® Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Asasantin® Retard. Tal med lægen. Hvis du er i de sidste tre måneder af graviditeten, må du ikke tage Asasantin® Retard.

Amning

Du må ikke tage Asasantin® Retard, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Asasantin® Retard kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Asasantin® Retard

Asasantin® Retard indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ASASANTIN® RETARD

Tag altid Asasantin® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er**Voksne**

Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel 2 gange daglig, sædvanligvis 1 morgen og 1 aften med et måltid eller alene. Depotkapslerne skal synkes hele.

Tal med lægen, hvis du får utålelig hovedpine i starten af behandlingen.

Børn

Børn må normalt ikke få Asasantin® Retard depotkapsler.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Asasantin® Retard bør ikke anvendes til patienter med alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion.

Hvis du har taget for mange Asasantin® Retard hårde depotkapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Asasantin® Retard, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer for dipyridamol overdosering er:

- Varmefornemmelse, rødme, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine.
- Forhøjet puls og fald i blodtryk kan også forekomme.
- Hurtigt åndedræt (takypnø), smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris), bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle (respirationsdepression), mavebesvær og forlænget blødningstid.

Tegn og symptomer på mild, akut overdosering med acetylsalicylsyre er hyperventilation, susen for ørerne (tinnitus), kvalme, opkastning, nedsat syn og hørelse, svimmelhed og forvirring. Svimmelhed og tinnitus kan, særligt hos ældre patienter, være symptomer på overdosering.

Hvis du har glemt at tage Asasantin® Retard

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Asasantin® Retard

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Asasantin® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er mavesmerter, diaré og hovedpine (for nogle personer migræneagtig hovedpine). Disse bivirkninger forsvinder i de fleste tilfælde ved fortsat brug.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Forværring af koronar arterie sygdom (giver symptomer som åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet.) Ring 112.
- Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112.
- Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Blødninger i øjet.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Sårfuldt irritation af mavesækkens slimhinde (med blødning).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Øget blødning under eller efter operation.
- Øget blødningstid.
- Blødning i huden.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Hovedpine, svimmelhed.
- Sure opstød, diaré, kvalme, mavesmerter.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Overfølsomhedsreaktioner som udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Blegthed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Næseblod.
- Migræne, opkastning, muskelsmerter.
- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtigt og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hedestigninger.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Jernmangel.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Blodansamling. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blødninger i huden, blå mærker.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar Asasantin® Retard i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt.

Tag ikke Asasantin® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Asasantin® Retard 200 mg/25 mg hårde depotkapsler indeholder:

Aktive stoffer: Dipyridamol 200 mg og acetylsalicylsyre 25 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, povidon, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2), talcum, acetone, akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, triacetin, dimeticon, stearinsyre, lactose, aluminiumstearat, kolloid vandfri silica, majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose, saccharose, titandioxid (E 171). Kapsler: Gelatine, titandioxid (E 171), rød og gul jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

En rødbrun og lysegul kapsel printet med "Boehringer Ingelheim"-logo og "01A" med rødbrun farve på den lysegule del af kapslen. Ligger i en hvid plastbeholder med låg, der er forsynet med tørremiddel.

Pakningsstørrelse

Asasantin® Retard fås i en pakningsstørrelse á 60 hårde depotkapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Asasantin® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2011