

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Aspirin® 500 mg, tabletter

Acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Aspirin uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Aspirin.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De ikke inden 7 dage får det bedre, eller De får det værre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Aspirins virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Aspirin
3. Sådan skal De tage Aspirin
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Aspirin
6. Yderligere oplysninger

1. ASPIRINS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Aspirin er et middel mod smerter.

Aspirin dæmper betændelseslignende symptomer fra muskler, led eller bindevæv.

De kan tage Aspirin

- Mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter og tandpine.
- Mod gigtsygdomme.
- For at nedsætte feber.

Lægen kan have givet Dem Aspirin til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE ASPIRIN

Tag ikke Aspirin hvis De:

- er overfølsom over for acetylsalicylsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smertestillende lægemidler mod f.eks. hovedpine og gigtsmerter (f.eks. ibuprofen, diclofenac eller anden medicin med acetylsalicylsyre).
- har blødende mavesår (blodige opkastninger og/eller sort afføring).
- har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader.
- har meget dårligt hjerte.
- har dårlig lever.
- har dårlige nyrer.
- er gravid i 7. - 9. måned.

Børn under 15 år med feber må ikke få Aspirin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Aspirin

Tal med lægen inden De tager Aspirin, hvis De:

- har astma eller allergiske lidelser.
- har tendens til smerter og ubehag fra maven eller tarmen f.eks. mavesår.
- har nedsat lever- eller nyrefunktion.
- tager anden medicin mod smerter (f.eks. ibuprofen, diclofenac eller anden medicin med acetylsalicylsyre).
- tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol).
- skal vaccineres mod skoldkopper.

Vær opmærksom på følgende



Advarsel

Hvis De tager en større dosis, end der er angivet i denne information eller lægen har angivet, kan De få en livsfarlig forgiftning. Hvis De mener, De har taget for mange Aspirin, skal De straks søge læge.

Hvis De er over 65 år skal De undgå langvarig brug af Aspirin på grund af risiko for blødning i mave eller tarm. Tal med lægen.

De må ikke tage Aspirin i dagene før en operation. Tal med lægen.

Hvis De tager Aspirin mod hovedpine i længere tid, kan Deres hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt Deres læge, hvis De får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Aspirin. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med Deres læge, hvis De bruger medicin mod

- for meget mavesyre (aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid).
- sukkersyge (f.eks. metformin, glimepirid og glibenclamid).
- for højt blodtryk (enalapril, ramipril, perindopril, amlodipin, felodipin og diltiazem).
- dårligt hjerte (quinidin, metoprolol, atenolol og propanolol).
- smerter (f.eks. ibuprofen, diclofenac eller anden medicin med acetylsalicylsyre).
- urinsur gigt (probenecid).
- visse former for gigt og kræft (methotrexat).
- grøn stær (acetazolamid).

- epilepsi (valproat og acetazolamid).
- depression (SSRI).
- gigtt og bindevævssygdomme (prednisolon og methylprednisolon).

Samt

- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon og clopidogrel).
- vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton).
- naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder Ginkgo Biloba.
- hvis De skal vaccineres mod skoldkopper.

Brug af Aspirin sammen med mad og drikke

De kan tage Aspirin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må ikke tage Aspirin i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.

De må kun tage Aspirin i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Kvinder der ønsker at blive gravide:

Hvis De ønsker at blive gravid, skal De enten holde op med at tage Aspirin eller kun tage Aspirin i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.

Aspirin kan gøre det sværere at blive gravid. Spørg lægen om der er en anden behandling.

Amning

Aspirin går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade Deres barn. Tal med lægen, hvis De har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aspirin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE ASPIRIN

Hvis Deres læge har ordineret Aspirin til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

De skal synke Aspirin tabletterne hele med et glas vand eller opløse dem i en smule vand og skylle efter med vand.

Den sædvanlige dosis er

Smerter eller feber

Voksne: 1 - 2 tabletter på 500 mg højst 4 gange daglig.

Børn over 2 år: Dosis afhænger af barnets vægt. Børn må få 50 mg/kg i døgnet fordelt på 2 - 3 doser. Børn må højst få Aspirin i 2 døgn.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 1 tablet på 500 mg 3 gange i døgnet i højst 2 døgn.

Gigtsygdomme

Voksne: 6 – 8 tabletter på 500 mg (3000 – 4000 mg) fordelt på 2 – 3 doser.

Børn over 2 år: Dosis afhænger af barnets vægt. Børn må få 50 - 100 mg/kg i døgnet.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 3 – 6 tabletter på 500 mg (1.500 – 3.000 mg) i døgnet.

De må kun bruge Aspirin til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Børn under 15 år med feber må ikke få Aspirin.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

Hvis De har taget for mange Aspirin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis De har taget flere Aspirin, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være svimmelhed, susen for ørerne, døvhed, lavt blodtryk, svedudbrud, kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning, feber, rastløshed, forstyrrelse af kroppens syre-base balance (påvirket vejrtrækning, lavt blodtryk, kvalme, opkastning).

Svær forgiftning kan medføre koma, kollaps, svigtende vejrtrækning og eventuelt nyresvigt.

Hvis De har glemt at tage Aspirin

De må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Aspirin

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Aspirin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som De eller Deres pårørende øjeblikkeligt skal reagere på.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodmangel med træthed og bleghed på grund af blødning fra mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.
- Leverbetændelse med gulsot og hudkløe. Kontakt straks læge.
- Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i omkring munden ledsaget af feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Feber, opkastninger, sløret bevidsthed hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Øvrige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

- Blodet er længere tid om at størkne.
- Mavesmerter, halsbrand, sure opstød.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Kvalme, irritation, smerter eller ubehag fra den øvre del af maven. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
- Tendens til blødninger fra hud og slimhinder
- Hovedpine, søvnløshed
- Opkastning, forstoppelse, diaré, nældefeber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Svimmelhed, sløvhed.
- Susen for ørerne (tinnitus), astma,
- Udslæt, svedtendens.
- Snue, næsetilstopning, træthed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
- Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres.
- Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed pga. lavt blodsukker. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Blodmangel med træthed og gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer ved medfødt G6PD mangel. Kan være alvorlig. Tal med lægen.
- Midlertidigt tab af hørelsen.
- Astma og åndenød.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan være alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge eller skadestue.
- Tyktarmsbetændelse, der kan vise sig ved diaré, samt slim og blødning fra endetarmen.
- Betændelse i munden og spiserøret.

Aspirin kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren, nyrerne og forandringer i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. SÅDAN OPBEVARER DE ASPIRIN

Opbevar Aspirin utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Aspirin ved over 30 °C.

Brug ikke Aspirin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke hælde medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aspirin 500 mg, tabletter indeholder

Aktivt stof: acetylsalicylsyre.

Øvrige indholdsstoffer: cellulose, majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Aspirin tabletter er runde og hvide tabletter præget med Bayer kors.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning med 10, 20 og 50 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer A/S

Nørgaardsvej 32

2800 Kgs. Lyngby

Fremstiller

Bayer Bitterfeld GmbH

D-06803 Greppin

Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2009