

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clozapin 2care4 25 mg og 100 mg tabletter

Clozapin

09-2012
P029844-6

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Clozapin 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin 2care4
- Sådan skal du tage Clozapin 2care4
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Clozapin 2care4 er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). Clozapin 2care4 virker ved at hæmme overførslen af nerveimpulser i hjernen. Du kan tage Clozapin 2care4:

- mod skizofreni, hvis anden medicin ikke virker, eller hvis du ikke kan tåle den på grund af bivirkninger.
- mod psykotiske symptomer ved Parkinsons sygdom, hvis anden behandling ikke virker.

Lægen kan have givet dig Clozapin 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLOZAPIN 2CARE4

Tag ikke Clozapin 2care4:

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for clozapin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se "Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clozapin 2care4").
- hvis du ikke kan få taget regelmæssige blodprøver.
- hvis du nogensinde har fået af vide, at du har et lavt antal hvide blodlegemer (fx leukopeni eller agranulocytose), særligt hvis medicin var årsag til det. Dette gælder dog ikke, hvis du har haft lavt antal hvide blodceller pga. kemoterapi.
- hvis du tidligere har taget clozapin, og antallet af hvide blodlegemer faldt under behandlingen.
- hvis du tager medicin, der kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer.
- hvis du bliver eller er blevet behandlet med langtidsvirkende depot-indsprøjtninger af antipsykotika.
- hvis din knoglemarv fungerer dårligt.
- hvis du har epilepsi, der ikke bliver behandlet.
- hvis du har tendens til tarmslyng på grund af forstoppelse og manglende tarmfunktion.
- hvis du er psykisk påvirket på grund af forgiftning, misbrug af alkohol, medicin, narkotika eller andre stoffer.
- hvis du har alvorlig sygdom i hjertet. Tal med lægen.
- hvis du har alvorlig sygdom i nyrerne.
- hvis du har kvalme, appetitløshed eller gulsot på grund af en leversygdom eller alvorligt nedsat leverfunktion evt. leversvigt.
- hvis du bliver dårligt evt. besvimer, fordi dit hjerte ikke pumper tilstrækkeligt, eller dit blodtryk falder pludseligt. Det kan skyldes hjertesygdom eller medicin.
- hvis du bliver bevidstløs, enten uden særlig grund eller på grund af sygdom, medicin, alkohol eller misbrug af anden art.
- hvis du har (paralytisk ileus) en speciel tarmlidelse, hvor den normale passage af mad gennem tarme stopper som følge af muskellammelser i tarmen.
- Hvis du samtidigt får langtidsvirkende indsprøjtninger med antipsykotika, såkaldte depotinjektioner.

Vær ekstra forsigtig med at tage Clozapin 2care4

Clozapin 2care4 må kun tages, hvis antallet af hvide blodlegemer er normalt, det er derfor meget vigtigt, at du inden den første behandling får foretaget:

- en blodprøve inden 10 dage før påbegyndelsen af behandlingen med Clozapin 2care4.
- en lægeundersøgelse.
- et EKG (hjertekardiogram), hvis din læge skønner det nødvendigt, samt at din sygehistorie noteres.

Clozapin 2care4 kan reducere antallet af de hvide blodlegemer. Der er derfor vigtigt, at du får foretaget:

- regelmæssige blodprøver. I løbet af de første 18 ugers behandling tages der en blodprøve hver uge og derefter mindst én gang om måneden.
- yderligere blodprøver er nødvendige i en periode på 4 uger efter fuldstændigt ophør af behandling med Clozapin 2care4.

Fortæl straks din læge, hvis du

- får tegn på forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden infektion (agranulocytose). Du skal hurtigtigt muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine symptomer er forbundet med din medicin.
- får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen over 38 °C, i særligt, hvis du samtidigt får stive muskler, svedtendens, øget spytafsondring, nedsat bevidsthed som kan føre til bevidstløshed (malignt neuroleptikasyndrom).
- får hurtige og uregelmæssige hjerteslag, selv når du hviler, hjertebanken, åndenød, smerter i brystkassen eller uforklaret træthed (myokarditis eller kardiomyopati).

Det er vigtigt, at du taler med lægen, hvis du

- har problemer med leveren, nyrerne eller hjertet.
- har vandladningsbesvær som følge af forstørret prostata.
- har grøn stær (glaukom).
- har epilepsi.
- har sukkersyge (diabetes).
- eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
- har haft en hjertesygdom, eller hvis nogen i familien har haft overledningsforstyrrelser i hjertet (kaldet "forlængelse af QT-intervallet").
- er i risiko for at få slagtilfælde, f.eks. hvis du har for højt blodtryk, hjerte-kar-problemer eller problemer med blodkarrene i hjernen.
- har haft sygdom i tyktarmen.
- er blevet opereret i maven.
- oplever kvalme, opkastning og/eller appetitløshed.
- har alvorlig forstoppelse eller tager medicin, der kan give kronisk forstoppelse f.eks. medicin mod sindslidelser eller depression.
- får blå mærker og blødningstendens pga. blodplade-mangel (trombocytopeni).

Du bør undgå at sidde eller ligge stille (holde dig i ro) over længere tid, da Clozapin 2care4 kan forøge risikoen for **akut blokering af blodkarrene** pga. blodpropsdannelser.

Clozapin 2care4 er forbundet med:

- forhøjet (nogle gange betydeligt) blodsukkerniveau, i meget sjældne tilfælde med forstyrrelser i syrebalancen (ketoacidose) eller bevidstløshed pga. forstyrrelser i væskebalancen (hyperosmolær koma).
- udvikling eller forværring af diabetes mellitus hos patienter med og uden forhøjet blodsukkerniveauer eller diabetes mellitus.
- at kunne sænke blodtrykket, især i begyndelsen af behandlingen. Dette kan give svimmelhed eller forårsage besvimelse. Det er derfor nødvendigt at overvåge blodtrykket i stående og liggende stilling i de første uger af behandlingen, hvis du lider af Parkinsons sygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tag ikke Clozapin 2care4 sammen med

- carbamazepin, der bruges til behandling af epilepsi.
- chloramphenicol, en særlig gruppe antibiotika, der kaldes sulfonamider, f.eks. co-trimoxazol.
- pyrazolon-analgetika, smertestillende medicin, f.eks. phenylbutazon.
- penicillamin, et lægemiddel til behandling af reumatisk ledbetændelse.
- cytotokiske lægemidler.
- langtidsvirkende depotinjektioner af antipsykotika.
- alkohol.

Tal med din læge, hvis du tager

- benzodiazepiner, en særlig gruppe af lægemidler med beroligende, søvnfremkaldende og/eller muskelafslappende egenskaber.
- visse lægemidler til behandling af allergier, kaldet antihistaminer.
- antikolinergika, en særlig gruppe af lægemidler, der modvirker aktiviteten i det parasympatiske nervesystem.
- blodtrykssænkende medicin.
- lægemidler der påvirker centralnervesystemet, f.eks. narkotika (bedøvelsesmidler, herunder stærke smertestillende midler som morfin).
- selektive serotoninenoptyagshæmmere, lægemidler, der bruges til behandling af f.eks. depression, som fluvoxamin, citalopram, fluoxetin, paroxetin og sertralin.
- visse lægemidler til behandling af svampeinfektioner (azolantimykotika som itraconazol eller ketoconazol).
- cimetidin eller omeprazol, lægemidler til behandling af maveproblemer.
- erythromycin og ciprofloxacin, antibiotika mod bakterieinfektioner.
- HIV-lægemidler kaldet proteasehæmmere.
- phenytoin, et lægemiddel, der bruges til behandling af epilepsi og visse hjertelidelser.
- rifampicin, et lægemiddel til behandling af tuberkulose.
- adrenalin og noradrenalin, lægemidler, der f.eks. bruges til at øge blodtrykket.
- valproinsyre, phenytoin til behandling af epilepsi.
- medicin mod Parkinsons sygdom.
- warfarin, et blodfortyndende middel.
- digoxin, et lægemiddel der bruges til behandling af hjerteproblemer.
- lithium, et lægemiddel til behandling af manio-depressive lidelser.
- MAO-hæmmere, lægemidler, der bruges til behandling af f.eks. depression.
- andre antipsykotika mod psykiske lidelser.
- vanddrivende lægemidler.
- koffein (fortæl lægen om dine kaffe-, te-, colavaner).

Brug af Clozapin 2care4 sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage Clozapin 2care4 med et glas vand. Du kan tage Clozapin 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du må ikke drikke alkohol mens du tager Clozapin 2care4, da det forstærker den sløvende virkning af medicinen.

Indtagelse af koffein (kaffe, te, cola) eller rygning kan påvirke effekten af Clozapin 2care4. Fortæl lægen, hvor meget koffein du indtager, og om du ryger. Du skal drøfte det med lægen, hvis du ændrer dine koffein og/eller rygevaner.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Clozapin 2care4, efter aftale med lægen. De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Clozapin 2care4 i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din læge. Hvis du er i den føde-dygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Clozapin 2care4. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Clozapin 2care4, da Clozapin 2care4 går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clozapin 2care4 kan give bivirkninger i form af svimmelhed, døsighed og nedsat krampetærskel der kan nedsætte din reaktionsevne. Du skal derfor undgå at køre bil eller betjene maskiner, især i de første uger af behandlingen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clozapin 2care4
Clozapin 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CLOZAPIN 2CARE4

Tag altid Clozapin 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Dosis er individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du skal tage tabletterne med et glas vand. Tabletterne har delekærv og kan enten deles eller synkes hele.

Den sædvanlige dosis er:
Ved behandlingsresistent skizofreni
Voksne

1. dag: 12,5 mg 1-2 gange dagligt, i alt 12,5 mg-25 mg.
2. dag: 25 mg 1-2 gange dagligt, i alt 25-50 mg.
Lægen kan langsomt øge din dosis med 25-50 mg ad gangen, til højst 300 mg dagligt eller mere til den ønskede virkning er opnået. Hvis det er nødvendigt, kan dagsdosis herefter yderligere øges med 50-100 mg ad gangen i intervaller på halve eller helst hele uger.
Når du har taget Clozapin 2care4 et stykke tid, og den ønskede virkning er opnået, vil lægen eventuelt sætte din dosis ned.

Ældre

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Clozapin 2care4 må normalt ikke bruges til børn og unge under 16 år.

Behandling af psykotiske symptomer ved Parkinsons sygdom
Voksne

Du skal begynde med at tage 12,5 mg dagligt om aftenen. Lægen kan sætte din dosis op med 12,5 mg 1-2 gange om ugen til maksimalt 50 mg (en dosis der først kan nås efter 2 uger). Du kan tage den samlede dosis, som en enkelt dosis om aftenen. Tal med lægen. Den almindelige dosis er 25-37,5 mg dagligt. I enkelte tilfælde kan en højere dosis være nødvendig.

Hvis du har taget for meget Clozapin 2care4
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clozapin 2care4, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering er døsighed, søvn-lignende sløvhedstilstand, manglende reflekser, bevægelsesforstyrrelser, koma, uklarhed, forvirring, desorientering, vrangforestillinger, ser ting, der ikke findes (hallucinationer), rastløshed, øget reaktion

på stimuli, anfald/kramper, kraftigt spytafsondring, udvidede pupiller, sløret syn, forstyrrelse i krops-temperaturen, lavt blodtryk, besvimelse, hurtig puls, uregelmæssig puls, en bestemt form for lungebetændelse, åndenød og vejrtrækningsproblemer eller vejrtrækningssvigt. Symptomer på overdosis hos små børn omfatter bevægelsesforstyrrelser, stærk sløvhed og koma.

Hvis du har glemt at tage Clozapin 2care4

Hvis du har glemt at tage en dosis, kan du stadig tage den, medmindre det er tid til næste dosis. I så fald skal du følge den normale plan. Du må ikke tage en dobbeltdosis Clozapin 2care4 som erstatning for den glemte dosis.

Hvis det er mere end 2 dage siden du tog sidste dosis, skal behandlingen startes igen med en lavere dosis, som kan øges langsomt efter lægens anvisninger.

Hvis du holder op med at tage Clozapin 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil sørge for at nedsætte din dosis gradvist i forbindelse med ophør af behandlingen med Clozapin 2care4. Ved pludselig ophør af behandlingen kan der opstå abstinenssymptomer, f.eks.: du ser ting, der ikke findes (hallucinationer), hovedpine, kvalme, opkastning og diarré.

Kontakt straks til lægen, hvis du igen føler dig syg, efter at behandlingen med Clozapin 2care4 er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Clozapin 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvortlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser. Forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.
- Kramper, evt. ledsaget af kortvarige muskel-rykninger. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (agranulocytose). Kontakt straks læge. Selvom denne tilstand normalt ophører når behandlingen afbrydes, kan agranulocytose medføre blodforgiftning og være dødelig. Da der kræves øjeblikkelig ophør af lægemidlet for at forhindre udviklingen af livstruende agranulocytose, er det absolut påkrævet, at der foretages regelmæssige blodprøver (tælling af hvide blodlegemer).
- Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Blegthed og træthed pga. blodmangel.
- Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt læge.
- Blokering af et blodkar.
- Leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot i huden eller øjnene ledsaget af ophobning i galden. Behandlingen skal standses. Kontakt læge eller skadestue.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Lungebetændelse og infektion i nedre luftveje. Kan være alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.
- Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben pga. betændelse i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Besvimelse (pga. kredsløbskollaps). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- En livstruende form for dyb bevidstløshed ved diabetes (hyperosmolært koma).
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Øget antal blodplader.
- Forstyrrelser i hjertemusklen.
- Hjertestop. Ring 112.
- Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle / vejrtrækningsstop. Ring 112.
- Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen. Kontakt læge eller skadestue.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
- Pludselig, uforklarlig død.
- Alvortlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
- Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
- Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrides og føres med blodet til lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer skal du søge læge omgående.
- Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
- Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Døsighed/sløvhed.
- Svimmelhed.
- Forstoppelse.
- Kraftig spytafsondring.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Stigning i antallet af hvide blodlegemer.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Vægtøgning.
- Sløret syn.
- Hovedpine.
- Talebesvær.
- Rysten.
- Stivhed.
- Rokkende, vridende bevægelser især med benene.
- Forandringer i EKG (hjertekardiogram).
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Kvalme.
- Opkastning.
- Anoreksi (appetitmangel/madlede).
- Mundtørhed.
- Forhøjede leverenzymmer.
- Ufrivillig vandladning.
- Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.
- Træthed.
- Feber.
- Forstyrrelser i sved-/temperaturreguleringen.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Stammen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Nedsat glukosetolerance.
- Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Betændelse i hjertesækken.
- Rastløshed, rastløs uro.
- Forvirring.
- Kvælningsformæmmelser.
- Væskeophobning i brystet.
- Synkebesvær.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.
- Langsomme, ufrivillige bevægelser.
- Hudreaktioner.
- Symptomer med tvangstanker og tvangshandlinger.
- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
- Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.
- Forstørrelse af spytkirtlen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Forhøjet værdi af enzymet kreatin-fosfokinase i blodet (øges ved enhver form for muskel-nedbrydning).
- Diarré.
- Abstinenser hos nyfødte.

Hos ældre med demens er der rapporteret et lidt forøget antal dødsfald blandt patienter, der er i behandling med antipsykotika sammenlignet med dem, der ikke er i behandling med antipsykotika.

Clozapin 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder kolesterol etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Clozapin 2care4 ved almindelig temperatur. Tag ikke Clozapin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Clozapin 2care4 25 mg og 100 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Clozapin 25 mg og Clozapin 100 mg. Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat; majsstivelse; kolloid vandfri silica; natriumlaurylsulfat; povidon (K25); mikrokrySTALLinsk cellulose; natriumstivelsesglycolat (type A) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Clozapin 2care4 25 mg er en rund og lysegul tablet med delekærv.
Clozapin 2care4 100 mg er en rund og lysegul tablet med krydsdelekærv.

Pakningsstørrelser

Clozapin 2care4 25 mg fås i en pakningsstørrelse á 100 stk.
Clozapin 2care4 100 mg fås i pakningsstørrelser á 50 stk. og 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2012