

Brentan® 20 mg/ml kutanopløsning

Miconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Brentan uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Brentan.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan
3. Sådan skal du bruge Brentan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Brentan er et svampemiddel. Du kan bruge Brentan kutanopløsning mod svamp i negle og hud.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Brentan for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan

Brug ikke Brentan, hvis

- du er overfølsom over for miconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær opmærksom på følgende

Du må ikke bruge Brentan kutanopløsning mod svamp i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning.

Undgå at få Brentan kutanopløsning i øjnene.

Du bør stoppe behandlingen, hvis du får tegn på allergi.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brentan indeholder alkohol. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse) må du ikke bruge Brentan uden først at tale med lægen eller apoteket.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Brentan, under graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Brentan efter aftale med lægen.

Erfaringer med Brentan er endnu begrænsede.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brentan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Brentan kutanopløsning

Brentan kutanopløsning indeholder:

- propylenglycol, som kan virke irriterende på huden.
- alkohol. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Brentan uden først at tale med lægen eller apoteket.

3. Sådan skal du bruge Brentan

Hvis din læge har ordineret Brentan til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er Voksne og børn

Du skal pensle de angrebne hudområder 2 gange daglig.

Du skal fortsætte med at bruge Brentan kutanopløsning i 1-2 uger, efter at symptomerne er væk.

Hvis du skal bruge Brentan kutanopløsning mod neglesvamp, skal du følge den brugsvejledning, som står nedenfor.

Du må kun bruge Brentan kutanopløsning til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Hygiejniske forholdsregler

1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du pensler Brentan kutanopløsning på.
2. Du skal sørge for, at de ting, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde

(håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), ikke bliver brugt af andre.

Neglesvamp

1. Klip den angrebne negl så kort som mulig.
2. Pensl Brentan kutanopløsning på neglen. Du skal også pensle Brentan kutanopløsning inde under neglen og på huden omkring neglen.
3. Lad Brentan kutanopløsning tørre, efter du har smurt den på. Brentan kutanopløsning efterlader en hinde efter tørring.
4. Du skal rense neglen med acetone eller neglelakfjerner, før du pensler Brentan kutanopløsning på næste gang.
5. Fortsæt behandlingen til en ny negl er vokset ud og ser helt normal ud. Det tager mindst 3 måneder.

Hvis du har brugt for meget Brentan kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Brentan kutanopløsning, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du bruger for meget Brentan kutanopløsning, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Brentan kutanopløsning. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge Brentan

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Brentan

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Brentan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

- **Sjældne bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Hudirritation, kontakteksem, rødme, brændende fornemmelse i huden, nældefeber, hududslæt, kløe.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Brentan kutanopløsning utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Brentan Kutanoløsning ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Brentan kutanopløsning efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Brentan 2% kutanopløsning indeholder

- Det aktive stof er miconazol. 1 ml kutanopløsning indeholder 20 mg miconazol.
- De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol; acrylic klæbemiddel; ethanol, denatureret.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Brentan Kutanoløsning er en klar opløsning.

Pakningsstørrelse

Flaske med 30 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen
McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2009



JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.jnj.com

Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.jnj.com

INSERT BRENTAN

Market: DK

Article Number : P1602726F

Mat. ID Code: 739

Format Name : 3P_LUS//034/V1 (140x230) Operator : Jitesh

Technical Info/Spec:

Pointsize : 8.5pt

File Name: P1602726F.indd (CS2_PC)



Date: 1. 21-12-2009
2. 13-01-2010
3. 18-01-2010
4.
5.

L A B