

Brentan® 20 mg/g pudder

Miconazolnitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Brentan uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Brentan.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Brentan på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan
3. Sådan skal du bruge Brentan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Brentan er et svampemiddel. Du kan bruge Brentan pudder mod svamp på fødder og andre steder på huden.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Brentan for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan

Brug ikke Brentan, hvis

- du er overfølsom over for miconazolnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær opmærksom på følgende

- Du må ikke bruge Brentan pudder mod svamp i hårbund, skæg eller negle uden lægens anvisning.
- Undgå at få Brentan pudder i øjnene.
- Du bør stoppe behandlingen, hvis du får tegn på allergi.
- Brentan pudder indeholder talcum, som kan give irritation af luftvejene. Undgå så vidt muligt at indånde pudderet. Især bør man være forsigtig ved behandling af børn og spædbørn.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Brentan pudder samtidig med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Brentan under graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Brentan efter aftale med lægen.

Erfaringer med Brentan er endnu begrænsede.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brentan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Brentan pudder

Brentan pudder indeholder talcum, som kan give irritation af luftvejene. Undgå så vidt muligt at indånde pudderet. Især bør man være forsigtig ved behandling af børn og spædbørn.

3. Sådan skal du bruge Brentan

Hvis din læge har ordineret Brentan til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er Voksne og børn

Du skal pudre de angrebne hudområder 2 gange daglig.

Du skal fortsætte med at bruge Brentan pudder i 1-2 uger, efter at symptomerne er væk.

Hvis du skal bruge Brentan pudder mod fodsvamp, skal du følge den brugsvejledning, som står på næste side.

Du må kun bruge Brentan pudder til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Hygiejniske forholdsregler

1. Du skal altid vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du drysser Brentan pudder på.
2. Du skal sørge for, at de ting, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde (håndklæde, børste, vaskeklud, negleklipper), ikke bliver brugt af andre.

Behandling af fødderne

- Vask fødderne med sæbe og fjern afskallet hud. Tør fødderne omhyggeligt – også mellem tæerne – med et håndklæde, der kun bliver brugt til det.
- Drys Brentan pudder på og omkring det angrebne hudområde – også mellem tæerne og på fodsålen.
- Tag rene strømper på efter hver påføring og drys lidt pudder i strømper og sko.

Hvis du har brugt for meget Brentan pudder

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Brentan pudder, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du bruger for meget Brentan pudder, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Brentan pudder. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge Brentan

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Brentan

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Brentan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

- **Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
Hudirritation, kontakteksem, rødme, brændende fornemmelse i huden, nældefeber, hududslæt, kløe.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Brentan pudder utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Brentan pudder ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Brentan pudder efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Brentan 20 mg/g pudder indeholder

- Det aktive stof er miconazolnitrat. 1 g pudder indeholder 20 mg miconazolnitrat.
- De øvrige indholdsstoffer er: Talcum; zinkoxid; silica, kolloid vandfri.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Brentan pudder er et hvidt pudder.

Pakningsstørrelse

Strøddåse med 20 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011

