

Brentan® 100 mg vagitorier

Miconazolnitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Brentan til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan
3. Sådan skal du bruge Brentan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Brentan er et svampemiddel. Du kan bruge Brentan vagitorier til behandling af betændelse i skeden, der skyldes svampe, som Brentan virker på.

Lægen kan have givet dig Brentan for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brentan

Brug ikke Brentan, hvis

- du er overfølsom over for Miconazolnitrat eller hårdfedt.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Brentan

Vær opmærksom på følgende

Hvis du bliver overfølsom eller får allergiske reaktioner, bør du stoppe behandlingen med Brentan vagitorier. For at undgå at få en infektion igen, er det vigtigt at være påpasselig med hygiejnen. Hænderne skal vaskes grundigt, inden vagitorien opsættes.

Din seksualpartner bør måske også behandles, hvis der er symptomer (f.eks. kløe og rødme). Dette bør ske efter samråd med lægen.

Brug ikke Brentan samtidig med kondom eller pessar, da indholdsstofferne i Brentan kan ødelægge gummet, så præventionen ikke virker.

Brentan misfarver ikke hud og tøj.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)
- tabletter mod diabetes
- medicin mod epilepsi (fenytoin)

Brentan kan skade latex produkter som kondom og pessar. Kontakt mellem disse og Brentan bør derfor undgås.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Brentan efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Brentan efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brentan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Brentan

Brug altid Brentan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

1 vagitorie 1 gang daglig ved sengetid i 15 dage.

Sådan anvendes Brentan vagitorier

Læg dig ned med knæene løftet og spredt og før forsigtigt vagitorien så dybt ind i skeden som muligt.

Renlighed under behandlingen:

1. Du skal vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du bruger Brentan vagitorier. Vask også dine hænder grundigt, inden du opsætter vagitorien.
2. Du skal sørge for, at alle genstande, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde (håndklæde, vaskeklud) mm, kun bliver brugt af dig.
3. Du kan bruge hygiejnebind, hvis der siver rester af vagitorien ud efter opsætning. Der kan sive rester af vagitorien ud i op til et døgn, efter du har indført den.

Hvis du har brugt for mange Brentan vagitorier

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Brentan, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du må kun bruge Brentan vagitorier på den måde som lægen har anvist. Du må ikke bruge Brentan vagitorier i munden.

Hvis du har glemt at bruge Brentan

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Brentan

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Brentan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Krampelignende smerter i bækkenet.
- Brændende fornemmelse i kønsorganerne, skedeirritation, allergisk reaktion, kløe, nældefeber og udslæt.
- Udflåd.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Brentan vagitorier utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Brentan vagitorier ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Brentan vagitorier efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger**Brentan vagitorier indeholder**

- Det aktive stof er miconazolnitrat. 1 vagitorie indeholder 100 mg miconazolnitrat.
- Det øvrige indholdsstof er: hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelser**Udseende**

Brentan er hvide vagitorier.

Pakningsstørrelser

Æske med 15 vagitorier.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.
– Queluz de Baixo – 2730-055 Barcarena – Portugal

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

November 2009



JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.jnj.com

Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.jnj.com

INSERT BRENTAN

Market: DK

Article Number: P1604105C

Mat. ID Code: 1662

Format Name: 3P_LUS//017/N1 (170x295)

Operator: Vinay

Technical Info/Spec:

Pointsize: 9 pt

File Name: P1604105C.indd (CS2_PC)



Black

L A B

Date: 1. 24-12-2009
2. 14-01-2010 (JGA)
3.
4.
5.

x295)