

Indlægsseddel: Information til brugeren

Livostin 50 mikrog/dosis næsespray, suspension

Levocabastin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Livostin uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Livostin.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du bivirkninger, der ikke er nævnt her.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Livostin på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Livostin
3. Sådan skal du bruge Livostin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

-Livostin indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i næsen.

Du kan bruge Livostin næsespray til at behandle overfølsomhed, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser sig ved, at næsen løber og er stoppet.

Livostin virker næsten øjeblikkeligt og virkningen kan vare ved i adskillige timer.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Livostinfor noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Livostin

Brug ikke Livostin hvis:

- du er overfølsom (allergisk) over for levocabastin eller af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge -Livostin

Tal med lægen, inden du bruger -Livostin, hvis:

- du har dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Oxymetazolin (middel mod tilstoppet næse) kan forbigående nedsætte optagelsen af levocabastin (det aktive stof i Livostin næsedråber).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge -Livostin. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Livostin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Livostin kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Livostin

Livostin næsespray indeholder benzalkoniumchlorid, som virker irriterende og kan medføre hudreaktioner og åndedrætsbesvær.

Propylenglycol kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Livostin næsespray

Hvis din læge har ordineret Livostin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange daglig. Hvis det er nødvendigt, kan du øge dosis til 2 pust i hvert næsebor 3-4 gange daglig.

Børn under 2 år

Du må kun bruge Livostin til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Livostin næsespray skal omrystes før brug.

Sådan bruger du Livostin næsespray

1. Puds næsen.
2. Ryst beholderen godt og fjern beskyttelseshætten.
3. Før du bruger Livostin næsespray første gang, skal du pumpe nogle få gange til der opnås en fin forstøvning.
4. Hold sprayflasken lodret, som vist på tegningen.
Bøj hovedet let forover. Hold for det ene næsebor, og anbring sprayens spids i det andet.



5. Pump 2 gange samtidigt med, at du trækker vejret ind gennem næseboret.
6. Gentag proceduren i det andet næsebor.

Har du brugt for meget Livostin næsespray

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Livostin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Hvis du ved et uheld kommer til at indtage Livostin, kan det ikke udelukkes, at du bliver sløv. Du skal drikke rigeligt med ikke-alkoholisk væske og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge -Livostin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

-Livostin næsespray kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

- **Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Åndedrætsbesvær, astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hovedpine

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Kvalme, træthed, smerter
- Bihulebetændelse, svimmelhed, døsighed
- Smerte i luftrøret, næseblod, hoste.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hævelse i øjenlåget, utilpashed, overfølsomhed.
- irritation, smerter samt tørhed på påføringsstedet.
- Tilstoppet næse, ubehag i næsen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt.112.
- Brændende fornemmelse samt ubehag på påføringsstedet.
- Hævede næseslimhinder.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

- Opbevar -Livostin utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Livostin ved almindelig temperatur.
- Brug ikke -Livostin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Livostin 50 mikrog/dosis næsespray, suspension indeholder:

- Aktivt stof: Levocabastin.
- Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid opløsning 50%, natriumedetat, propylenglycol, vandfri natriumphosphat (E339), natriumdihydrogenphosphatmonohydrat (E339), hypromellose (E464), polysorbat 80 (E433), sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Livostin næsespray er en farveløs suspension (opslemning) i en hvid plastflaske.

Pakningsstørrelser

-Livostin næsedråber fås i pakning med 100 doser eller 150 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., B-2340 Beerse, Belgien.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011