

Indlægsseddel: Information til brugeren

Livostin 0,5 mg/ml øjendråber, suspension

Levocabastin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Livostin uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Livostin.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Livostin på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Livostin
3. Sådan skal du bruge Livostin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Livostin indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i øjnene.

Du kan bruge Livostin øjendråber:

- til behandling af allergisk øjenbetændelse, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser sig ved at øjnene løber, klør og er røde og øjenlågene hævede.
- når øjnene løber på grund af anden form for overfølsomhed (allergi).

Livostin virker næsten øjeblikkeligt og virkningen kan vare ved i adskillige timer.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Livostin øjendråber for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Livostin

Brug ikke Livostin hvis:

- du er overfølsom (allergisk) over for levocabastin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Livostin

Tal med lægen, inden du bruger Livostin, hvis:

- du har dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Livostin og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Livostin. Tal med lægen.

Amning

Livostin Hvis du ammer, må du kun bruge Livostin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Livostin kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Livostin

Livostin øjendråber indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid samt propylenglycol, der kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Livostin øjendråber, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. Sådan skal du bruge Livostin øjendråber

Hvis din læge har ordineret Livostin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 2 år


1 dråbe i hvert øje 2 gange daglig. Hvis denne dosis ikke hjælper, kan din læge øge doseringen til 3-4 gange daglig. Tal med lægen.

Børn under 2 år

Du må kun bruge Livostin til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Sådan bruger du Livostin

1. Ryst beholderen godt og fjern beskyttelseshætten.
2. Bøj hovedet bagover og træk forsigtigt det nederste øjenlåg lidt nedad.
3. Dryp én dråbe i den inderste øjenkrog, så dråben bliver fordelt mellem øjet og øjenlåget. Du kommer automatisk til at blinke, så øjendråben bliver fordelt over hele øjet.
4. Dryp det andet øje på samme måde.



Pas på ikke at røre øjet med øjendråbeflasken, da du ellers kan risikere, at resten af øjendråberne bliver forurenede og senere kan give infektion i øjet.

Hvis der er gået mere end en måned, efter du har åbnet en flaske Livostin øjendråber, må du ikke bruge eventuelle rester.

Har du brugt for meget Livostin øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Livostin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du ved et uheld kommer til at indtage Livostin, kan det ikke udelukkes at du bliver sløv. Du skal drikke rigeligt med ikke-alkoholisk væske og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge Livostin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Livostin øjendråber kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Øjensmerter, sløret syn.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter).

- Hævelse af øjenlåget.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber og hævelser). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Overfølsomhedsreaktioner, kontakteksem, nældefeber.
- Hovedpine.

- Betændelse i øjets bindehinde, hævelse i øjet, betændelse i øjenlåget, øget blodfylde i øjet, rindende øjne.
- Brændende følelse i øjet, røde øjne, irritation i øjet, kløen i øjet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

- Opbevar Livostin utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Livostin ved temperaturer over 25 °C.
- Holdbarhed efter åbning er 1 måned.
- Brug ikke Livostin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Livostin 0,5 mg/ml øjendråber, suspension indeholder:

- Aktivt stof: Levocabastin.
- Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, vandfrit dinatriumphosphat (E339), natriumdihydrogenphosphatmonohydrat (E339), hypromellose (E464), polysorbat 80 (E433), benzalkoniumchlorid opløsning 50%, dinatriumedetat, sterilt vand.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Livostin øjendråber er en farveløs suspension (opslemning) i en plastflaske.

Pakningsstørrelse

Livostin øjendråber fås i pakning med 4 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød.

Fremstiller

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., B-2340 Beerse, Belgien.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011