

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lecrolyn 20 mg/ml, øjendråber, opløsning **Lecrolyn 20 mg/ml, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder** Natriumkromoglikat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Lecrolyn uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Lecrolyn.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Lecrolyn
3. Sådan skal De bruge Lecrolyn
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lecrolyn indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i øjnene.

De kan bruge Lecrolyn øjendråber til behandling af

- Allergisk øjenbetændelse.
- Betændelse i øjets bindehinde og hornhinde.
- Betændelse i øjet med små sår i øjets hornhinde.

Lecrolyn øjendråber indeholder polyvinylalkohol og kan derfor også smøre øjnene og øjenlågene og derved lindre øjentørhed. Patienter med allergi får ofte øjentørhed.

Hvis Deres læge har sagt, at De skal bruge Lecrolyn for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning.

Vær opmærksom på, at betændelse i øjets hornhinde kan være alvorligt. Tal med lægen.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE LECROLYN

Brug ikke Lecrolyn, hvis De

- er overfølsom (allergisk) over for natriumkromoglicat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Lecrolyn og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De kan bruge Lecrolyn under graviditet.

Amning

De kan bruge Lecrolyn, selvom De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lecrolyn kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil Deres syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lecrolyn

Lecrolyn øjendråbeflaske:

Øjendråberne indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af øjnene. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Undgå der for kontakt med bløde kontaktlinser.

Tag kontaktlinserne ud, inden De bruger Lecrolyn øjendråber, og vent mindst 15 minutter, før De sætter kontaktlinserne i igen.

Lecrolyn enkeltdosisbeholder:

Lecrolyn enkeltdosisbeholder indeholder ikke benzalkoniumchlorid

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE LECROLYN

Hvis Deres læge har ordineret Lecrolyn til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: 1-2 dråber i hvert øje 4 gange daglig.

Børn under 2 år

De må kun bruge Lecrolyn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Før anvendelsen

- vask Deres hænder
- find den stilling, der passer Dem bedst, mens De drypper øjet (De kan sidde, ligge på ryggen eller sidde foran spejlet).

Drypning:

Lecrolyn enkeltdosisbeholder:

- Åbn posen ved stregmarkeringen.
- Træk beholderne så langt ud at en beholder kan løsnes.
- Luk posen ved at bøje kanten.
- Beholderen åbnes ved at vride vingen af.
- Dryp 1-2 dråber i øjet/øjnene.
- Smid resten af beholderen med evt. restindhold ud.

Der er nok i én enkeltdosisbeholder til begge øjne.

Lecrolyn øjendråbeflaske:

1. Åbn flasken. Spidsen af flasken må ikke røre noget, da indholdet så kan blive foruren.


2. Bøj hovedet bagover og hold flasken over øjet.



3. Træk det nederste øjenlåg nedad og kig opad. Tryk let på flasken og lad 1 dråbe falde ned i øjet.



4. Luk øjet og tryk i øjenkrogen ind mod næsen med pegefingeren i ca. 1 minut. På den måde kan De undgå, at øjendråben forsvinder ned i tårekanalen. Sæt låget på flasken igen.



Gentag dette i det andet øje.

Hvis De har brugt for meget Lecrolyn

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Lecrolyn, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Hvis De har glemt at bruge Lecrolyn

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis De har glemt at bruge en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Lecrolyn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter)

- Forbigående svien.
- Lokal irritation i øjet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Overfølsomhedsreaktioner.

Hyppigheden er ikke kendt

- Brændende eller stikkende følelse efter drypning af øjet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Lecrolyn utilgængeligt for børn.
De kan opbevare Lecrolyn ved almindelig temperatur.

Brug ikke Lecrolyn efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Øjendråbeflaske:

Lecrolyn i almindelig øjendråbeflaske skal anvendes senest 28 dage efter åbningen. Herefter skal resterende medicin kasseres.

Enkeltdosisbeholder:

Opbevar uåbnede beholdere i posen, beskyttet mod lys.
Brug enkeltdosisbeholderne senest 28 dage efter åbning af posen.
Brug kun enkeltdosisbeholderne umiddelbart efter åbning.
Den åbnede beholder skal kasseres sammen med evt. resterende medicin umiddelbart efter brug.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lecrolyn 20 mg/ml øjendråber indeholder

- Aktivt stof: Natriumkromoglikat.
- Øvrige hjælpestoffer: Benzalkoniumchlorid 50 mikrogram/ml (konserveringsmiddel), glycerol, polyvinylalkohol, dinatriumedetat og vand til injektionsvæsker.

Lecrolyn 20 mg/ml øjendråber i enkeltdosisbeholdere indeholder

- Aktivt stof: Natriumkromoglikat.
- Øvrige hjælpestoffer: Glycerol, polyvinylalkohol, dinatriumedetat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelse**Udseende**

Lecrolyn øjendråber er en klar, farveløs eller let gullig opløsning.

Pakningsstørrelse

Lecrolyn øjendråbeflaske: 10 ml

Lecrolyn enkeltdosisbeholder: 60 x 0,2 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Finland.

Repræsentant i Danmark:

Santen Danmark, Kongeledet 1, 2920 Charlottenlund.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 15 februar 2017