



Indlægsseddel: Information til brugeren

Glibenese 5 mg tabletter glipizid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil vide.
- Lægen har ordineret Glibenese til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Glibenese
3. Sådan skal De tage Glibenese
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glibenese virker ved at sænke indholdet af sukker i blodet, som er forhøjet ved type 2 diabetes.

Glibenese øger bugspytkirtlens produktion af insulin og øger kroppens følsomhed for insulin.

Glibenese er medicin til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes (type 2 diabetes), når diæt, motion og vægttab ikke er nok.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Glibenese

Tag ikke Glibenese:

- hvis De er allergisk over for glipizid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glibenese (angivet i punkt 6)
- hvis De er allergisk over for anden medicin af samme type som glipizid (sulfonylurinstoffer)
- hvis De har diabetes, som kræver behandling med insulin (type 1 diabetes)
- hvis De har svær diabetes
- hvis De har ustabil diabetes med meget svingende blodsukker

- hvis De har syre i blodet eller urinen
- hvis De har alvorlig nyre- eller leversygdom
- hvis De skal have foretaget en større operation
- hvis De har en alvorlig infektion
- hvis De er kommet alvorligt til skade.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen hvis:

- De er allergisk over for medicin mod blærebetændelse (sulfonamider)
- Deres nyrer eller lever ikke virker, som de skal
- De er underernæret eller har fastet i længere tid
- De spiser uregelmæssigt og springer måltider over
- De tager medicin mod forhøjet blodtryk (beta-blokkere)
- De indtager alkohol
- De ændrer Deres kost eller motionsvaner væsentligt
- De har en stofskiftelidelse, lidelse i skjoldbruskkirtlen, sygdomme i hypofyseforlappen, eller mangel på binyrebarkhormon
- De ofte får symptomer på lavt blodsukker. Det kan blive alvorligt. Lægen kan fortælle dem, hvilke symptomer De skal være opmærksom på, og hvad De skal gøre hvis det opstår. Det kan være en god ide også at involvere et familiemedlem
- De lider af en arvelig sygdom (hepatisk eller kutan porfyri).

Det er vigtigt, at De overholder Deres diæt og følger kostvejledningen, og at De motionerer regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Glibenese. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Ældre og svækkede patienter er særligt følsomme over for Glibeneses virkning på blodsukkeret.

Brug af anden medicin sammen med Glibenese

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Virkningen af Glibenese kan øges, hvis De tager:

- Medicin mod mavesår (f.eks. cimetidin og ranitidin)
- Smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID som fenybutazon)
- Medicin mod svampeinfektioner (miconazol, fluconazol)
- Medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).

Virkningen af Glibenese kan nedsættes, hvis De tager:

- Vanddrivende medicin (thiazider)
- Medicin mod psykoser (chlorpromazin)
- Binyrebarkhormon (kortikosteroider)
- Stofskiftehormoner (thyroideahormoner)
- Nikotinsyre (B-vitamin – niacin)
- Medicin mod astma (ritodrin, salbutamol, terbutalin)
- Hormonpræparater (østrogener, progesteroner)
- P-piller, minipiller eller fortrydelsespiller

- Medicin mod forhøjet blodtryk (calciumantagonister)
- Medicin mod epilepsi (phenytoin)
- Medicin mod tuberkulose (isoniazid).

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Tal med lægen.

De skal være opmærksom på, at visse typer hjerte- og blodtryksmedicin (uspecifikke betablokkere) slører symptomerne på lavt blodsukker.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Glibenese, eller Glibenese kan påvirke virkningen af anden medicin. Hvis De ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller apoteket.

Brug af Glibenese sammen med mad, drikke og alkohol

De skal tage Glibenese ½ time før et måltid med et glas vand.

Hvis De drikker alkohol, samtidig med De tager Glibenese, kan De i sjældne tilfælde opleve en ubehagelig antabus-lignende virkning.

Glibenese indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet:

De må ikke tage Glibenese, hvis De er gravid eller ønsker at blive det.

Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, inden De tager Glibenese. Ved graviditet eller ønske herom bør De have behandlingen ændret til insulin. Tal med lægen.

Amning:

De må ikke tage Glibenese, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glibenese kan hos enkelte give for lavt blodsukker, som påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal De tage Glibenese

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1-8 tabletter (5-40 mg) daglig.

Start med 1 tablet (5 mg) 1 gang daglig, som tages ½ før et hovedmåltid. Hvis denne dosis ikke er nok, kan dosis øges med ½-1 tablet (2,5-5 mg) ad gangen til den bedst mulige blodsukkerkontrol.

Der skal gå flere dage mellem dosisreguleringerne.

Hvis virkningen af en enkelt dosis ikke er tilfredsstillende, kan dosis deles i 2 daglige doser. De må højst tage 3 tabletter (15 mg) som enkeltdosis.

Hvis den daglige dosis er mere end 3 tabletter (15 mg), skal den deles i 2 doser. Begge doser skal tages ½ time før et hovedmåltid.
De må højst tage 8 tabletter (40 mg) om dagen.

Børn:

Glibenese må kun bruges til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Hvis De har taget for mange Glibenese

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Glibenese, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler dem utilpas. Tag pakningen med.

Hvis De har taget for mange Glibenese kan De få for lavt blodsukker. De kan få for lavt blodsukker op til 2 døgn eller længere efter, De har taget Glibenese.

Symptomerne på for lavt blodsukker er: Hovedpine, kraftig sult, kvalme, opkastninger, træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser, ophidselse, aggressivitet, koncentrationsbesvær, manglende årvågenhed, nedsat reaktionsevne, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, manglende evne til at finde ord, rystelser, lammelser, føleforstyrrelser, kraftesløshed, tab af selvkontrol, kramper, stakåndethed, lav puls, svimmelhed og besvimelse som kan føre til koma. Her udover kan De opleve uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger (delirium).

Hvis De har for lavt blodsukker, skal De have noget at spise, gerne brød eller andet, der virker i længere tid på blodsukkeret. De skal være opmærksom på, at der kan gå flere dage, før virkningen af Glibenese er væk. Tal med Deres læge.

Hvis De har glemt at tage Glibenese

Hvis De har glemt en dosis, så tag den, så snart De kommer i tanke om det.

Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Glibenese

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue. (Hvis De får feber, skal De straks kontakte lægen)
- Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue
- Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx angst. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Mæthed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker
- Mavesmerter, diarré, kvalme
- Smerter opadtil i maven og svien bag nederste del af brystbenet pga. irritation af spiserør og mavesæk.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Antabus-lignende reaktion med rødmen i huden og opkastning
- Svimmelhed, døsighed, rysten
- Sløret syn
- Opkastning
- Eksem og rødmen af huden.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen
- Forvirring
- Hovedpine
- Synsforstyrrelser med nedsat, aftagende og unormalt syn
- Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue
- Forstoppelse
- Påvirkning af leverens funktion
- Udslæt / hududslæt, allergiske hudreaktioner, kløe, nældefeber og øget følsomhed af huden for lys
- Almen utilpashed.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

- Eksem eller irritation af huden / udslæt.

Glibenese kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver og leverfunktionstest, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk) eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glibenese indeholder:

- Aktivt stof: Glipizid.
- Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose, stearinsyre og lactose.

Udseende og pakningsstørrelse

Glibenese 5 mg tabletter er hvide, runde tabletter med delekærv på den ene side og mærket "G5" på den anden side.

Glibenese findes i tabletglas eller i blisterpakninger (PVC/aluminium) med 100 eller 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, F-37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2013

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk