

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Delepsine, 200 mg/ml orale dråber, opløsning Natriumvalproat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Delepsine til dig personligt. Lad derfor være med at give Delepsine til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine
3. Sådan skal du tage Delepsine
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Delepsine er til behandling af epilepsi og mani.

Delepsine forhindrer eller dæmper krampetilfælde.

Du kan bruge Delepsine alene eller sammen med anden medicin til behandling af forskellige typer af epilepsi (generaliseret epilepsi, partiel epilepsi).

Du kan også bruge Delepsine til behandling af mani, hvor du kan føle dig eksalteret, opstemt, ophidset, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i forbindelse med en sygdom, som kaldes "bipolar sygdom". Delepsine kan bruges, når lithium ikke kan bruges.

Lægen kan have givet dig Delepsine for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DELEPSINE

Tag ikke Delepsine, hvis du:

- er overfølsom (allergisk) over for natriumvalproat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Delepsine.
- har sygdom i leveren eller bugspytkirtlen.
- eller dine nære slægtninge har haft leversygdom pga. medicin.
- har en særlig form for stofskiftesygdom (hepatisk porfyri).
- har nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni).
- har unormal tendens til blødning.

Vær ekstra forsigtig med at tage Delepsine

Behandling med Delepsine kræver omhyggelig kontrol af leverens og bugspytkirtlens funktion samt andre blodprøver. Det er vigtigt, at du møder op til denne kontrol.

Tal med din læge, hvis du:

- skal opereres eller have foretaget indgreb hos tandlæge.
- lider af bindevævssygdommen Systemisk lupus Erythematosus (SLE).
- har nedsat nyre- eller leverfunktion.
- tidligere har haft knoglemarvsskader (bloddannelsen).
- lider af en enzymmangelsygdom.
- har let ved at få blå mærker eller bløde.
- er HIV-positiv.
- er en kvinde i den fødedygtige alder og du evt. planlægger at blive gravid eller hvis din vægt stiger.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som f.eks. valproat har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.

Tal med lægen, hvis det drejer sig om et barn under 3 år med svær epilepsi, især hvis barnet samtidig har nedsat leverfunktion, hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, ernæringsforstyrrelser, stofskiftesygdomme som f.eks. carnitinmangel, arvelige forstyrrelser i omsætningen af fedtsyrer eller urinsyre eller det får anden medicin mod epilepsi.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år:

Delepsine bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og unge under 18 år.

Hold ikke brat op med at tage Delepsine. Det kan øge risikoen for anfald. Tal med lægen. Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Delepsine.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Delepsine og Delepsine kan påvirke virkningen af anden medicin. Hvis du ønsker oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket. Fortæl altid din læge, hvis du ændrer mængde af en hvilken som helst anden medicin, du anvender.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod smerter (acetylsalicylsyre).
- medicin mod mavesår (cimetidin).
- anden medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, felbamat, lamotrigin, phenobarbital, phenytoin, primidon, ethosuximid).
- medicin mod malaria (mefloquin).
- medicin mod HIV-virus (zidovudin).
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acetylsalicylsyre).
- medicin mod hjerte-karsygdom (nimodipin).
- sovemedicin eller medicin mod depression eller sindslidelser (benzodiazepiner, MAO-hæmmere).

- medicin mod betændelse (erythromycin, panipenem, meropenem, imipenem).
- medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin).
- medicin mod kræft (cisplatin, adriamycin).

Fortæl det til lægen, hvis du tager noget af følgende medicin:

Medicin, der indeholder carbapenemer (antibiotika, der bruges til at behandle bakterielle infektioner). Kombinationen af valproat og carbapenemer skal undgås, da det kan reducere effekten af natriumvalproat.

Brug af Delepsine sammen med mad og drikke

Du bør tage Delepsine umiddelbart efter et måltid.
Delepsine kan forstærke effekten af alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke tage denne medicin, hvis du er gravid eller er en kvinde i den fødedygtige alder, medmindre din læge udtrykkeligt har tilrådt det. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, skal du anvende sikker prævention under behandlingen.

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage Delepsine, uden at have talt med lægen. Det kan udløse anfald, som kan være farlige for dig og dit barn.

Amning:

Valproat går over i mælken. Hvis du tager Delepsine, kan du amme, men kun i samråd med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder at Delepsine kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Epilepsi er i sig selv også grund til at være forsigtig, når man udfører disse aktiviteter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DELEPSINE

Tag altid Delepsine nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fastsætte hvilken dosis, der passer til dig. Dosis afhænger af din alder, vægt og hvor svære dine anfald er. For at fastsætte den rette dosis, kan du få taget en blodprøve, som viser hvor meget Delepsine, du har i blodet.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som efterhånden sættes op til den dosis, som bedst får dine anfald under kontrol.

Du kan tage Delepsine som 1 eller 2 daglige doser.

Den sædvanlige dosis er:

Behandling af epilepsi:

Voksne:

Startdosis er 600 mg dagligt (10-15 mg/kg). Det svarer til 3 ml Delepsine, orale dråber.

Børn:

Sædvanlig dosis er 15-30 mg/kg dagligt. Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil den daglige dosis være 300-600 mg. Det svarer til 1,5-3 ml Delepsine, orale dråber.

Din læge kan øge dosis med 200-300 mg hver tredje dag, indtil der opnås kontrol over anfaldene. Maksimal daglig dosis er 2500 mg.

Mani:

Den daglige dosis er individuel og skal fastsættes og kontrolleres af din læge.

Startdosis

Den anbefalede startdosis er 750 mg dagligt.

Vedligeholdelsesdosis

De anbefalede daglige doser ligger normalt på mellem 1.000 mg og 2.000 mg.

Ældre:

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Du kan tage Delepsine som 1 eller 2 daglige doser.

Delepsine, orale dråber bør indtages umiddelbart efter et måltid.

Brugsanvisning for:**Delepsine 200 mg/ml, orale dråber, opløsning**

Medicinen skal indtages gennem munden.

1. Åbn låget på flasken og anbring adapteren i flasken.
2. Sæt doseringssprøjten ind i hullet på adapteren.
3. Vend flasken på hovedet. Udtag den ordinerede mængde lægemiddel i sprøjten.
4. Vend flasken rigtigt, fjern sprøjten og skru låget på igen.
5. Tøm sprøjstens indhold i munden på patienten eller ud på en ske.
6. Rens straks sprøjten med rent vand. Tag stemplet ud og rens stempel og sprøjte hver for sig – helst under rindende vand.

Hvis du har taget for meget Delepsine orale dråber, opløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Delepsine end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være slappe muskler, nedsatte reflekser, små pupiller, nedsat åndedræt og koma.

Hvis du har glemt at tage Delepsine

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Kontakt straks din læge hvis du har glemt at tage Delepsine flere gange i træk.

Hvis du holder op med at tage Delepsine

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Behandlingen skal langsomt nedtrappes, da der ellers kan opstå alvorlige bivirkninger.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Delepsine kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Nedsat leverfunktion (kan blive meget alvorligt især hos børn, og kan forekomme i løbet af de første 6 måneders behandling). Det viser sig ved kvalme, opkastninger, diarré, mavesmerter og evt. gulsot. Kontakt straks læge.

Sjældne bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge, hvis du får feber eller halsbetændelse.
- Forvirring og sløvhed, som kan udvikle sig til bevidstløshed. Kontakt lægen.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt læge.
- Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Hos kvinder: Cyster i æggestokkene med symptomer som vægtstigning, ansigtsbehåring, udebleven menstruation. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Kraftig afskalning og afstødning af hud (Lyells syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Kvalme, opkastning, smerter i den øvre del af maven, diarré.

Almindelige bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Rystende hænder, myrekryb, hovedpine. Sammen med anden medicin mod epilepsi desuden træthed, søvnighed, ligegyldighed (apati) og problemer med styring af bevægelser.
- Let og forbigående nedsættelse af knoglemarvens evne til at danne blod.
- Udslæt.
- Forbigående hårtab og tyndhårethed.
- Vægtøgning, vægttab, øget eller mindsket appetit.
- Uregelmæssig menstruation.

Ikke almindelige bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Rastløshed, irritation.
- Forøget spytafsondring.
- Hævede fødder, ankler og hænder.

Sjældne bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.
- Tab af hørelsen. Kan være alvorligt, hvis høretabet er blivende.
- Rykvisse, ufrivillige øjenbevægelser, svimmelhed.
- Betændelse i munden.
- Forhøjet niveau af mandligt kønshormon (testosteron).
- Udebleven menstruation.
- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Svigtende eller nedsat hukommelse.
- Forbigående rystelammelse (parkinsonisme).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

- Ekstrapyramidale forstyrrelser (ufrivillige, vridende bevægelser).
- Sløvhed.

Delepsine kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. ændringer i blodets sammensætning, som igen bliver normal, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Delepsine utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Delepsine orale dråber, opløsning ved almindelig temperatur.

Brug ikke Delepsine efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Delepsine, 200 mg/ml orale dråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Natriumvalproat.

Øvrige indholdsstoffer: Vand, rensat.

Udseende og pakningsstørrelser

Delepsine, orale dråber, opløsning er en klar farveløs væske.

Delepsine, orale dråber, opløsning, 200 mg/ml fås i glasflaske med skruelåg med et indhold på 100 ml. Pakningen indeholder en doseringssprøjte.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI 02200 Espoo

Finland

Repræsentant i Danmark:

Orion Pharma A/S

Møllevej 9

DK-2990 Nivå

Danmark

Telf. 49126600

opdk@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010