

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Toilax[®], enterotabletter 5 mg
Toilax[®], rektalvæske, suspension 2 mg/ml

Bisacodyl

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Toilax uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Toilax.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Toilax
3. Sådan skal du tage Toilax[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Toilax er et afføringsmiddel, der virker ved at fremme tarmens bevægelser og ved at øge salt- og vandindholdet i tarmen.

Du kan bruge Toilax ved tarmtømning før operation, røntgen- eller tarmundersøgelse. Du kan bruge Toilax i en kortere periode mod forstoppelse.

Lægen kan give dig Toilax for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TOILAX

Tag ikke Toilax:

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for bisacodyl (det aktive indholdsstof) eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen
- hvis du lider af alvorlig betændelse i tarmen
- hvis du lider af en akut tilstand i bughulen, som kræver operation f.eks. blindtarmsbetændelse
- hvis du lider af svær væskemangel
- hvis indholdet af kalium i blodet er for lavt.

Vær ekstra forsigtig med at tage Toilax

- hvis du har en tarmsygdom, skal du altid tale med din læge, før du bruger Toilax.
- hvis du har revner i huden omkring endetarmsåbningen (fissurer)
- hvis du har hæmorroider, som er bristet og har dannet sår.

Du må ikke bruge Toilax i længere tid uden din læges anvisning. Hvis du bruger et afføringsmiddel i store doser i længere tid, kan du komme til at lide af væske- og saltmangel og føle dig svag og kraftsløs. Du kan få diarré, dårlig optagelse af næringsstoffer, især proteiner. Du kan blive

afhængig af afføringsmidler, og dette kan medføre en udvidelse og kronisk betændelse af tarmen (kolitis). Tarmfunktionen kan helt ophøre.

Hyppigere afføringer og påvirkning af kredsløbet på grund af kraftige mavesmerter kan medføre svimmelhed og besvimelse.

Laboratorieundersøgelser:

Oplys altid når du får taget blodprøver, at du er i behandling med Toilax. Kaliumindholdet i blodet kan være nedsat.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du samtidig med Toilax tager vanddrivende medicin eller binyrebarkhormoner, kan din saltbalance blive påvirket. Det kan give problemer, hvis du også tager digoxin (hjertemedicin). Virkningstiden af digoxin og anden medicin med en langtidsvirkning kan være forkortet. Tal med din læge.

Enterotabletter:

Tabletfilmen af Toilax enterotabletter er modstandsdygtig overfor mavesyre. Mælkeprodukter og lægemidler mod for meget mavesyre kan ødelægge filmovertrækkets modstandsevne, og det kan medføre fordøjelsesproblemer og maveirritation. Der må derfor ikke indtages mælkeprodukter eller lægemidler mod for meget mavesyre samtidig med Toilax enterotabletter og i mindst 1-2 timer efter indtagelse af Toilax enterotabletter.

Brug af Toilax sammen med mad og drikke

Hvis du samtidig med Toilax enterotabletter tager medicin mod for meget mavesyre eller indtager mælkeprodukter, kan medicinen og mælkeprodukterne ødelægge filmovertrækket på Toilax enterotabletter og derved give mavegener.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Toilax efter aftale med lægen..

Amning

Toilax[®] går over i modermælken i små mængder. Hvis du ammer, må du kun tage Toilax efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Toilax påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Toilax

Toilax enterotabletter indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TOILAX

Hvis din læge har ordineret Toilax til dig, skal du altid følge lægens anvisning.

Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Den sædvanlige dosis er angivet nedenfor:

Korttidsanvendelse ved forstoppelse

Enterotabletter:

Voksne og børn på 10 år og derover:

1-2 enterotabletter (5-10 mg) 1 gang dagligt ved sengetid.

Børn på 2-10 år: 1 enterotablet (5 mg) én gang dagligt, men kun efter lægens anvisning.

Børn under 2 år: Toilax® bør ikke anvendes til børn under 2 år.

Rektalvæske, suspension (klysma):

Voksne og børn på 10 år og derover: ½-1 klysma (5-10 mg) 1 gang dagligt.

Børn under 10 år: Du må ikke bruge Toilax til børn under 10 år uden lægens anvisning.

Børn under 2 år: Toilax bør ikke anvendes til børn under 2 år.

Tarmtømning før operation, røntgen- eller tarmundersøgelse

Kun ifølge lægens anvisning.

Voksne og børn over 10 år:

Dagen før undersøgelsen tages 2 enterotabletter om formiddagen kl. ca.12.00 og 2 enterotabletter om aftenen kl. ca. 22.00. Om morgenen på selve undersøgelsesdagen skal du indføre 1 klysma i endetarmen.

Børn 4-10 år:

Dagen før undersøgelsen tages 1 enterotablet om aftenen. Om morgenen på selve undersøgelsesdagen skal du indføre ½ klysma i endetarmen.

Brugervejledning:

Rektalvæske (klysma):

Vrid enden af tubespiden. Før hele tubespiden ind i endetarmen. Klem tubens indhold helt ud og træk tuben ud, mens den stadig holdes sammenklemmt. Børn 4-10 år: tuben tømmes kun halvt.

Vigtigt: Til børn skal tubespiden kun føres halvt ind.

Enterotabletter:

Du skal synke enterotabletterne hele.

Toilax enterotabletter virker normalt efter 6-12 timer.

Efter indtagelse af Toilax enterotabletter skal der gå mindst 1-2 timer før der må indtages mælkeprodukter og lægemidler mod for meget mavesyre.

Hvis du har taget for mange Toilax enterotabletter eller/og for meget Toilax rektalvæske

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Toilax, end der står i her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tak pakningen med.

Hvis du har taget for meget Toilax, kan du få diarré, mavekramper, væske- og salttab. Hvis du misbruger Toilax i længere tid, kan du få voldsom diarré, mavesmerter, muskeltræthed og skader på nyrerne (f.eks. nyresten).

Hvis du har glemt at tage Toilax

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Toilax kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Mavekramper og mavegener
- Diarré.
- Mavesmerter, evt. med kvalme og opkastning.

Sjældne-meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, hævelse omkring mund og øjne, åndedrætsbesvær, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hudreaktioner, f.eks. udslæt og nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. [Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: \[www.meldenbivirkning.dk\]\(http://www.meldenbivirkning.dk\).](#)

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Toilax[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Toilax, enterotabletter 5 mg og Toilax, rektalvæske, suspension 2 mg/ml indeholder:

:

- Aktivt stof:
bisacodyl
- Øvrige indholdstoffer:
Enterotabletter: lactosemonohydrat; majsstivelse; macrogol 6000; glycerol 85%; magnesiumstearat; gelatine; vandfri kolloid silica; hypromellose; propylenglycol; hypromellosephthalat; diethylphthalat; quinolingult (E 104).

Rektalvæske, suspension: macrogol 400; macrogol 3000; macrogol 4000; citronsyremonohydrat; natriumcitrat; rensset vand.

Toilax udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Toilax 5 mg enterotabletter: gule, filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelser:

Toilax 5 mg enterotabletter fås i 25 stk. og 100 stk. blisterpakning samt en tabletbeholder indeholdende 200 stk.

Toilax 2 mg/ml rektalvæske, suspension fås i 1 stk. tube à 5 ml, 5 stk. tuber á 5 ml samt en hospitalspakning indeholdende 50 stk. tuber à 5 ml.

Toilax fås som kombinationspakning indeholdende 4 stk. enterotabletter og 1 stk. rektalvæske samt en hospitalspakning indeholdende 50 stk. à 4 stk. enterotabletter og 1 stk. rektalvæske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Repræsentant i Danmark:

Orion Corporation
Orionitie 1
FIN-02101 Espoo
Finland

Orion Pharma A/S
Møllevvej 9
DK-2990 Nivå
Tlf. 49126600
opdk@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 9. maj 2011