

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Iliadin, 0,1 mg/ml, næsedråber, opløsning Oxymetazolinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Iliadin uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Iliadin.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Iliadins virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Iliadin
3. Sådan skal du bruge Iliadin
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Iliadin
6. Yderligere oplysninger

1. ILIADINS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Iliadin næsedråber er en opløsning til anvendelse i næsen.

Iliadin næsedråber virker ved at sammentrække blodårerne i næsens slimhinder. Det giver mere luft gennem næsen. Virkningen kommer i løbet af få minutter og holder i ca. 12 timer.

Du kan bruge Iliadin ved forkølelse med tilstoppet næse.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Iliadin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ILIADIN

Brug ikke Iliadin

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for oxymetazolinhydrochlorid eller et eller af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du lider af grøn stær (glaucom).
- hvis du har fået fjernet hypofysen, eller er blevet opereret i hjernen gennem næsen eller munden.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Iliadin

Behandlingen bør ikke vare længere end 1 uge. Hyppig og langvarig brug kan medføre, at tætheden i næsen vender tilbage eller forværres.

Du bør kun anvende Iliadin efter lægens anvisning, hvis du lider af svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, stofskiftesygdomme, vandladningsproblemer pga. forstørret prostata, eller hvis du er i behandling med medicin mod depression (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere).

Anvend Iliadin med forsigtighed, hvis du er følsom over for stoffer, der kan give symptomer som bl.a. søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk.

Hvis mere end én person anvender den samme næsedråbepipette, kan den sprede infektioner.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Hvis du er i behandling med visse lægemidler mod depression (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkningerne ved brug af Iliadin blive forstærkede. Spørg på apoteket eller din læge.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Iliadin efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Iliadin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Iliadin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Iliadin

Iliadin indeholder benzalkoniumchlorid, som kan virke irriterende på næseslimhinden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ILIADIN


Dosering

Børn under 2 år: 1-2 dråber i hvert næsebor 2-3 gange daglig i højst 1 uge.

Du må kun bruge Iliadin næsedråber 0,1 mg/ml til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Brugsvejledning:

1. Næsen pudses så godt som muligt.



2. Barnet bør ligge som vist på fig. med hovedet bøjet bagover.

3. Dryp med pipetten 1-2 dråber i hvert næsebor 2-3 gange dagligt.

4. Hovedet drejes langsomt fra side til side.

Hvis du har brugt for mange Iliadin næsedråber, opløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Iliadin næsedråber, opløsning, end der står her i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for meget Iliadin eller er kommet til at synke opløsningen, kan der opstå en række alvorlige symptomer. Hvis du kommer ud for dette, skal du søge læge eller skadestue, evt. ringe 112. Børn er mere følsomme end voksne.

Hvis du har glemt at bruge Iliadin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Iliadin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Allergiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig eller uregelmæssig puls, hævelse af ansigt og hals. Søg straks læge eller ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden og næseflod.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): Tilstoppet næse, især efter hyppig eller langvarig brug.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde være andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker oplysninger om disse bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5. SÅDAN OPBEVARER DU ILIADIN

Må ikke opbevares over 25°C.

Opbevares utilgængeligt for børn

Brug ikke Iliadin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Holdbarhed efter anbrud: 6 måneder.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Iliadin 0,1 mg/ml, næsedråber, opløsning indeholder

Aktivt stof: Oxymetazolinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, natriumhydroxid, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdihydrat, rensset vand.

Iliadins udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Klar, farveløs opløsning.

Pakningsstørrelser:

Pipetteflaske med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Merck KgaA, Frankfurterstrasse 250, 64293 Darmstadt, Tyskland

Repræsentant for Danmark

CCS, Clean Chemical Sweden AB, Tunavägen 277B, 781 73 Borlänge, Sverige

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2008