

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

SELEXID®

200 mg filmovertukne tabletter
Pivmecillinamhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Selexid® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Selexid® og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Selexid®.
3. Sådan skal du tage Selexid®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Selexid®.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Selexid® og hvad du skal bruge det til

- Selexid® virker på bakterier ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så bakterien ødelægges.
- Du kan få Selexid® mod urinvejsinfektioner og infektioner med salmonella.

Lægen kan have givet dig Selexid® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Selexid®

Tag ikke Selexid®

- hvis du er overfølsom over for pivmecillinamhydrochlorid, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du er overfølsom over for penicillin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Selexid®

- Tal med lægen, inden du tager Selexid®, hvis:
- du er overfølsom over for cefalosporiner
- du lider af en stofskiftesygdom
- du lider af porfyri (selexid bør ikke anvendes).
- du tager medicin mod epilepsi (valproat)
- du tager anden medicin mod betændelse (pivampicillin)
- du har forsnavring af spiserøret
- du får langvarig eller blodig diaré under behandlingen med Selexid®. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Brug af anden medicin

- Tal med din læge, hvis du tager:
- Medicin mod urinsyre (probenecid).
- Anden medicin mod betændelse (f.eks. tetracyklin, erythromycin, andre betalactamantibiotika, aminoglykosider).

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Selexid® sammen med mad og drikke

- Du kan tage Selexid® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
- Du skal tage Selexid® filmovertukne tabletter med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du kan tage Selexid® under graviditet.

Amning:

- Du kan tage Selexid®, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Selexid® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Selexid®
Ingen relevante informationer.

3. Sådan skal du tage Selexid®

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1-2 tabletter på 200 mg (200-400 mg) tre gange dagligt.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 1 tablet på 200 mg tre gange dagligt. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Selexid® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Selexid®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Selexid®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering. Dog kan overdrevet brug af Selexid® give kvalme, opkastning og mavesmerter.

Hvis du har glemt at tage Selexid®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Selexid®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4. Bivirkninger

Selexid® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse forårsaget af antibiotika. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Diaré, opkastning, kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Udslæt.
- Synkebesvær, mavesmerter.
- Overfølsomhed.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end

1 ud af 1.000 patienter):

- Nældefeber.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. sår eller betændelse i spiserøret. Tal med lægen.
- Ledsmerter.
- Feber.
- Kløe.
- Sår i munden.

Selexid® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, leverfunktion etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Selexid®

- Opbevar Selexid® utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Selexid® ved almindelig temperatur.
- Tag ikke Selexid® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Selexid®, 200 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Mecillinam svarende til pivmecillinamhydrochlorid 200 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, hydroxypropylcellulose, hypromellose, magnesiumstearat, paraffin, simeticon.

Pakningsstørrelser:

Selexid® fås i:

Selexid® 200 mg i pakninger med 20, 30, 40 og 100 filmovertrukne tabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Selexid® er et registreret varemærke, der tilhører Leo Pharma A/S.



329360101