

# Clarithromycin Actavis

## Filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

**Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen**

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
- Lægen har ordineret Clarithromycin Actavis til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver værre, bliver ved og er generende.

**I denne information er der oplysninger om:**

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Clarithromycin Actavis
3. Sådan skal du tage Clarithromycin Actavis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information.

**1. Virkning og anvendelse**

Clarithromycin Actavis indeholder et antibiotikum af typen makrolid.

Du kan tage Clarithromycin Actavis til behandling af betændelse i luftvejene, hud og slimhinder.

Du kan desuden tage Clarithromycin Actavis til behandling af mavesår i kombination med anden medicin.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

**2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Clarithromycin Actavis****Tag ikke Clarithromycin Actavis, hvis:**

- Du er overfølsom over for det virksomme indholdsstof clarithromycin, anden medicin af samme type (makrolid) eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- Du tager medicin mod:
  - Mave-tarmgener (cisaprid).
  - Skizofreni og psykoser (pimozid).
  - Allergi (terfenadin).
  - Migræne (ergotamin, dihydroergotamin).
- Du har for lavt indhold af kalium (salt) i blodet.

**Særlige forholdsregler****Tal med lægen, hvis:**

- Din lever og/eller dine nyrer ikke fungerer normalt.
- Du tager medicin mod urinsur gigt (colchicin).
- Du får langvarig eller blodig diaré under behandlingen. Det kan være alvorligt og kræve behandling.
- Du har sygdom i hjerte eller kredsløb f.eks. hjertesvigt, forstyrrelser i hjerterytmen, meget langsom puls eller for lavt indhold af kalium eller magnesium (salte) i blodet.

Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du tager Clarithromycin Actavis.

**Brug af anden medicin**

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

**Tal med lægen, hvis du tager:**

- Medicin mod mave-tarm gener (cisaprid).
- Medicin mod skizofreni og psykoser (pimozid).
- Allergimedien (terfenadin).
- Medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin).
- Medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol).
- Medicin mod højt kolesterol (f.eks. simvastatin, lovastatin, atorvastatin).
- Hjertemedicin (digoxin, nifedipin).
- Medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (quinidin, disopyramid, verapamil).
- Medicin mod tuberkulose (rifampicin, rifabutin).
- Medicin mod HIV (ritonavir, nelfinavir, zidovudin).
- Beroligende medicin (diazepam, alprazolam).
- Sovemedicin (triazolam).
- Astmamedicin (theophyllin).
- Epilepsimedien (carbamazepin).
- Blodfortyndende medicin (warfarin).
- Medicin mod depression (fluoxetin).
- Medicin som hæmmer immunforsvaret, i forbindelse med transplantationer (cyclosporin, tacrolimus).
- Anden antibiotika.

**Brug af Clarithromycin Actavis sammen med mad og drikkevarer**

Du kan tage Clarithromycin Actavis sammen med mad og drikke.

**Graviditet og amning**

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

**Graviditet**

Du må kun tage Clarithromycin Actavis efter lægens anvisning.

**Amning**

Hvis du ammer, må du ikke tage Clarithromycin Actavis, da Clarithromycin Actavis bliver udskilt i modermælk.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Clarithromycin Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clarithromycin Actavis**

Clarithromycin Actavis indeholder polydextrose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

**3. Sådan skal du tage Clarithromycin Actavis****Dosering****Voksne**

Normalt er dosis 1 tablet på 250 mg 2 gange daglig. Din dosis kan stige til 1 tablet på 500 mg 2 gange daglig. Følg lægens anvisning.

Hvis du får Clarithromycin Actavis mod mavesår, skal du tage 1 tablet på 500 mg 2 gange daglig i kombination med anden medicin.

**Børn**

Du må kun bruge Clarithromycin Actavis til børn under 12 år efter lægens anvisning.

## Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

## Har du taget for mange Clarithromycin Actavis?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Clarithromycin Actavis, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for mange Clarithromycin Actavis, kan du opleve opkastning, mavesmerter, diaré og kvalme.

## Har du glemt at tage Clarithromycin Actavis?

Hvis du har glemt at tage en dosis Clarithromycin Actavis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

## 4. Bivirkninger

Clarithromycin Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### Alvorlige bivirkninger

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Forandringer i blodet der kan vise sig ved træthed, infektioner og feber. Kontakt straks lægen.
- Alvorlige overfølsomhedsreaktioner med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorlig påvirkning af leveren med gulsot, leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Forandringer i blodet der kan vise sig ved blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker. Kontakt straks lægen.
- Mæthed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed pga. for lavt blodsukker (ses især i forbindelse med behandling af diabetes med insulin eller anden medicin). Kontakt lægen.
- Kramper. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, evt. uregelmæssig hjerterytm (puls). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Vrangforestillinger (hallucinationer). Kontakt læge eller skadestue.
- Sindslidelser med personlighedsforandring og tab af realitetssans. Kontakt straks lægen.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Langvarig eller blodig diaré med mavesmerter eller feber, som kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.
- Leversvigt med gulsot, sløvhed, evt. bevidstløshed (særligt hvis du forvejen har leversygdom). Kontakt læge eller skadestue.
- Betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning af huden. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Nyrebetændelse med smerter over lænden, feber og blod i urinen, nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

### Ikke alvorlige bivirkninger

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Svamp i munden.
- Hovedpine, forandret lugtesans.

- Kvalme, diaré, opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter.
- Forbigående misfarvning af tænder og tunge.
- Betændelse i tungen eller munden, smagsforstyrrelser.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Påvirkning af leverfunktionen (almindeligvis forbigående).
- Hududslæt, nældefeber.
- Muskelsmerter, ledsmerter.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Susen for ørerne, forbigående høretab.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Angst, søvnløshed, desorientering, ubehagelige drømme, forvirring.
- Omtågethed, svimmelhed.
- Prikkende eller stikkende fornemmelse, evt. følelseløshed i huden.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)

## 5. Opbevaring

Opbevar Clarithromycin Actavis utilgængeligt for børn. Brug ikke Clarithromycin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

## 6. Yderligere information

Afløber altid medicinrester på apoteket.

**Clarithromycin Actavis filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg indeholder:**

Det virksomme indholdsstof er Clarithromycin. De øvrige indholdsstoffer er: Croscarmellosematrium, mikrokrySTALLinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, talcum, hypromellose, pregelatineret majsstivelse, povidon, polydextrose, glyceroltriactat, macrogol 8000. Farvestof: Titandioxid (E171), quinolingult (E104).

### Udseende:

Clarithromycin Actavis er en oval, hvælv, gul, filmovertrukket table. 250 mg tabletterne er mærket 250 på den ene side og CL på den anden side. 500 mg tabletterne er mærket 500 på den ene side og CL på den anden side.

### Pakningsstørrelser:

250 mg: 2, 14, 56, 100, 250, 500, 1000 tabletter.  
500 mg: 14, 20, 28, 42, 84, 100, 168, 250, 500, 1000 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### Markedsføring i Danmark

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte

### Fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte

### Revideret

April 2008.



Actavis Group hf, Hafnarfjörður, Island