

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

LOCERYL®

5% medicinsk neglelak
Amorolfin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Loceryl® uden recept. For at opnå de bedste resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Loceryl®. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Loceryl® og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Loceryl®.
3. Sådan skal du bruge Loceryl®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Loceryl®.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Loceryl® og hvad du skal bruge det til

- Loceryl® neglelak indeholder amorolfin som er et svampemiddel, der bekæmper en stor mængde svampearter, som kan forårsage negleinfektioner.
- Du kan bruge Loceryl® neglelak til behandling af svampeinfektioner, som har angrebet neglen. Loceryl® neglelak anvendes når du tidligere har fået diagnose og behandling af læger, og har behov for yderligere behandling, for at fjerne infektionen. Du kan også have behov for at påbegynde en ny behandling, hvis infektionen kommer igen.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Loceryl® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Loceryl®

Brug ikke Loceryl®

- hvis du er overfølsom over for amorolfin, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Loceryl®

Hvis du arbejder med opløsningsmidler såsom fortynder, terpentin, benzin, paraffin og lignende, bør du bruge handsker, der beskytter lakken på fingernegle.

Kometisk neglelak eller kunstige negle bør ikke anvendes under behandling med Loceryl® neglelak.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Loceryl® neglelak samtidig med anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Loceryl® efter aftale med lægen.

Amning:

- Hvis du ammer, må du kun bruge Loceryl® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loceryl® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Loceryl®
Ingen relevante informationer.

3. Sådan skal du bruge Loceryl®

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Påfør Loceryl® neglelak på de angrebne negle 1-2 gange om ugen.

Du må kun bruge Loceryl® neglelak på neglene. Det kan tage lang tid at behandle neglesvamp. Du bør bruge lakken hver uge i flere måneder. Fortsæt behandlingen til de syge negle er helt udvoksede og helbredte (normalt udseende af neglen). Det tager normalt op til 6 måneder for fingernegle og 9-12 måneder for tånegle.

Børn:

Du må kun bruge Loceryl® til børn efter aftale med en læge.

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Loceryl® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

1. Fil den angrebne negl grundigt (Især neglens overflade og yderste del) med en af de medfølgende file. Brug aldrig neglefilen på raske negle.
2. Rens negleoverfladen med en af de medfølgende renseservietter.
3. Dyp en af spatlerne i flasken med lak. Du må ikke tørre lak af på kanten af flasken.
4. Påfør lakken på hele den angrebne negl med en spatel. Udfør punkt 1-4 for hver angrebet negl.
5. Husk at lukke flasken tæt lige efter brug.
6. Lad lakken tørre i 3-5 minutter.
7. Rens spatlen med den brugte renseserviet.

Det er vigtigt, at du gentager alle ovenstående punkter, hver gang du behandler neglene.

Hvis du har brugt for meget Loceryl®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Loceryl®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Loceryl®

Hvis du glemmer at påføre lakken på den fastlagte ugedag, skal du blot påføre den straks du kommer i tanke herom, og derefter fortsætte som før.

Hvis du holder op med at bruge Loceryl®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4. Bivirkninger

Loceryl® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Negleforandringer, misfarvning af negle, skøre negle.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Brændende fornemmelse i huden, kontakteksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Loceryl®

- Opbevar Loceryl® utilgængeligt for børn.

- Du kan opbevare Loceryl® ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Loceryl® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Loceryl®, 5%, medicinsk neglelak indeholder:

Amorolfi­hydrochlorid svarende til amorolfi­ 5% (50 mg/g).

Øvrige indholdsstoffer:

Ammoniummethacrylat copolymer (type A), butylacetat, ethylacetat, ethanol, triacetin.

Pakningsstørrelser:

Loceryl® 5% medicinsk neglelak fås i pakninger med 3 ml og 5 ml.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Loceryl® er et registreret varemærke, der tilhører Galderma S.A.

