

Indlægsseddel: Information til brugeren

MYCOSTATIN® 100.000 IE/ml, oral suspension

nystatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Mycostatin® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mycostatin®
3. Sådan skal du bruge Mycostatin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Mycostatin® er et svampedræbende middel. Mycostatin® indeholder det svampedræbende middel nystatin.
Mycostatin® bruges til behandling af svamp i mund, svælg, mave og tarm. Det virksomme stof nystatin optages ikke i kroppen, men virker på slimhinder i mundhulen og mavetarmkanalen.

Lægen kan have givet dig Mycostatin® for noget andet. Følg altid lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mycostatin®.

Brug ikke Mycostatin® hvis du er overfølsom overfor nystatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin®.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Mycostatin®
Brug kun Mycostatin® til behandling af svamp i mund, svælg og tarm.

Du bør afbryde behandlingen ved irritation eller overfølsomhedsreaktioner. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Mycostatin® indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg per dosis. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Mycostatin® uden først at tale med lægen eller apoteket.

Brug af Mycostatin® sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Mycostatin® efter et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage bruge Mycostatin® under graviditet.

Amning

Du kan bruge Mycostatin®, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin®

- Mycostatin® indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Mycostatin®.
- Mycostatin® indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.
- Mycostatin® indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give en allergisk reaktion (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

3. Sådan skal du bruge Mycostatin®

Husk at ryste flasken grundigt inden brug.
Brug altid Mycostatin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Svampeinfektion i munden

Voksne, børn og spædbørn:

1 ml 4 gange daglig. Lægen kan anbefale en større dosis. Den normale behandlingsperiode ved svamp i mundhulen er 4-6 uger.

Indlægsseddel: Information til brugeren

MYCOSTATIN® 100.000 IE/ml, oral suspension

nystatin

Det er bedst, at du tager Mycostatin® efter et måltid. Hold suspensionen i munden så længe som muligt, før du synker den.

Hos spædbørn kan du give suspensionen dråbevis eller fortynde den med vand og smøre den på det angrebne område.

Svampeinfektion i mave og tarm

Voksne:

5 ml 3 gange daglig. Lægen kan anbefale en større dosis.

Børn og spædbørn: 1 ml 4 gange daglig.

Suspensionen sluges straks. For at undgå at svampeinfektionen kommer igen, skal du fortsætte med behandlingen 2-3 dage efter at symptomerne er væk.

Hvis du har taget for meget Mycostatin® oral suspension

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Mycostatin® oral suspension, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag emballagen med.

Symptomer: kvalme, opkastninger, diarré.

Hvis du har glemt at tage Mycostatin®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Mycostatin®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg efter behandlingen med Mycostatin® er stoppet.

4. Bivirkninger

Mycostatin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne – til meget sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):
Steven-Johnson syndrom: Alvorlig hudlidelse ledsaget af feber og ledproblemer med blæreformet udslæt.

Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

Kvalme, opkastning, diarre, fordøjelsesproblemer, udslæt og nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Mycostatin® utilgængeligt for børn. Tag ikke Mycostatin® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Mycostatin®, 100.000 IE/ml, oral suspension indeholder

Aktiv stof: Nystatin

øvrige indholdsstoffer: saccharinnatrium, saccharose, ethanol 1% v/v, carmellosenatrium, kanelaldehyd, pebermynteolie, kirsebæraroma, dinatriumphosphat vandfrit, glycerol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216) og rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Mycostatin® er en gul opslæmning.

Pakningsstørrelse er 60 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark

Pharmason ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Ompakket og frigivet af

Pharmason ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Mycostatin® er et registreret varemærke, der tilhører Bristol-Myers Squibb koncernen.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 10/2009