

Indlægsseddel: Information til brugeren

Canesten, creme 1 %
Aktive stof: Clotrimazol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Canesten uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Canesten.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 4 uger.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten
3. Sådan skal du bruge Canesten
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Canesten er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer, som fx dermatofytter (svamp i huden), gærsvampe og skimmelsvampe etc.

Du kan bruge Canesten til behandling af svampeinfektioner på huden (hænder, fødder, kroppen og i hudfolder).

Du kan også bruge Canesten til behandling af svampeinfektioner i skeden (vagina) og på ydre kønsorganer.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CANESTEN

Brug ikke Canesten:

- Hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du er overfølsom over for cetostearylalkohol

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten

Du bør ikke starte behandling uden at tale med lægen:

- Ved infektion i underlivet for første gang.
- Ved gentagne infektioner over længere tid (mere end 4 i løbet af et år) for at udelukke andre sygdomme, som kan give svampeinfektioner.
- Hvis du har været i overgangsalderen.
- Hvis du har udflåd. Det kan skyldes andre sygdomme end svampeinfektioner.
- Ved svampeinfektioner i hårbund, skæg og negle.

Behandling med Canesten creme kan nedsætte virkningen og sikkerheden af kondomer og pessarer under behandlingen.

Undgå at cremen kommer i kontakt med øjnene efter påføringen. Vask derfor hænderne grundigt efter hver behandling.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Canesten under graviditet.

Amning

Du kan bruge Canesten, selvom du ammer. Du bør dog ikke smøre brystvorterne med Canesten før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du kan bruge Canesten samtidig med anden medicin.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Canesten

Canesten indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CANESTEN

Hvis din læge har ordineret Canesten til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Smør et tyndt lag Canesten creme på det angrebne hudområde 2 - 3 gange dagligt.

Du skal fortsætte behandlingen 1 - 2 uger, efter at symptomerne på svamp er forsvundet for at undgå tilbagefald.

En stribe creme på ca. ½ cm er tilstrækkeligt til behandling af et område svarende til en håndflade.

Svampeinfektioner (dermatomycoser)	3-4 uger
Infektion pga bakterier (erythrasma)	2-4 uger
Hudsygdom pga gærsvamp (pityriasis versicolor)	1-3 uger
Svampeinfektion i de ydre kønsorganer hos kvinder (candida vulvitis) og på glans hos mænd (candida balanitis)	1-2 uger

Du skal henvende dig til din læge, hvis der ikke er nogen bedring efter 4 ugers behandling.

Ved behandling af fodsvamp er det vigtigt at vaske fødderne og tørre omhyggeligt mellem tæerne, før du smører med Canesten creme.

Ved infektion af området omkring skeden: Smør Canesten creme på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger og i 3 dage efter, at symptomerne er væk.

Din seksualpartner bør kun behandles, hvis der er symptomer (f.eks. kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten creme på det angrebne område 2-3 gange daglig i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk.

Børn

Du må kun bruge Canesten creme til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Canesten creme 1 % er lugtfri og misfarver ikke tøjet.

Hvis du har brugt for meget Canesten creme

Hvis du bruger for meget Canesten, kan din hud blive irriteret. Dette forsvinder, når du holder op med at bruge Canesten. Aftager irritationen ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at bruge Canesten

Smør med Canesten, når du kommer i tanke om det.

4. BIVIRKNINGER

Canesten kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Hudreaktioner med kløe, udslæt, stikkende/brændende fornemmelse, irritation, ubehag/smerte.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Allergiske reaktioner (besvimelse, for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber).

Hyppighed ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data):

- Afskalning, blærer, hævelse (ødem).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Canesten utilgængeligt for børn.

Brug ikke Canesten efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Canesten creme indeholder:

Aktivt stof: Clotrimazol. 1g creme indeholder 10 mg clotrimazol.

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitanstearat, polysorbat 60, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, octyldodecanol, benzylalkohol, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Canesten creme er en hvid og uigennemskinnelig creme.

Pakningsstørrelser

Tube (aluminium), 20 g og 50 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Fremstiller

Kern Pharma, SL
E-08228 Terrassa (Barcelona)
Spanien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2010.