

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Persantin® 100 mg, overtrukne tabletter

Dipyridamol

12-2012
P054652-3

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Persantin® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin®
3. Sådan skal du tage Persantin®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Persantin® nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper.

Du kan tage Persantin® sammen med anden blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin) til forebyggelse af blodpropper, hvis du har haft en blodprop i hjertet.

Lægen kan have givet dig Persantin® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PERSANTIN®

Tag ikke Persantin®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for dipyridamol, saccharose (se "Vigtig information om nogle af de øvrige indholdstoffer i Persantin®) eller et af de øvrige indholdstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Persantin®

Tal med lægen inden behandling med Persantin®, hvis du har:

- Alvorlig hjerte- eller karsygdom.
- En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis).

Hvis du skal have foretaget en undersøgelse af din hjertefunktion, skal du inden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Persantin®. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

- Medicin mod muskelsygdom (myasthenia gravis).
- Medicin mod forhøjet blodtryk.
- Medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- Medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xantiner).
- Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin eller acetylsalicylsyre).

Brug af Persantin® sammen med mad og drikke

Du kan tage Persantin® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Persantin®. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Persantin®, da dipyridamol går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin® kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdstoffer i Persantin®

Persantin® indeholder 49 mg saccharose per overtrukket tablet. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PERSANTIN®

Tag altid Persantin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Du skal tage 1 tablet 4 gange dagligt.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn må kun få Persantin® 100 mg overtrukne tabletter efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Persantin® overtrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin® overtrukne tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som varmeformermelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine. Du kan også få fald i blodtrykket, hurtigt åndedræt, hurtig puls, smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårligt blodforsyning til

hjertermusklen, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, blødningstendens og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Persantin®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Persantin®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Persantin®. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Persantin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvortige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertermusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter.

- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertermusklen eller blodprop i hjertet. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Åndenød pga. overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbensbuen på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvortige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 ud af 10 patienter.

- Kvalme, diarre.
- Hovedpine, svimmelhed.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Opkastning.
- Udslæt.
- Muskelsmerter.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.
- Nældefeber.
- Hedeture.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

- Opbevar ikke Persantin® ved temperaturer over 25 °C.
- Opbevar Persantin® i original emballage, da det er følsomt for lys.
- Tag ikke Persantin® efter den udløbsdato, der står på kartonen eller etiketten. Udløbsdato (Anv. før:) er sidste dag i den forrige måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Persantin® 100 mg, overtrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Dipyridamol
- Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, magnesiumstearat, saccharose, talkum, akaciegummi, titandioxid (E 171), macrogol 6000, hvid bivoks, carnaubavoks, kolloid vandfri silica.

Pakningsstørrelse

Persantin® fås i en blisterpakning á 96 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Oppakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Persantin® er et registreret varemærke, som tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2012