

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Penomax 200 mg filmovertrukne tabletter
Pivmecillinamhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Penomax til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Penomax
3. Sådan skal du tage Penomax
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Det aktive stof i Penomax, pivmecillinam, er et antibiotikum, der bruges til behandling af infektion i urinvejen.

Lægen kan have givet dig Penomax for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PENOMAX

Tag ikke Penomax

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pivmecillinam eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for penicillin eller antibiotika af typen cephalosporiner
- hvis du har forsnævring af spiserøret, og/eller hvis der er noget i din mave-tarmkanal, der forhindrer normal passage.

Vær ekstra forsigtig med at tage Penomax

- hvis du har organisk aciduri (en medfødt stofskiftesygdom)
- hvis du har porfyri (en sjælden stofskiftesygdom)
- hvis du har mangel på carnitin (en aminosyre)
- hvis du har en ustabil sukkersyge
- hvis du får kraftig diarré under behandlingen med Penomax.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Penomax og/eller Penomax kan påvirke virkningen af anden medicin.

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager noget af følgende:

- methotrexat (til behandling af gigt, kræft og psoriasis)
- probenecid (til behandling af urinsur gigt).

Du skal også fortælle det til lægen, hvis du tager valproat (medicin mod kramper, som bruges til behandling af epilepsi).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Penomax efter aftale med din læge.

Amning:

Du kan tage Penomax, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Penomax påvirker ikke arbejdsevnen eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PENOMAX

Tag altid Penomax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Du skal tage tabletterne enten i siddende eller stående stilling. Drik mindst et halvt glas vand eller anden væske, når du tager tabletten. Tag helst tabletten sammen med et måltid for at undgå mavegener.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge:

1-2 tabletter 3 gange dagligt.

Børn over 5 år:

1 tablet 3 gange dagligt.

Tabletterne er pakket i strips.

Brugsanvisning:

- Tryk ikke tabletten ud af tabletloppen (fig. 1).
- Bøj strippen og riv en tabletomme af langs med den stiplede linje (fig. 2).
- Fjern forsigtigt folien, begynd i det hjørne, der er markeret med en pil (fig.3).

Figur 1



Figur 2



Figur 3



Hvis du har taget for mange Penomax filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Penomax, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

En meget stor dosis kan medføre kvalme, opkastning og mavekatar (gastritis).

Hvis du har glemt at tage Penomax

Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Vent herefter 4 timer inden du tager næste dosis, så mængden af medicin i din krop forbliver ensartet. Herefter skal du fortsætte med medicinen, som sædvanlig. Husk at tage medicinen regelmæssigt.

Hvis du holder op med at tage Penomax

Tag tabletterne i så lang tid, som din læge har sagt. Det er vigtigt, at du overholder hele behand-

lingsforløbet, selv om du føler dig bedre tilpas efter nogle dage. Hvis du holder op med at tage tabletterne for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Penomax kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

- kvalme
- opkastning
- diarré. Kontakt lægen, hvis du får kraftig diarré, mens du er i behandling med Penomax.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

- udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

- nældefeber
- nedsat mængde af aminosyren carnitin i din krop (det kan medføre træthed eller muskelsvaghed).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- ændringer i antallet af blodlegemer (nedsat antal hvide blodlegemer eller blodplader, øget antal eosinofile celler)
- allergiske reaktioner (**alvorlige** overfølsomhedsreaktioner, som især viser sig ved besværet vejrtrækning, besvimelse på grund af lavt blodtryk, kløe og nældefeber)
- betændelse i spiserøret
- forstyrrelser i leverfunktionen
- drug feber (feber, der skyldes behandlingen)
- svær infektion med svampen candida.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tabletbeholder: Hold tabletbeholderen tæt lukket.

Strip: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevares i den originale yderpakning.

Brug ikke Penomax efter den udløbsdato, der står på strippen og æsken. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Penomax 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Pivmecillinamhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg.
- Øvrige indholdsstoffer i tablettern: MikrokrySTALLinsk cellulose og magnesiumstearat.
- Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket: Hypromellose og glyceroltriacetat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide til råhvide, runde, hvælvede, filmovertrukne tabletter, præget med "F" på den ene side og "48" på den anden side.

Pakningsstørrelser:

Strip: 14, 20 og 30 tabletter.

Tabletbeholder: 100 tabletter. Tabletbeholderen indeholder et tørremiddel.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Dansk distributør:

Orion Pharma A/S

Møllevej 9A

2990 Nivå

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Norge og Sverige: Penomax

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2008