

## **INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**

**Verapamil Mylan 40 mg, 80 mg og  
120 mg filmovertrukne tabletter**

verapamil

## **Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Verapamil Mylan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

## **Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Verapamil Mylan
3. Sådan skal De tage Verapamil Mylan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

## **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Verapamil Mylan er medicin af typen calciumantagonister, der virker på hjerte og kredsløb.

De kan tage Verapamil Mylan tabletter til:

- forebyggelse af hjertekrampe (angina pectoris).
- behandling af for højt blodtryk.
- forebyggelse og behandling af hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

Lægen kan have givet Dem Verapamil Mylan for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## **2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE VERAPAMIL MYLAN**

### **Tag ikke Verapamil Mylan**

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for verapamil eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De lider af en alvorlig sygdom i hjerte eller kredsløb.
- hvis De har meget lavt blodtryk.
- hvis De har fået for meget hjertemedicin (digoxin). Det kan bl.a. vise sig ved kvalme.
- hvis det er mindre end 1 uge siden, De har haft en blod-

prop i hjertet.

- hvis De er overfølsom over for anden medicin, der ligesom Verapamil Mylan tilhører gruppen af såkaldte calciumantagonister.

### **Vær ekstra forsigtig med at tage Verapamil Mylan**

Tal med lægen inden De tager Verapamil Mylan

- hvis De har meget langsom puls.
- hvis De har dårlig lever.
- hvis De har en hjertesygdom.
- hvis De tager (betablokkere) medicin mod forhøjet blod-

tryk eller hjertesygdomme.

Fortæl altid lægen, at De tager Verapamil Mylan, hvis De skal bedøves.

Deres hjertekurve (EKG) og Deres blodtryk skal kontrolleres både før og under behandling med Verapamil Mylan.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Verapamil Mylan.

### **Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis De tager:

- hjertemedicin (digoxin)
- medicin mod uregelmæssig puls (hjerterytme)
- anden medicin mod for højt blodtryk (betablokkere, prazosin)
- vanddrivende medicin

- medicin, som udvider blodårerne
- medicin efter transplantation (ciclosporin)
- medicin mod mani (lithium)
- kolesterolsænkende medicin (simvastatin, lovastatin)
- medicin mod astma (theofyllin)
- naturmedicin mod depression (perikum)
- medicin mod infektion (erythromycin, clarithromycin, rifampicin)
- medicin mod migræne (clonidin)
- epilepsimedicin (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)

- mavesårsmedicin (cimetidin)
- smertestillende medicin (acetylsalicylsyre)
- medicin mod angst og uro (buspiron)
- muskelafslappende medicin
- medicin mod spastiske tilstande (dantrolen)

Hvis De skal bedøves, skal De fortælle lægen, at De tager Verapamil Mylan.

## **Brug af Verapamil Mylan sammen med mad og drikke**

De skal være opmærksom på, at Verapamil Mylan kan forstærke virkningen af alkohol.

De bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt under behandlingen.

## **Graviditet og amning**

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin.

## **Graviditet**

Hvis De er gravid, må De normalt ikke tage Verapamil Mylan. Tal med lægen.

## **Amning**

Hvis De ammer, må De så vidt muligt ikke tage Verapamil Mylan, da verapamil går over i modermælken.

## **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Verapamil Mylan kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give svimmelhed, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Verapamil Mylan**

Verapamil Mylan indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

### **3. SÅDAN SKAL DE TAGE VERAPAMIL MYLAN**

Tag altid Verapamil Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning.  
Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

#### **Voksne:**

1 tablet (40 mg) stigende til 1 tablet (120 mg) 3-4 gange dagligt. Følg lægens anvisninger.

#### **Forhøjet blodtryk:**

Voksne: 1-2 tabletter (120 mg) 2 gange dagligt. Følg lægens anvisninger.

**Ældre:**

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

**Børn:**

De må kun bruge Verapamil Mylan til børn efter lægens anvisning.

**Nedsat nyrefunktion:**

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

## **Nedsat leverfunktion:**

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følge lægens anvisninger.

## **Hvis De har taget for mange Verapamil Mylan tabletter**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Verapamil Mylan tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være: døsighed, forvirring, kramper, kvalme, opkastning, feber, for lavt blodtryk og

ændring af hjertets funktion med langsom hjerterytme.

### **Hvis De har glemt at tage Verapamil Mylan**

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

### **4. BIVIRKNINGER**

Verapamil Mylan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

## **Alvorlige bivirkninger**

*Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):* Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

*Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):* Hurtig puls, besvimelse, alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig eller langsom, evt. uregelmæssig puls.  
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

*Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):* Tarmslyng med voldsomme mavesmerter. Kontakt straks læge eller skadestue.

*Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):* Besvimelse eller bevidstløshed på grund af dårlig hjertefunktion. Ring 112. Astmaanfald. Kontakt lægen.

Alvorlig hudreaktion med blæret udslæt, betændelse og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.

*Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):* Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.

Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig betændelse i huden med blæredannelse.

Rystelammelse (Parkinsons sygdom).

## **Ikke alvorlige bivirkninger**

*Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):* Svimmelhed, sløvhed, træthed, hovedpine, langsom puls, lavt blodtryk, hævede ankler, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, kvalme, kløe, eksem, nældefeber, hårtab, impotens, uregelmæssig menstruation, brystspændinger.

*Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):* Søvnforstyrrelser og livlige drømme, ansigtsrødme, varmekølelse.

*Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):* Overfølsomhed, udebleven menstruation, mælkesekretion hos kvinder, forvirring, depression, mareridt, appetitmangel, øresusen, myrekryben, brænden, prikken og sovende fornemmelser i huden, rødfarvning af fødder og evt. hænder med brændende smerter, synsforstyrrelser, rysten, brystsmerter, smerter i benene ved gang (Claudicatio intermittens), mundtørhed, diaré, mavesmerter, opkastning, muskelkramper, hyppige, små vandladninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte på Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

## **5. OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn. Tag ikke Verapamil Mylan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Tag ikke Verapamil Mylan mere end 6 måneder efter åbning af pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

### **Verapamil Mylan indeholder:**

- Aktivt stof: verapamilchlorid
- Øvrige indholdsstoffer: lactose, magnesiumstearat, carnaubavoks, hypromellose, natriumstivelsesglycolat, talcum, pregelatineret majsstivelse, diethylphthalat, mikrokrySTALLinsk cellulose, titandioxid (E171).

## **Udseende**

Verpamil Mylan er hvide, filmovertrukne tabletter med delekærv.

40 mg: Mærket VL-40 på den ene side og G på den anden side.

80 mg: Mærket VL-80 på den ene side og G på den anden side.

120 mg: Mærket VL-120 på den ene side og G på den anden side.

**Indehaveren af  
markedsføringstilladelsen og fremstiller**

**Indehaveren af markedsføringstilladelsen**

Mylan AB, Yngligagatan 14, 10435 Stockholm, Sverige

**Repræsentant for Danmark**

Mylan ApS, Sluseholmen 2-4, 2450 København SV

**Fremstiller**

Gerard Laboratories Ltd., Baldoyle Industrial Estate,  
Dublin 13, Irland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret  
september 2008