

Lacipil® 2 og 4 mg filmo­ver­truk­ne table­ter

Lacidi­pin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Lacipil® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacipil®
3. Sådan skal du tage Lacipil®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lacipil® udvider blodkarrene, således at blodtrykket falder. Du kan tage Lacipil® tabletter til behandling af forhøjet blodtryk.

Lægen kan have givet dig Lacipil® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LACIPIL®

Tag ikke Lacipil®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for lacidipin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har en forsnævring af hjerteklapperne (aortastenose).

Vær ekstra forsigtig med at tage Lacipil®

Tal med din læge, før du tager Lacipil®, hvis du

- har hjerterytmeforstyrrelser (medfødt eller dokumenteret erhvervet QT forlængelse).
- for nylig har haft en blodprop i hjertet.
- har gentagne anfald af hjertekramper (ustabil angina pectoris).
- har andre hjertesygdomme.
- har alvorlig leversygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge først, hvis du samtidig tager

- medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin).
- medicin mod forhøjet blodtryk eller forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. betablokkere, diuretika eller ACE-hæmmere).
- medicin, der undertrykker immunforsvaret f.eks. efter organtransplantation (cyclosporin).
- medicin mod depression (f.eks. fluoxetin).
- medicin mod skizofreni og andre sindslidelser (f.eks. lithium, haloperidol, perphenazin).
- mod infektion (antibiotika).
- mod allergi (f.eks. terfenadin).
- medicin mod svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol).
- medicin til behandling af epilepsi (phenytoin, carbamazepin).
- medicin til behandling af tuberkulose (rifampicin).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Lacipil®, eller Lacipil® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Lacipil® sammen med mad og drikke

Du kan tage Lacipil® sammen med mad og drikke. Du bør ikke tage Lacipil® sammen med grapefrugtjuice, da det kan ændre virkningen af Lacipil®.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Lacipil®, hvis du er gravid.

Amning

Du må ikke tage Lacipil®, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lacipil® kan give bivirkninger (hovedpine, svimmelhed, kvalme og mavebesvær), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lacipil®

Lacipil® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LACIPIL®

Tag altid Lacipil® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Normalt er begyndelsesdosis 2 mg om dagen.

Dosis kan øges til 4 mg (eller 6 mg).

Du bør tage tabletterne én gang daglig og på

samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen.

Du får først fuld virkning efter 3-4 ugers

behandling.

Børn

Børn må normalt ikke få Lacipil® filmo­ver­truk­ne table­ter.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Lacipil® filmo-vertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lacipil® filmo-vertrukne tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: lavt blodtryk med svimmelhed og tendens til besvimelse, hurtig eller langsom, evt. uregelmæssig puls.

Hvis du har glemt at tage Lacipil®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Lacipil®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Lacipil® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Forværring af angina pectoris. Dvs. forværring af smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Hovedpine, svimmelhed, rødmen, hjertebanken.
- Mavegener, kvalme.
- Hududslæt, kløe, rødmen af huden.
- Forøget urinmængde.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Kraftløshed og svaghed.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Fortykkelse af tandkødet.

Lacipil® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjelse af levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Lacipil® ved almindelig temperatur.

Tag ikke Lacipil® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lacipil® 2 og 4 mg filmo-vertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Lacidipin 2 mg eller 4 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, povidon K 30, magnesiumstearat, opadry white OY-S-7335(E171), PEG 400 (polysorbat 80) og opadry white YS-1-18043(E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Lacipil® 2 mg er en rund, hvid tablet og mærket "2" på den ene side.

Lacipil® 4 mg er en aflang, hvid tablet med delekærv.

Pakningsstørrelser

Lacipil® 2 og 4 mg fås i pakningsstørrelser á 28 og 98 filmo-vertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zcare4

Tømrervej

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

Zcare4

Tømrervej

6710 Esbjerg V.

Lacipil® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited.

Lacipil® svarer til Midotens®.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2010