

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xyzal® 5 mg filmovertrukne tabletter

Levocetirizin dihydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Xyzal® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xyzal®
3. Sådan skal du tage Xyzal®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Xyzal® er et antihistamin til brug mod allergiske reaktioner.

Xyzal® virker ved at hæmme virkningen af histamin, som medvirker ved udviklingen af den allergiske reaktion.

Du kan tage Xyzal® til behandling af

- høfeber (allergisk rhinit)
- helårssnue (persisterende allergisk rhinit)
- kronisk nældefeber.

Lægen kan have givet dig Xyzal® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE XYZAL®

Tag ikke Xyzal®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for levocetirizin dihydrochlorid, andre antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Xyzal®

Anvendelse af Xyzal® anbefales ikke til børn under 6 år, da det med filmovertrukne tabletter ikke er muligt at justere dosis.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Xyzal® sammen med mad og drikke

- Du kan tage Xyzal® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
- Vær forsigtig med at tage Xyzal® samtidig med alkohol, da det kan påvirke centralnervesystemet.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Xyzal® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Xyzal® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xyzal® kan give bivirkninger (døsighed, træthed, kraftsløshed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xyzal®

Xyzal® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE XYZAL®

Tag altid Xyzal® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er
Voksne og unge fra 12 år:
1 tablet dagligt.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn i alderen 6-12 år: 1 tablet dagligt.

Børn mellem 2-6 år:

Du kan normalt ikke bruge Xyzal® 5 mg filmovertrukne tabletter til børn mellem 2 og 6 år.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Xyzal® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Xyzal® tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer hos voksne kan være døsighed og hos børn uro og ophidselse efterfulgt af træthed.

Hvis du har glemt at tage Xyzal®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Xyzal® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Kræmper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Døsighed, træthed.
- Hovedpine.
- Mundtørhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Mavesmerter, kraftesløshed.

Hyppigheden er ikke kendt (sandsynligvis sjælden):

- Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Åndenød eller åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Rastløs uro.
- Synsforstyrrelser.
- Hjertebanken.
- Kvalme.
- Kløe, udslæt, nældefeber.
- Muskelsmerter.
- Vægtøgning.

Xyzal® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktionsværdier, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Xyzal® ved almindelig temperatur. Tag ikke Xyzal® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Xyzal® 5 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: 5 mg levocetirizin dihydrochlorid.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, kolloid vandfri silica, magnesiumumstearat, hypromellose (E 464), titandioxid (E 171), makrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid til grålig hvid, oval filmovertrukket tablet mærket med Y på den ene side.

Pakningsstørrelser

Xyzal® fås i pakningsstørrelser á 30 og 90 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zcare4

Tømrervej

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

Zcare4

Tømrervej

6710 Esbjerg V.

Xyzal® er et registreret varemærke, der tilhører UCB Farchim S.A.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2009