

Pamol® suppositorier 125 mg og 500 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pamol
3. Sådan skal du bruge Pamol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pamol er et smertestillende lægemiddel til behandling af svage til moderate smerter. Pamol virker febernedsættende.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pamol

Brug ikke Pamol:

- hvis du er allergisk over for paracetamol eller hårdfedt
- hvis du har stærkt nedsat leverfunktion

Advarsler og forsigtighedsregler



Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Pamol

Pamol bør anvendes med forsigtighed, hvis du:

- har nedsat leverfunktion
- lider af kronisk alkoholisme
- har stærkt nedsat nyrefunktion

Hvis du får høj feber, tegn på infektion eller hvis dine symptomer varer i mere end 3 dage, skal du altid kontakte lægen.

Overskrides den anbefalede dosis kan der opstå livstruende forgiftning. Ved mistanke om overdosering bør du straks søge læge.

Vanemæssig og samtidig brug af flere forskellige smertestillende lægemidler kan medføre nyreskader med risiko for nyresvigt.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin sammen med Pamol

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen inden du tager Pamol, hvis du er i behandling med en eller flere af følgende slags medicin:

- medicin mod urinsur gigt (probenecid)
- smertestillende medicin (salicylamid, diflunisal)
- medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, domperidon)
- medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)
- blodfortyndende medicin (warfarin, andre coumariner)
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin)

For at undgå overdosering skal du sikre dig, at medicin du bruger samtidigt med Pamol ikke også indeholder paracetamol.

Brug af Pamol® sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan bruge Pamol® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Et samtidigt kronisk forbrug af alkohol kan øge risikoen for leverforgiftning.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Pamol.

Graviditet

Du må gerne bruge Pamol, når du er gravid,

Amning

Du må gerne bruge Pamol, når du ammer.

Fertilitet

Paracetamol er vist ikke at have effekt på mandlig eller kvindelig fertilitet

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pamol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Pamol

Pamol suppositorier føres op i endetarmen med den flade ende først. Indføring sker lettest siddende foroverbøjet på toilettet eller liggende på siden med bøjede ben.

Brug altid Pamol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug til voksne:

500 – 1000 mg 3 – 4 gange i døgnet.

Brug til børn og unge:

Den anbefalede daglige dosis paracetamol er op til 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 – 4 doser for eksempel:

Vægt 10 kg: 125 mg højst 4 gange i døgnet

Vægt 20 kg: 250 mg højst 4 gange i døgnet

Vægt 30 kg: 500 mg højst 3 gange i døgnet

Vægt 40 kg: 500 mg højst 4 gange i døgnet

Til børn under 30 kg skal Pamol suppositorier 125 mg anvendes.

Det er vigtigt at overholde en dosering, der er tilpasset barnets vægt. Doseringen bør være jævnt fordelt over hele døgnet; herved undgås smerte- og feberudsving.

Pamol bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har brugt for mange Pamol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt flere Pamol end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter. Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlnæring eller personer i behandling med lægemidler der påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering. Overdosering er meget alvorlig og kan i værste tilfælde være dødelig - det er derfor vigtigt straks at søge læge.

Hvis du har glemt at bruge Pamol

Hvis du har glemt at tage en dosis Pamol, kan du tage den så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger som kan forekomme efter brug af Pamol

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Nældefeber, udslæt, påvirkning af leveren (alvorlig), herunder leverforgiftning og leversvigt, allergisk reaktion.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Overfølsomhedsreaktion f.eks. allergisk chok eller allergisk reaktion (alvorlig), almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer)(alvorlig), blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)(alvorlig) og påvirkning af luftvejene.

Ved langtidsbehandling er der risiko for nyreskader.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Pamol skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Pamol ved almindelig temperatur.

Brug ikke Pamol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er paracetamol. Derudover indeholder Pamol hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelse

Pamol suppositorier er hvide, aflange stikpiller, der er spidse i den ene ende og flade i den anden.

Pamol suppositorier findes i pakninger à 10 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerger 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Oy Leiras Finland Ab
Industrigatan
FIN-10600 Ekenäs

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2013