

Dalacin C® 2% vaginalcreme

Clindamycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Dalacin C® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dalacin C®
3. Sådan skal De bruge Dalacin C®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dalacin C® vaginalcreme er et antibiotikum, der stopper bakteriernes vækst.

De kan bruge Dalacin C® vaginalcreme mod betændelse i skeden, der skyldes bakterier, som Dalacin C® virker på.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE DALACIN C®

Brug ikke Dalacin C®:

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De har haft tarmbetændelse eller i forbindelse med antibiotikabehandling har haft blødende tyktarmsbetændelse.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Dalacin C®

Kontakt lægen, hvis betændelsen bliver værre, eller der kommer en ny betændelse, eller hvis De får kraftig eller vedvarende diaré under behandlingen. De bør ikke have samleje eller bruge andre produkter i skeden (tamponer eller udskylning) under behandlingen med Dalacin C® vaginalcreme. De bør ikke bruge Dalacin C® samtidig med kondom eller pessær, da indholdsstofferne i Dalacin C® kan ødelægge gummet, så midlerne ikke virker. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Dalacin C®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen hvis De samtidig tager muskelafslappende medicin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må ikke bruge Dalacin C® de første 3 måneder af graviditeten uden lægens anvisning. De kan bruge Dalacin C® i de sidste 6 måneder af graviditeten.

Amning:

Erfaringerne med Dalacin C® vaginalcreme er begrænsede. Hvis De ammer, må De så vidt muligt ikke bruge Dalacin C®. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin C® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE DALACIN C®

Brug altid Dalacin C® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:


1 fyldt applikator (5 gram) i skeden til natten i 3-7 på hinanden følgende dage.

Brugsanvisning:


1 tube Dalacin C® vaginalcreme og 7 plastikapplikatorer (sprøjter) følger med denne pakning.

Applikatorerne bruges til at indføre cremen i skeden.

1. Skru låget af tuben og sæt en plastikapplikator fast på gevindet.
2. Tryk forsigtigt cremen ned i applikatoren. Applikatoren er fyldt, når stemplet er helt ude.
3. Fjern applikatoren fra tuben og skru låget på igen.
4. Læg Dem på ryggen og før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt. Tryk forsigtigt stemplet i bund.



5. Træk forsigtigt applikatoren ud af skeden. Applikatoren smides bort.



Hvis De har brugt for meget Dalacin C®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Dalacin C®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Hvis De har glemt at bruge Dalacin C®

Hvis De har glemt at tage en behandling, skal De tage denne næste dag ved sengetid.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Dalacin C® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodforgiftning med svampe. Feber, almen sygdomsfølelse.
- Unormalt fødselsforløb.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1 til 10 ud af 100 patienter):

- Mavekrampe.
- Kløe.
- Vaginal svamp.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter)

- Næseblod.
- Hovedpine, svimmelhed.
- Mavesmerter, dårlig ånde, luftafgang fra tarmen, opkastning, kvalme, sure opstød, diarré, forstoppelse.
- Udslæt, rødmen af huden, nældefeber.
- Smerter og svien ved vandladningen, sukker i urinen, skummende urin pga. æggehvistof i urinen.
- Vaginalsmerter, udflåd.
- Betændelse i og omkring skeden.
- Betændelse i urinveje.
- Svampeinfektion.
- Allergisk reaktion.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Betændelse i øvre luftveje, bakteriel infektion, infektion i skeden.
- Smerter, hævelser.
- Forhøjet stofskifte.
- Smagsforstyrrelser.
- Mavesmerter, oppustethed, mavetarm forstyrrelser.
- Kløe, hudsvamp.
- Rygsmerter.
- Menstruationsforstyrrelser, bækkenmerter, forekomst af livmoderslimhinden uden for

livmoderen (endometriose), uregelmæssig, kraftig blødning.

Hyppighed ikke kendt:

- Ændret bakteriefloora.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dalacin C® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dalacin C® vaginalcreme 2% indeholder:

- Aktivt stof: clindamycin 20 mg/g som clindamycinphosphat.
- Øvrige indholdsstoffer: sorbitanmonostearat; polysorbat 60; propylenglycol; stearinsyre; cetostearylalkohol; cetylpalmitat; paraffinolie; benzylalkohol; rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Dalacin C® vaginalcreme er en hvid halvfast creme. Vaginalcremen findes i en 40 gram plasttube vedlagt 7 applikatorer.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg

Dalacin C® svarer til Dalacin®

Dalacin C® er et registreret varemærke, der tilhører Pharmacia & Upjohn Company LLC.

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www.indlaegsseddel.dk