

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lomudal 20 mg/ml, øjendråber, enkeltdosisbeholder

Natriumcromoglicat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Lomudal uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Lomudal.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

Øversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lomudal
3. Sådan skal du bruge Lomudal
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lomudal indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i øjnene.

Du kan bruge Lomudal øjendråber til behandling af

- Allergisk øjenbetændelse.
- Betændelse i øjets bindehinde og hornhinde.
- Betændelse i øjet med små sår i øjets hornhinde.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Lomudal for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Vær opmærksom på, at betændelse i øjets hornhinde kan være alvorligt. Tal med lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE LOMUDAL

Brug ikke Lomudal, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for natriumcromoglicat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Lomudal og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Lomudal under graviditet.

Amning

Du kan bruge Lomudal, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomudal kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LOMUDAL

Hvis din læge har ordineret Lomudal til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 7 år: 1 dråbe i hvert øje 4 gange daglig.

Børn under 7 år

Du må kun bruge Lomudal til børn under 7 år efter aftale med lægen.

Brugeranvisning

Træk det nederste øjenlåg lidt ned, og dryp en dråbe i mellemrummet mellem øjet og øjenlåget.
Pas på at spidsen af flasken ikke rører øjet.
Slip øjenlåget og blink nogle gange, så dråben fordeles over hele øjet.

Gentag dette i det andet øje.

Hvis du har brugt for meget Lomudal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Lomudal, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Lomudal

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at bruge en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Lomudal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter)

- Forbigående svien.
- Lokal irritation i øjet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Overfølsomhedsreaktioner.

Hyppigheden er ikke kendt

- Brændende eller stikkende følelse efter drypning af øjet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Lomudal øjendråber utilgængeligt for børn.
Inden åbning kan du opbevare Lomudal øjendråber ved almindelig temperatur.
Opbevar ikke en åbnet enkelt dosisbeholder.

Brug ikke Lomudal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lomudal 20 mg/ml øjendråber indeholder:

Aktivt stof: Natriumcromoglicat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, sterilt vand.

Lomudals udseende og pakningsstørrelse

Pakningsstørrelser

Lomudal øjendråber i endosisbeholdere findes i pakninger à 20 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller

Sanofi-aventis Deutschland GmbH, Frankfurt, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2008

sanofi aventis