

Questran® 4 g, pulver til oral suspension Colestyramin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen, De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Questran® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før de begynder at tage Questran®
3. Sådan skal De tage Questran®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Questran® binder tarmens galdesyrer, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyrer til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.

De kan bruge Questran® til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. De kan også bruge Questran® mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diaré som skyldes for meget galdesyre i tarmen.

Lægen kan have givet Dem Questran® for noget andet. Følg altid lægens anvisninger.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE QUESTRAN

Tag ikke Questran® hvis:

- De er overfølsom over for det colestyramin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- De har fuldstændig blokering af galdevejene (med meget svær gulsot).
- De har sivende eller blodig diaré.

Særlige forholdsregler

Questran® kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin, samt folinsyre. Tal med Deres læge om tilskud af folinsyre og vitaminer.

Fortæl Deres læge hvis De lider af:

- Diabetes.
- Nedsat stofskifte eller har
- leverproblemer.
- Dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan tage Questran® sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De tager:

- blodfortyndende medicin,
- medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin),
- vanddrivende medicin (chlorthiazid),
- anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre),
- medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin),
- epilepsimedicin (phenobarbital),
- medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner),
- hjertemedicin (digoxin).

De skal tage medicinen mindst en time før eller 4-6 timer efter Questran®.

Brug af Questran® sammen med mad og drikkevarer

De kan udrøre Questran® i vand, saft, juice eller andre drikkevarer. De kan også udrøre Questran® i supper eller frugtmos.

Graviditet og Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Questran® efter lægens anvisning.

Amning:

Erfaringer med Questran® er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Questran®

Indeholder fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. SÅDAN SKAL DE TAGE QUESTRAN

Tag altid Questran® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering:

Voksne:

1-2 breve (4-8 g) 3 gange daglig.

Børn:

½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til voksendosis.

De må ikke tage Questran® tørt. De skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtag. De kan også blande pulveret i mad.

De skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran®.

Hvis De har taget for meget Questran®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Questran®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Questran®.

Hvis De har glemt at tage Questran®

Hvis De har glemt at tage en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Questran®

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Questran®. Kontakt straks lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandlingen med Questran® er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Questran® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne og meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

- Allergiske reaktioner med hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Søg straks læge eller skadestue.
- Forstoppelse med voldsomme mavesmerter. Søg straks læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Knogleskørhed (på grund af D-vitamin mangel), blødningstendens (på grund af K-vitamin mangel). Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen, kvalme, opkastning, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Halsbrand, appetitmangel, fedtdiaré (ved anvendelse af høje doser), udslett, irritation af hud og slimhinder.

Sjældne og meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

- Smerter i bughulen.
- Allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Natteblindhed (på grund af A-vitaminmangel).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Questran® utilgængeligt for børn.
- Tag ikke Questran® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Questran® 4 g, pulver til oral suspension indeholder

Aktive stof: colestyramin.

Øvrige indholdsstoffer: xanthangummi (E415), kelcoloid (E405), vandfri citronsyre (E330), appelsinsmagsstof, vandfri kolloid silica, aspartam (E951).

Pakningsstørrelser:

Questran®, pulver til oral suspension findes i pakninger med 50 breve.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

SinGad Pharma ApS
Vibe Allé 5, blok 2B
2980 Kokkedal

Ompakket og frigivet af

SinGad Pharma ApS
Vibe Allé 5, blok 2B
2980 Kokkedal

Questran® er et registreret varemærke, som tilhører Mead Johnson & Company, a corporation of the State of Delaware, 2404, Pennsylvania Street, Evansville, Indiana, USA.

Denne indlægsseddel blev senest opdateret maj 2009