

Heparin LEO 25.000 anti-Xa IE/ml, hætteglas, injektionsvæske, opløsning

Heparinnatrium

Læs denne indlægseddél grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægseddelen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Øversigt over indlægseddelen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Heparin LEO
3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Heparin forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne. Heparin LEO kan også opløse nogle former for blodpropper. Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje.

Du kan få Heparin LEO til forebyggelse og behandling af blodpropper.

Lægen kan give dig Heparin LEO for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE OM Heparin LEO

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du

- er overfølsom over for heparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har eller har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin
- er gravid og skal have rygmarvsbedøvelse (epidural) under fødslen
- har stor risiko for blødning. Det kan være, hvis du
 - har mavesår
 - har hjerneblødning
 - har betændelse i hjerteklapperne
 - er gravid og har stor risiko for abort
 - har forstyrrelser i blodets evne til at størkne
 - skal opereres i øjne, ører eller centralnervesystemet
 - har meget forhøjet blodtryk
 - har meget dårlig lever

For tidligt fødte eller nyfødte må ikke få Heparin LEO, da det indeholder benzylalkohol.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Heparin LEO

- Tal med lægen, inden du får Heparin LEO, hvis du
- har forhøjet blodtryk
 - har dårlig lever eller nyrer
 - har for få blodplader i blodet
 - har diabetes
 - har for meget kalium i blodet eller tager kaliumbesparende, vanddrivende medicin
 - tager eller skal tage blodfortyndende medicin og anden medicin mod blodpropper

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du har fået rygmarvsbedøvelse og får rygsmerter eller følelsesløshed, stivhed eller svaghed i benene og får problemer med tarm- og blærefunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heparin LEO. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Så længe du er i behandling med Heparin LEO vil din læge rutinemæssigt tage blodprøver.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

- Medicin mod gigt eller smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, NSAID).
- Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
- Anden medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper.
- Medicin mod alvorlig blodforgiftning (aktiveret protein C).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke få Heparin LEO, hvis du er gravid. Det indeholder benzylalkohol, der kan skade fostret. Husk at informere lægen.

Amning

Du kan få Heparin LEO, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Heparin LEO

- Indeholder 10 mg benzylalkohol pr. ml. For tidligt fødte og nyfødte må ikke få benzylalkohol. Benzylalkohol kan give livsfarlig forgiftning og allergi hos spædbørn og børn op til 3 år.
- Indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.
- Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED Heparin LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Heparin LEO i en blodåre.

Heparin LEO må aldrig sprøjtes ind i en muskel.

Hvis du har fået for meget Heparin LEO

Kontakt læge eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Heparin LEO. Du kan få blødninger, f.eks. fra slimhinder, sår på huden, fra mavetarmkanalen og underlivet, hvis du får for meget Heparin LEO.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Heparin LEO kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almindelige bivirkninger: (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (i sjældne tilfælde også blodpropper) pga. for få blodplader i blodet. Kan opstå længe efter ophør med behandlingen.
- Blødninger i indre organer, hjerne, øjne, ører.

Sjældne bivirkninger: (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

- Mangel på hormonet aldosteron.
Symptomerne er:
 - Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (specielt hvis du har diabetes eller dårlige nyrer). I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejtrækning.
 - Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for meget kalium i blodet. For meget kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).

Meget sjældne bivirkninger: (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt.
- Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i benene samt vandladningsbesvær pga. blodansamling i ryggraden eller omkring rygmarven ved samtidig brug af rygmarvsbedøvelse.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).

- Irritation, smerter og blodansamling ved stedet for indsprøjtning.

Ikke almindelige bivirkninger: (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede).

- Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (ved langvarig behandling). Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
- Hududslæt, nældefeber og kløe.

Sjældne bivirkninger: (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

- Forandringer i huden med sår og vævsdød.
- Overfølsomhedsreaktioner.

Meget sjældne bivirkninger: (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede).

- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Forbigående hårtab ved langtidsbehandling med Heparin LEO.

Heparin LEO kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, urinprøver etc. herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Heparin LEO skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Heparin LEO ved almindelig temperatur.

Brug ikke Heparin LEO efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Heparin LEO, hvis der er uklarheder eller synlige partikler i hætteglasset.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Heparin LEO 25.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Heparinatrium.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat, benzylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), fortyndet saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Heparin LEO er en klar, farveløs eller gul væske, fri for uklarhed og synlige partikler, i hætteglas med 2 ml.

Pakningsstørrelser

Heparin LEO er i pakninger med 10 hætteglas med 2 ml.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN OG FREMSTILLER:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S
Industriparken 55,
2750 Ballerup

Fremstiller

LEO Pharma A/S
Industriparken 55,
2750 Ballerup

Denne seddel blev sidst revideret oktober 2008



LEO