

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bricanyl® Turbohaler®

inhalationspulver 0,5 mg/dosis

Terbutalinsulfat

01-2015
P028348-8

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl® Turbohaler®
3. Sådan skal du bruge Bricanyl® Turbohaler®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Inhalationspulveret følger med indåndingsluften ned i lungerne, når du trækker vejret dybt gennem mundstykke.

Virkning

Bricanyl® Turbohaler® indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Bricanyl® Turbohaler® virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i ca. 6 timer.

Anvendelse

Du kan bruge Bricanyl® Turbohaler® til behandling af astmaanfald og andre former for vejtrækningsbesvær. Du bør kun bruge Bricanyl® Turbohaler®, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl® Turbohaler® som vedligeholdelsesbehandling.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl® Turbohaler®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Bricanyl® Turbohaler®

- Hvis du er allergisk over for terbutalinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bricanyl® Turbohaler® (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Bricanyl® Turbohaler® hvis

- du har hjertesygdomme, uregelmæssig hjerterytme eller smerter ved hjertet (angina). Kontakt lægen hvis du oplever brystsmerter eller andre symptomer på forværring af din hjertesygdom.
- du er i behandling med digoxin eller anden hjertemedicin.
- du har sukkersyge.
- du har for højt stofskifte (tyreotoksikose).

Det tilrådes at skylle munden med vand efter hver inhalation af Bricanyl® Turbohaler® for at undgå optagelse af det virksomme stof via mundens slimhinde.

Lægen bør regelmæssigt kontrollere din inhalationsteknik samt justere til den mest optimale dosis.

Kontakt lægen, hvis medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Bricanyl® Turbohaler® stiger.

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astma-medicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl® Turbohaler®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du bruger

- medicin mod forhøjet blodtryk, hjertesygdomme eller visse øjendråber (såkaldte betablokkere, spørg lægen).
- xanthinderivater, steroider og vanddrivende lægemidler (da det kan give lavt indhold af kalium i blodet).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Bricanyl® Turbohaler® under graviditet. Der bør dog udvises forsigtighed i første trimester af graviditeten.

Bricanyl® Turbohaler® kan hæmme veer under fødsel.

Amning

Bricanyl® Turbohaler® går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Bivirkninger i form af irritabilitet og øget hjerterytme hos det ammede barn kan dog ikke udelukkes. Der er hos for tidligt fødte børn set for lavt indhold af blodsukker i blodet. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl® Turbohaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Bricanyl® Turbohaler®

Brug altid Bricanyl® Turbohaler® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Du bør kun bruge Bricanyl® Turbohaler®, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling.

Børn kan i starten af behandlingen med Bricanyl® Turbohaler® have brug for hjælp fra en voksen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne, børn 12 år og ældre

0,5 mg efter behov. I svære tilfælde kan dosis øges til 1,5 mg. Du bør ikke bruge mere end 6 mg i døgnet.

Børn i alderen fra 3-11 år

0,25 mg - 0,5 mg efter behov. I svære tilfælde kan dosis øges til 1 mg. Du bør ikke bruge mere end 4 mg i døgnet.

Bricanyl® Turbohaler® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge Bricanyl® Turbohaler® 0,5 mg til alle de anførte doseringer.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning

1. Skru beskyttelseshætten af.
2. Hold Bricanyl® Turbohaler® lodret med bundstykket nedad.
Drej bundstykket én gang frem og tilbage til der lyder et klik.
3. Pust ud (**ikke** i Bricanyl® Turbohaler®).
4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring.
Tag så **kraftig** og **dyb** en indånding som muligt.
Tyg eller bid ikke i mundstykket.
Anvend ikke Bricanyl® Turbohaler® hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.
5. Tag Bricanyl® Turbohaler® væk fra munden og ånd langsomt ud.
6. Hvis du skal tage et sug mere, skal du gentage trin 2-5.
7. **Skrub beskyttelseshætten på.**

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og skru altid beskyttelseshætten på efter brug.
Bricanyl® Turbohaler® afgiver ved korrekt brug altid en dosis Bricanyl®, også hvis der er blevet drejet flere gange.
Da mængden af medicin pr. sug er meget lille, er det muligt at du hverken kan smage eller fornemme den.
Fra Bricanyl® Turbohaler® indånder du kun det virksomme stof (terbutalinsulfat), der er ingen hjælpestoffer.
Skyl munden efter brug af Bricanyl® Turbohaler® for at undgå optagelse af det virksomme stof via mundens slimhinde.

Rengøring

Rengør mundstykket med en tør klud.
OBS: Du må ikke gøre mundstykket rent med vand.
Skrub altid beskyttelseshætten på efter brug.

Når det røde mærke kommer til syne øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage.
Dosisindikatoren tæller antal klik. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Bricanyl® Turbohaler® tom, og du skal kassere den.

I bunden af Bricanyl® Turbohaler® er der et tørremiddel. Den lyd der kommer, når du ryster Bricanyl® Turbohaler®, stammer fra dette tørremiddel og ikke fra medicinen!

Hvis du har brugt for meget Bricanyl® Turbohaler®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Bricanyl® Turbohaler®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er hovedpine, angst, rysten, kvalme, muskelkrampe, hjertebanken, øget hjerterytme, uregelmæssig puls og evt. blodtryksfald (besvimelse).

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter*):

- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: (*forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter*):

- Hovedpine.
- Rysten.

Almindelige bivirkninger: (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter*):

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjerrestop). Tal med lægen.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtigt og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjertebanken.
- Længerevarende muskelkrampe.

Sjældne bivirkninger: (*forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter*):

- Søv- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, uro og rastløshed.
- Uregelmæssig puls på grund af ekstra hjerteslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Lokal iltmangel i hjertemuskulaturen, som skyldes manglende blodtilførsel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Kvalme.
- Nældefeber, udslæt.
- Ekstra hjerteslag.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Bricanyl® Turbohaler® utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Bricanyl® Turbohaler® ved almindelig temperatur.
Opbevares tørt.
Skal opbevares med beskyttelseshætten skruet tæt på.
Brug ikke Bricanyl® Turbohaler® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl® Turbohaler® indeholder:
Aktivt stof: Terbutalinsulfat.

Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Bricanyl® Turbohaler® er en flerdosis pulverinhalator. Inhalatoren er hvid med en lyseblå drejeanordning.

Pakningsstørrelse
Bricanyl® Turbohaler® 0,5 mg/dosis fås i en pakningsstørrelse á 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen
2care4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af
2care4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V.

Bricanyl® og Turbohaler® er registrerede varemærker, som tilhører AstraZeneca-koncernen.

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2015