

0823405906

Alzen® SR svarer til lægemidlet Seroquel® Prolong.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Alzen® SR til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlaegsseddel.dk

- Oversigt over indlægssedlen:**
1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Alzen® SR
 3. Sådan skal De bruge Alzen® SR
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Alzen® SR er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). Alzen® SR dæmper aktiviteten i bestemte områder af hjernen, som har betydning for symptomerne ved sindslidelser.

- De kan tage Alzen® SR ved:
- skizofreni, herunder til forebyggelse af tilbagefald hos stabile patienter.
 - mani i forbindelse med manio-depressiv sygdom.
 - depressive episoder i forbindelse med manio-depressiv sygdom.
 - forebyggelse af tilbagevendende maniodepressive sygdomsperioder.
 - behandling af depression sammen med anden medicin mod depression.

Lægen kan have givet Dem Alzen® SR for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE ALZEN® SR

Tag ikke Alzen® SR hvis De:

- er overfølsom over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alzen® SR.
- tager medicin mod:
 - HIV.
 - svamp (fx fluconazol, ketoconazol, itraconazol, voriconazol).
 - betændelse (erythromycin, clarithromycin).
 - depression (nefazodon).

Vær ekstra forsigtig med at tage Alzen® SR

Tal med lægen, hvis:

- De har forhøjet kolesterol i blodet.
- De har eller har haft dårligt hjerte.
- nogen i Deres familie har en arvelig hjertesygdom med hurtig, uregelmæssig puls og ændring i hjerterytmen (QT-forlængelse).
- De har lavt kalium eller magnesium i blodet.
- De har haft et slagtilfælde.
- De eller en anden i Deres familie har haft blodpropper, i det lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
- De lider af demens.
- De har diabetes (sukkersyge).
- De har epilepsi eller har haft krampes af anden årsag.
- De tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer.

Børn og unge under 18 år bør ikke blive behandlet med Alzen® SR pga. manglende viden om sikkerheden ved behandling af denne aldersgruppe.

Selv mordstanker og forværring af Deres depression eller angst

Hvis De er deprimeret og/eller lider af angst, kan De sommetider have selv mordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv. Disse tanker kan forstærkes, når De starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. De kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis De tidligere har haft selv mordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv.
- Hvis De er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selv mordadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på Dem selv, **bør De straks kontakte Deres læge eller hospitalet.**

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at De er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kan eventuelt bede dem om at fortælle Dem, hvis de synes, at Deres depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i Deres opførsel.

- Vær opmærksom på følgende:**
- Hvis De får høj feber, sløret bevidsthed, muskelstivhed og stærk svedtendens. Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp. Ring 112.
 - Hvis De får smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 - Hvis De bliver alment sløj med tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 - Hvis De får langsomme, ufrivillige bevægelser. Kan forværres eller opstå efter behandlingen er ophørt. Kontakt lægen.
 - Hvis De bliver døsig og sløv. Ses oftest inden for de første 3 dage af behandlingen. Kontakt lægen, da behandlingen måske skal ophøre.
 - Hvis De bliver svimmel og evt. besvimer ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling. Det kan øge risikoen for faldulykker hos ældre. Ses oftest inden for de første uger af behandlingen.
 - Hvis De får voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt lægen.
 - Hvis De får synkebesvær. Særlig hos patienter med lungebetændelse pga. væske eller føde i luftvejene. Kontakt lægen.
 - Hvis De får hyppig vandladning, voldsom tørst, mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og krampes. Kontakt lægen.
 - Hvis De får rokkende, vridende bevægelser, især med benene, generende rastløshed med behov for at bevæge sig hyppigt, med manglende evne til at sidde eller stå stille. Ses oftest inden for de første par uger af behandlingen.
 - Alzen® SR kan give vægtøgning. Tal med lægen, hvis De tager på i vægt.
 - Alzen® SR må ikke tages af ældre demente personer. Alzen® SR tilhører en gruppe af lægemidler, som kan øge risikoen for slagtilfælde, eller i nogle tilfælde øge risikoen for dødsfald hos ældre demente personer.
 - De skal være forsigtig med at drikke alkohol, da Alzen® SR sammen med alkohol kan gøre dig søvnig.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Alzen® SR. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

- De må ikke tage Alzen® SR, hvis De tager medicin mod:
- HIV.
 - svamp (fx ketoconazol, itraconazol, fluconazol, voriconazol).
 - infektioner (erythromycin eller clarithromycin).
 - depression (nefazodon).

- Tal med lægen, hvis De tager
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin).
 - sovemedicin.
 - medicin mod nervøsitet og uro (thioridazin).
 - vanddrivende medicin.
 - medicin for hjertets rytme (amiodaron, sotalol).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Alzen® SR, eller Alzen® SR kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker flere oplysninger herom.

Indvirkning på narkotikatest

Hvis De skal have taget en urinprøve til en narkotikatest, kan behandling med Alzen® SR medføre et positivt svar i nogle bestemte testmetoder, selvom De ikke har taget metadon. Det samme gør sig gældende for nogle typer af medicin mod depression (tricykliske antidepressiva). Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test.

Brug af Alzen® SR sammen med mad og drikke

De må ikke tage Alzen® SR i forbindelse med et måltid.

De skal være forsigtig, hvis De drikker alkohol. Alzen® SR sammen med alkohol kan være søvndyssende.

De bør ikke drikke grapefrugtjuice, når De tager Alzen® SR, da det kan påvirke virkningen af lægemidlet.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Alzen® SR efter aftale med lægen.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Alzen® SR i sidste trimester (de sidste 3 måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis Deres baby får nogen af disse symptomer skal De kontakte Deres læge.

Amning

Hvis De ammer må De ikke tage Alzen® SR, da Alzen® SR går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alzen® SR kan give bivirkninger i form af døshed, svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Disse bivirkninger forsvinder normalt, når De har taget depottabletterne et stykke tid. De bør derfor, specielt i starten af behandlingen, være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker Dem.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Alzen® SR

Alzen® SR indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE ALZEN® SR

Tag altid Alzen® SR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

- De skal tage Alzen® SR én gang dagligt uden samtidig fødeindtagelse.
- De skal synke depottabletterne hele med et glas vand.
- De må ikke dele, tygge eller knuse depottabletterne.

Medicinen fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at de ikke nødvendigvis kan bruge Deres tabletter til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er: Voksne

Skizofreni/mani

Depottabletterne bør tages mindst 1 time før et måltid. Dosis ved behandlingsstart er 300 mg den første dag og 600 mg den anden dag. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 600 mg dagligt. Lægen kan øge Deres dosis til 800 mg efter behov.

Depression i forbindelse med maniodepressiv sygdom

Depottabletten bør tages ved sengetid.

- Dosis de første 4 dage af behandlingen er:
- Dag 1: 50 mg 1 gang dagligt.
 - Dag 2: 100 mg 1 gang dagligt.
 - Dag 3: 200 mg 1 gang dagligt.
 - Dag 4: 300 mg 1 gang dagligt.

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 300 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til 600 mg efter behov.

Ved doser over 300 mg bør behandlingen varetages af en læge med erfaring i behandling af maniodepressiv sygdom.

Forebyggelse af tilbagevendende maniodepressive sygdomsperioder

Depottabletten bør tages ved sengetid. Lægen vil tilpasse Deres dosis. Den sædvanlige dosis er mellem 300 mg og 800 mg dagligt.

Behandling af depression sammen med anden medicin

Depottabletten bør tages inden sengetid. Dosis de første 4 dage af behandlingen er:

- Dag 1: 50 mg 1 gang dagligt.
- Dag 2: 50 mg 1 gang dagligt.
- Dag 3: 150 mg 1 gang dagligt.
- Dag 4: 150 mg 1 gang dagligt.

Lægen vil herefter tilpasse Deres dosis.

Ældre

Det er normalt nødvendigt at ændre dosis. Sikkerhed og virkning ved behandling af depressive episoder ved mani-depressiv sygdom er ikke undersøgt. Følg lægens anvisninger.

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år skal normalt ikke have Alzen® SR.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Alzen® SR depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Alzen® SR, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er søvnighed, sløvhed, hurtig puls og svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk. Endvidere alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls, krampetanfald, epilepsi, muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin, svækket vejrtrækning, besvær med at lade vandet, forvirring og rastløs uro.

Hvis De har glemt at tage Alzen® SR

Hvis De har glemt en dosis, så tag den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Alzen® SR

- Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Alzen® SR.
- Hvis De stopper behandlingen pludseligt, kan De få kvalme, hovedpine, diarré, opkastning eller blive søvnløs, svimmel eller irriteret. Det anbefales at stoppe gradvist med behandlingen over en periode på mindst 1-2 uger.
- Kontakt straks lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandlingen med Alzen® SR er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Alzen® SR kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd. Kontakt lægen. Selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Alzen® SR eller kort efter behandlingsophør (se pkt. 2).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

- Kræmper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Træthed, kuldsår, tør fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- Høj feber, sløret bevidsthed, muskelstivhed, stærk svedtendens (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt lægen.

- Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.
- Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsnes og føres med blodet til lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer skal du søge læge omgående.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Muskelsmerter, muskelsvaghed, eler brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger hvor hypigheden ikke er kendt:

- Kraftig afskalning eller afstødning af huden. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

- Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol og/eller fedt i blodet.
- Døsighed
- Hovedpine, svimmelhed.
- Vægtøgning.
- Symptomer ved ophør af medicinen såsom søvnløshed, kvalme, opkast, hovedpine, diarré, irritabilitet.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis De tager Alzen® SR i mere end 2-3 uger, skal De passe på Deres mundhygiejne, så De ikke får huller i tænderne. Tal med Deres tandlæge.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjerterbanken.
- Svimmelhed, evt. hurtig puls og besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. Forekommer især i de første 2 uger af behandlingen eller ved øgning af dosis. Kan medføre fald.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorlig. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge.
- Hyppig vandladning, tørst og træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. Hvis De har diabetes (sukkersyge), kan den i sjældne tilfælde forværes.
- Opkastning, forstoppelse, sure opstød, halsbrand, øget appetit.
- Hævede fødder, ankler og hænder.
- Krafteløshed og svaghed
- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Meget langsomme, ufrivillige, vridende bevægelser.
- Abnorme drømme og mareridt. Irritabilitet.
- Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan blive en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Snue. Sløret syn.
- Irritabel adfærd.
- Mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens.
- Feber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

- Langsomme, ufrivillige bevægelser. Uro i benene.
- Blegthed og træthed pga. blodmangel.
- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkræmper og koma. Tal med lægen.
- Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Sukkersyge kan blive en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Impotens.
- Overfølsomhed, herunder allergiske hudreaktioner.
- Synkebesvær.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- Mælkesekretion, hævelse af brysterne, uregelmæssig, kraftig blødning.
- Forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer. Det kan bl.a. medføre forhøjet blodtryk, overvægt, forhøjet fedt i blodet, forhøjet insulin i blodet.
- Søvnangst med talen i søvne, søvnrelateret spiseforstyrrelse.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt.

hvis De får feber, skal De kontakte læge eller skadestue.

- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
- Symptomer hos spædbørn hvis mødre har taget Alzen® SR: rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis Deres barn får nogle af disse symptomer skal De kontakte Deres læge.

Ovennævnte bivirkninger bør forventes hos børn og unge. Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge (10-17 år):

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

- Øget appetit.
- Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Forhøjet prolaktin (hormon), der kan medføre mælkesekretion og ophør af menstruation hos kvinder, og udvikling af bryster og impotens hos mænd.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

- Irritabel adfærd.

Alzen® SR kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder kolesterol og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Alzen® SR utilgængeligt for børn.
- De kan opbevare Alzen® SR ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Alzen® SR efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Alzen® SR depottabletter indeholder:

- Aktivt stof: Quetiapin som quetiapinfumarat.
- Øvrige indholdsstoffer:
 - Tabletterne: MikrokrySTALLinsk cellulose, natriumcitrat, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose.
 - Tabletovertærk: Hypromellose, macrogol, tildioxid (E171), gul jernoxid (E172, indeholdt i 50 mg, 200 mg og 300 mg) og rød jernoxid (E172, indeholdt i 50 mg).

Udseende og pakningsstørrelse

Alzen® SR 50 mg depottabletter er ferskenfarvede og præget med XR 50 på den ene side.

Alzen® SR 200 mg depottabletter er gule og præget med XR 200 på den ene side.

Alzen® SR 300 mg depottabletter er lysegule og præget med XR 300 på den ene side.

Alzen® SR 400 mg depottabletter er hvide og præget med XR 400 på den ene side.

Alzen® SR findes i pakningsstørrelserne 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2013.