

# INDLÆGSESSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN BONVIVA

150 mg filmovertrukne tabletter  
Ibandronsyre

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Bonviva til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Planlæg indtagelsen af Bonviva med de aftagelige klistermærker i din personlige kalender

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bonviva
3. Sådan skal du tage Bonviva
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

## 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Bonviva tilhører en medicingruppe, som kaldes **bisphosphonater**. Det indeholder ibandronsyre. Det indeholder ikke hormoner.

Bonviva kan ophæve knogletab, ved at forhindre yderligere tab af knoglevæv, og ved at øge knoglemassen hos kvinder, som tager det, selvom de ikke vil kunne se eller føle en forskel. Bonviva kan formindske risikoen for knoglebrud (frakturer). Reduktionen i knoglebrud er påvist for brud i rygsøjlen, men ikke for hoftebrud.

**Bonviva er ordineret til dig til behandling af osteoporose (knogleskørhed) efter menopausen (overgangsalderen), fordi du har en øget risiko for knoglebrud.**

Osteoporose er en udtynding og svækkelse af knoglerne, som ofte ses hos kvinder efter menopausen. I forbindelse med menopausen ophører kvinders æggestokke med at producere det kvindelige hormon, østrogen, som hjælper med at vedligeholde knoglerne.

Jo tidligere en kvinde når menopausen, jo større er risikoen for knoglebrud ved osteoporose. Andre forhold som kan øge risikoen for knoglebrud er:

- for lidt kalk og D-vitamin i kosten
- rygning eller for meget alkohol
- ikke nok gåture eller anden vægtbærende aktivitet
- osteoporose i familien

Mange mennesker med osteoporose har ingen symptomer. Hvis du ikke har nogen symptomer ved du derfor ikke nødvendigvis, at du har denne sygdom.

Osteoporosen medfører imidlertid at du lettere brækker dine knogler ved fald eller hvis du slår dig. Et knoglebrud efter 50-års alderen kan være tegn på osteoporose. Osteoporose kan desuden medføre rygsmerter, tab af legemshøjde og rygkrumning.

Bonviva forhindrer knogletabet forårsaget af osteoporose, og hjælper således til med at genopbygge knoglerne. Knoglerne er derfor mindre tilbøjelige til at brække.

**En sund livsstil** vil desuden hjælpe dig til at få mest ud af behandlingen. Spis en varieret kost med et stort indhold af kalk og D-vitamin, gå ture eller anden vægtbærende aktivitet, undgå rygning og for meget alkohol.

## 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BONVIVA

Tag ikke Bonviva

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for ibandronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har visse problemer med spiserøret, såsom indsnævring eller synkebesvær.
- hvis du ikke kan stå eller sidde oprejst i mindst én time (60 minutter) ad gangen.
- hvis du har, eller har haft et lavt indhold af kalk i blodet. Tal med din læge.

Børn og unge

Giv ikke Bonviva til børn eller unge.

Vær ekstra forsigtig med at tage Bonviva

Visse personer skal være særlig forsigtige når de tager Bonviva. Spørg lægen:

- hvis du har problemer med mineralmetabolismen (f.eks. vitamin D mangel).
- hvis dine nyrer ikke fungerer normalt.
- hvis du har synkebesvær eller problemer med fordøjelsen.
- hvis du får tandbehandling eller tandoperation, skal du fortælle din tandlæge, at du er i behandling med Bonviva.

Der kan forekomme irritation, inflammation (betændelse) eller sårdannelse i spiserøret, ofte med symptomer som stærk smerte i brystet, stærk smerte efter at have sunket mad og/eller drikke, voldsom kvalme eller opkastning, især hvis du ikke drikker et helt glas almindeligt vand, og/eller hvis du ligger ned inden for én time efter du har taget Bonviva. Hvis du udvikler disse symptomer, skal du stoppe med at tage Bonviva og straks kontakte din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Specielt:

- **Kosttilskud som indeholder calcium, magnesium, jern eller aluminium**, idet de muligvis kan påvirke virkningen af Bonviva.
- **Acetylsalicylsyre og andre nonsteroidale antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDs)** (inkl. ibuprofen, diclofenacnatrium og naproxen) kan virke irriterende på maven og tarmen. Bisphosphonater (som Bonviva) kan virke på samme måde. Du skal derfor være særlig forsigtig hvis du anvender **smertestillende eller antiinflammatorisk medicin** samtidig med anvendelsen af Bonviva.

Efter indtagelse af din månedlige Bonviva tablet, **skal du vente 1 time, inden du indtager anden medicin**, herunder tabletter eller anden form for medicin mod dårlig fordøjelse, kalktilskud eller vitaminer.

Brug af Bonviva sammen med mad og drikke

**Indtag ikke Bonviva sammen med mad.** Bonviva er mindre effektivt, når det indtages sammen med mad. **Du må drikke postevand, men ingen andre drikkevarer** (se 3. SÅDAN SKAL DU TAGE BONVIVA).

Graviditet og amning

Tag ikke Bonviva hvis du er gravid eller ammer. Hvis du skal tage Bonviva, bør du holde op med at amme.

Tal med din læge eller apoteket før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er meget usandsynligt, at Bonviva kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

**Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Bonviva**

Bonviva indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

## 3. SÅDAN SKALDU TAGE BONVIVA

Brug altid Bonviva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

**Den normale dosis Bonviva er 1 tablet én gang om måneden.**

Ved indtagelsen af din månedlige tablet

Det er vigtigt at følge disse vejledninger nøje. De er lavet med henblik på, at Bonviva tabletten hurtigt når frem til maven, så der er mindst mulig sandsynlighed for at forårsage irritation

- **Tag én Bonviva 150 mg tablet én gang om måneden.**
- **Vælg en månedsdato**, så det er let at huske. Du kan vælge enten den samme dato (som f.eks. den 1. i hver måned) eller den samme dag (som f.eks. den første søndag i hver måned) til indtagelsen af din Bonviva-tablet. Vælg en dato som bedst passer til dine rutiner.
- Indtag Bonviva tabletten **mindst 6 timer efter, at du sidst har spist eller drukket**, bortset fra postevand.
- Indtag Bonviva tabletten
  - **efter at du er stået op om morgenen, og**
  - **før du har fået noget at spise eller drikke** (d.v.s. på tom mave)
- **Synk tabletten med et helt glas postevand** (mindst 180 ml).
- **Indtag ikke** tabletten sammen med mineralvand, frugtjuice eller andre drikkevarer.
- **Synk tabletten hel** – lad være med at tygge den, knuse den eller opløse den i munden.
- **I løbet af den følgende time (60 minutter)** efter at du har indtaget tabletten
  - **lig ikke ned:** Hvis du ikke er oprejst (stående eller siddende), kan noget af medicinen løbe tilbage i spiserøret



- **spis ikke noget**



- **drik ikke noget** (undtagen postevand, hvis du har brug for det)
- **indtag ikke anden medicin**
- Efter du har ventet én time, kan du indtage dagens første måltid eller drikkevarer. Efter du har spist, er det i orden at ligge ned, samt indtage anden medicin.

**Indtag ikke** tabletten ved sengetid eller før du er stået op.

**Fortsat indtagelse af Bonviva**

Det er vigtigt, at du anvender Bonviva hver måned, så længe lægen ordinerer det. Bonviva kan kun behandle osteoporose så længe du fortsætter med at tage det.

**Hvis du har taget for meget Bonviva**

Hvis du ved en fejl har indtaget mere end én tablet, **skal du drikke et helt glas mælk og straks kontakte lægen.**

**Fremkald ikke opkastning, og læg dig ikke ned** – dette kan medføre, at Bonviva irriterer spiserøret.

**Hvis du har glemt at tage Bonviva**

Hvis du glemmer at tage din tablet om morgenen på den valgte dag, **må du ikke tage tabletten senere på dagen.** Giv i stedet i din kalender og find ud af hvornår din næste planlagte dosis skal indtages:

**Hvis din næste planlagte dosis skal tages efter kun 1 til 7 dage...**

Du skal vente med at tage tabletten, indtil næste planlagte dosis, hvor du indtager tabletten som normalt. Derefter skal du fortsætte med at tage én tablet én gang om måneden på de planlagte dage, som du har markeret i din kalender.

**Hvis din næste planlagte dosis skal tages efter mere end 7 dage...**

Du skal tage én tablet morgenen efter, du er kommet i tanke om, at du har glemt at tage tabletten.

Derefter skal du fortsætte med at tage én tablet én gang om måneden på de planlagte dage, som du har markeret i din kalender.

**Tag aldrig to Bonviva tabletter i den samme uge.**

## 4. BIVIRKNINGER

Bonviva kan som al medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Tal straks med en sygeplejerske eller en læge, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:**

- udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, tunge og hals, med vejrtrækningsproblemer. Du kan have fået en allergisk reaktion over for medicinen
- stærke smerter i brystet, stærk smerte efter at have sunket mad eller drikke, voldsom kvalme eller opkastning
- influenzalignende symptomer (hvis nogle af symptomerne bliver generende eller varer mere end et par dage)
- smerte eller ømhed i munden eller kæben
- vedvarende smerte og betændelse i øjet

## Andre bivirkninger

**Almindelig** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

- hovedpine
- halsbrand, mavesmerter (så som mavekatar eller mave-tarmkatar) fordøjelsesbesvær, kvalme, diarré eller forstoppelse
- udslæt
- smerter og stivhed i muskler, led eller ryg
- influenzalignende symptomer (herunder feber, rysten og skælven, følelse af ubehag, træthed, knoglesmerter samt smerter i muskler og led)
- træthed

**Ikke almindelig** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

- knoglesmerter
- svaghedsfølelse
- svimmelhed
- luftafgang fra tarmen

**Sjælden** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

- overfølsomhedsreaktion; hævelse af ansigtet, læberne og munden (se allergi)
- kløe
- smerte eller betændelse i øjet
  - usædvanlig brud på lårbensknogle, primært hos patienter i langtidsbehandling for osteoporose kan forekomme i sjældne tilfælde. Kontakt lægen, hvis du får smerter, svaghed eller ubehag i låret, hoften eller lysken, idet det kan være tidlige tegn på et muligt brud på lårbensknoglen.

**Meget sjælden** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

- en tilstand med blodagtig knogle i munden kaldet knoglenekrose i kæben.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Inden særlige opbevaringsbetingelser vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Bonviva efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Bonviva indeholder:**

- Det aktive stof er ibandronsyre. Hver tablet indeholder 150 mg ibandronsyre (som ibandronatnatrium monohydrat)
- De øvrige indholdsstoffer er:

**Tabletkerne:** lactosemonohydrat, povidon, mikrokrySTALLINSK cellulose, crospovidon, stearinsyre, silica, kolloid vandfri

**Tabletovertræk:** hypromellose, titandioxid (171), talcum, makrogol 6000

**Udseende og pakningsstørrelser**

Bonviva tabletter er hvide til rødhvide, aflange og mærket med "BNVA" på den ene side og "150" på den anden side. Tabletter findes i blisterpakninger indeholdende 1 og 3 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

**Indehaver af markedsføringstilladelse:**

Roche Registration Limited  
6 Falcon Way  
Shire Park  
Welwyn Garden City  
AL7 1TW  
Storbritannien

**Fremstiller:**

Roche Pharma AG  
Emil-Barell-Strasse 1  
D-79639 Grenzach-Wyhlen  
Tyskland

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

**België/Belgique/Belgien**  
N.V. Roche S.A.  
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

**България**  
Рош България ЕООД  
Тел: +359 2 818 44 44

**Česká republika**  
Roche s. r. o.  
Tel: +420 - 2 20382111

**Danmark**  
Roche a/s  
Tlf: +45 - 36 39 99 99

**Deutschland**  
Roche Pharma AG  
Tel: +49 (0) 7624 140

**Eesti**  
GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: +372 - 6 676 900  
estonia@gsk.com

**Ελλάδα**  
Roche (Hellas) A.E.  
Τηλ: +30 210 61 66 100

**España**  
Roche Farma S.A.  
Tel: +34 - 91 324 81 00

**France**  
Roche  
Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00

**Ireland**  
Roche Products (Ireland) Ltd.  
Tel: +353 (0) 1 469 0700

**Ísland**  
Roche a/s  
c/o Icepharma hf  
Tel: +354 540 8000

**Italia**  
Roche S.p.A.  
Tel: +39 - 039 2471

**Κύπρος**  
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd  
Τηλ: +357 - 22 39 70 00

**Latvija**  
GlaxoSmithKline Latvia SIA  
Tel: +371 - 6 7312687

**Lietuva**  
UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“  
Tel: +370 5 2 649000  
info.lt@gsk.com

**Luxembourg/Luxemburg**  
(Voir/siehe Belgique/Belgien)

**Magyarország**  
Roche (Magyarország) Kft.  
Tel: +36 - 23 446 800

**Malta**  
GlaxoSmithKline Malta  
Tel: +356 21 238131

**Nederland**  
Roche Nederland B.V.  
Tel: +31 (0) 348 438050

**Norge**  
Roche Norge AS  
Tlf: +47 - 22 78 90 00

**Österreich**  
Roche Austria GmbH  
Tel: +43 (0) 1 27739

**Polska**  
Roche Polska Sp.z o.o.  
Tel: +48 - 22 345 18 88

**Portugal**  
Roche Farmacêutica Química, Lda  
Tel: +351 - 21 425 70 00

**România**  
Roche România S.R.L.  
Tel: +40 21 206 47 01

**Slovenija**  
Roche farmacevtska družba d.o.o.  
Tel: +386 - 1 360 26 00

**Slovenská republika**  
Roche Slovensko, s.r.o.  
Tel: +421 - 2 52638201

**Suomi/Finland**  
Roche Oy  
Puh/Tel: +358 (0) 10 544 500

**Sverige**  
Roche AB  
Tel: +46 (0) 8 726 1200

**United Kingdom**  
Roche Products Ltd.  
Tel: +44 (0) 1707 366000

**Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 09/2011**

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagentur's hjemmeside <http://www.ema.europa.eu/>

**Paralleldistribueret og ompakket af:**  
EuroPharmaDK, 6715 Esbjerg N.

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

## PLANLÆGNING AF HVORNÅR BONVIVA SKAL INDTAGES

Doseringen af Bonviva er én tablet om måneden. Vælg en månedsdato, der er let at huske:

- enten den samme dato (som f.eks. den 1. i hver måned)
- eller den samme dag (som f.eks. den første søndag i hver måned).

Anvend de aftagelige klistermærker, som er vist nedenfor, til at markere datoen i din kalender.

Så snart de har indtaget din tablet, krydser de af i feltet på huskesedlen.



## AFTAGELIGE KLISTERMÆRKER TIL DIN PERSONLIGE KALENDER

Det er vigtigt at tage Bonviva hver måned.