

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kodimagnyl® DAK 500 mg/10 mg brusetabletter Acetylsalicylsyre/codein

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Kodimagnyl® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Kodimagnyl®.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodimagnyl® DAK
3. Sådan skal du tage Kodimagnyl® DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kodimagnyl® er et smertestillende lægemiddel mod svage smerter f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KODIMAGNYL® DAK

Tag ikke Kodimagnyl® DAK hvis du:

- er overfølsom over for acetylsalicylsyre, codein eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smertestillende medicin (af typen NSAID eller salicylater)
- har frisk blødning fra mave-tarmkanalen (blodigt opkast og/eller sort afføring)
- har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader
- har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
- er gravid i 7. - 9. måned

Giv ikke Kodimagnyl® til børn under 15 år med feber.

Vær ekstra forsigtig med at tage Kodimagnyl® DAK

Tal med lægen inden du tager Kodimagnyl®, hvis du:

- har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim eller allergiske lidelser
- har tendens til smerter og ubehag fra maven, f.eks. mavesår
- har sygdom i mave-tarmslimhinden

- har nedsat lever- eller nyrefunktion
- skal vaccineres mod skoldkopper
- har en stofskiftesygdom (mangel på enzymet glucose-6-phosphat dehydrogenase)
- tager blodfortyndende medicin

Overskrider du den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis du har mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.



Kodimagnyl® må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis du er ældre, bør du undgå langvarig brug af Kodimagnyl® på grund af risiko for blødning i mave-tarmkanalen.

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Kodimagnyl® nogle dage før operationen. Spørg din læge.

Kodimagnyl® kan påvirke resultatet af en blod- og urinprøvekontrol.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Kodimagnyl®.

Brug af anden medicin

Anden medicin kan ændre virkningen af Kodimagnyl®, eller Kodimagnyl® kan ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

- medicin mod for megen mavesyre
- medicin mod depression
- medicin mod hyppig vandladning (tolterodin)
- medicin (tabletter) til behandling af sukkersyge
- blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, eptifibatid, heparin)
- visse typer hjertemedicin (betablokkere, calciumantagonister, ACE-hæmmere)
- vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)
- smertestillende medicin (NSAID, opioider)
- medicin mod infektion (rifampicin, tetracyclin, flouquinoloner)
- medicin mod urinsur gigt (probenecid)
- medicin mod visse former for gigt og kræft (methotrexat)
- medicin mod højdesyge og grøn stær (acetazolamid)
- medicin mod epilepsi (valproat og acetazolamid)
- vaccine mod skoldkopper
- naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba
- binyrebarkhormoner
- beroligende medicin eller sovemedicin

Vær opmærksom på at samtidig indtagelse af alkohol kan give øget, sløvende virkning.

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Kodimagnyl® DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Kodimagnyl® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Vær opmærksom på at samtidig indtagelse af alkohol kan virke sløvende.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Kodimagnyl®, hvis du er gravid i 7. – 9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan du tage Kodimagnyl® i lavest mulige dosis efter lægens anvisning.

Amning

Du må gerne tage Kodimagnyl®, når du ammer. Kontakt dog lægen ved længerevarende brug.

Kvinder der planlægger at blive gravide

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling med Kodimagnyl® kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kodimagnyl® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kodimagnyl® DAK

Denne medicin indeholder 15 mmol natrium (325 mg) pr. tablet. Dette kan forværre eventuel tendens til vand i kroppen. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn til det.

Kodimagnyl® indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KODIMAGNYL® DAK

Brusetabletterne opløses i ½ glas vand.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 - 2 brusetabletter 1 - 3 gange daglig.

Giv ikke Kodimagnyl® til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Giv aldrig Kodimagnyl® til børn under 15 år med feber.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Tal med lægen.

Hvis du har svært nedsat lever- eller nyrefunktion må du ikke anvende Kodimagnyl®.

Hvis du har taget for mange Kodimagnyl® DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Kodimagnyl®, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering er svimmelhed, tinnitus, døvhed, øget svedtendens, uro, kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning, rastløshed, feber, i svære tilfælde risiko for hjertesvigt, akut nyresvigt, alvorlig nedsættelse af blodsukkeret hos børn. Derudover kan der opstå bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, muskelinfiltrationer, kramper og sløvhed (især hos børn), dødsghed, udslæt, hævelser i ansigt, kløe, blåfarvning af huden, koma.

Hvis du har glemt at tage Kodimagnyl® DAK

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Kodimagnyl® kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Blodet er længere tid om at størkne, mavesmerter, halsbrand, sure opstød.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere.

Ikke alvorlige: Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, kvalme, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, opkast, forstoppelse, diaré, nældefeber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Skjulte indre blødninger, allergisk reaktion (anafylaksi), blodigt opkast, sort afføring på grund af blødning i mave-tarmkanalen.

Ikke alvorlige: Svimmelhed, sløvhed, tinnitus, astma, udslæt, svedtendens, løbende næse, træthed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hjerneblødning hæmmet vejrtrækning, kraftige blødninger fra den øvre del af mave-tarmkanalen eller hul på tarmen, forstyrrelse i nyrefunktionen allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals betændte blodkar blodmangel hos patienter med medfødt glucose-6-phosphat dehydrogenase

Ikke alvorlige: Blegghed og træthed pga. blodmangel efter langvarig behandling, dosisrelateret forbigående tab af hørelsen, forhøjede levertal, lavt blodsukker, lavt blodtryk, opstemthed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Sår og alvorlige betændelsestilstande i mave-tarmkanalen, akut betændelse i bugspytkirtlen, Reyes syndrom hos børn udtrykt ved feber, opkastninger og sløret bevidsthed, ændring i blodets sammensætning afskalning af huden, blæreformet udslæt og betændelse på huden.

Ikke alvorlige: Betændelse i munden eller i spiserøret, forsnævringer af tarmen, tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, mindre blødning i hud og slimhinder, feber; udslæt i ansigt og på arme og ben, dosisrelateret mild, forbigående leverbetændelse (gulsot) i forbindelse med nogle virussygdomme, risiko for afhængighed.

Tal med lægen hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Kodimagnyl® utilgængeligt for børn.

Opbevar Kodimagnyl® brusetabletter under 25 °C.

Brug ikke Kodimagnyl® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Kodimagnyl® DAK 500 mg/10 mg brusetabletter indeholder

De virksomme indholdsstoffer er acetylsalicylsyre 500 mg og codeinphosphathemihydrat 10 mg. De øvrige indholdsstoffer er citronsyre vandfri, docusatnatrium, lactosemonohydrat, natriumbenzoat (E 211), natriumcarbonat (E 500), natriumhydrogencarbonat (E 500), natriumsulfat (E 514), povidon (E 1201), simethicon. Sødeoffer: Mannitol (E 421), saccharinnatrium (E 954), natriumcyclamat (E 952). Smagsstof: Citronaroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Kodimagnyl® brusetabletter er runde, hvide tabletter.

Kodimagnyl® brusetabletter findes i pakningsstørrelser à 20 og 60 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

LOSAN PHARMA GmbH
Otto-Hahn-Strasse 13
D-79395 Neuenburg

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Revideret november 2011