

Pentasa®, suppositorier, 1g

mesalazin

Receptpligtig medicin:

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Pentasa® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pentasa® suppositorier.
3. Sådan skal du bruge Pentasa® suppositorier
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Pentasa® suppositorier virker mod kronisk, blødende betændelse i endetarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pentasa® suppositorier.

Brug ikke Pentasa® hvis:

- du er overfølsom overfor mesalazin, salicylater eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Pentasa® suppositorier.
- du har en alvorlig lever- eller nyresygdom.
- du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
- du har tendens til blødning fra hud eller slimhinder ud over blødning fra tarmen.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pentasa® suppositorier

Tal med din læge hvis:

- du er overfølsom over for sulfasalazin.
- din lever ikke fungerer normalt.
- dine nyrer ikke fungerer normalt.
- du tager medicin mod gigt eller smerter. (NSAID)
- du tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin).
- du behandles med 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemoterapi, anvendes til at behandle blodkræft (leukemi)).
- du har en dårlig lungefunktion (astma)
- du er i behandling med medicin, der forhindrer blodet i at størkne (medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin).

- du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt. I disse tilfælde skal du straks holde op med at bruge Pentasa®.

Det er vigtigt, at du er i kontrol hos din læge, når du tager Pentasa® suppositorier.

Brug af anden medicin

Du øger risikoen for blodsygdomme, hvis du samtidig med Pentasa® bruger medicin mod immunsygdomme (azathioprin). Tal med din læge.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Pentasa® efter lægens anvisning. Erfaringer med Pentasa® er begrænsede.

Amning:

Du må ikke bruge Pentasa® under amning. Erfaringer med Pentasa® er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pentasa® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pentasa® suppositorier.

Fingertutterne vedlagt i Pentasa® suppositorier indeholder naturgummi/latex. Kan medføre svære allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Pentasa® suppositorier.

Brugsanvisning:

- toiletbesøg anbefales umiddelbart før brug af suppositoriet.
- vask hænderne grundigt før suppositoriet anvendes.
- sæt en af fingertutterne på en finger.
- stik suppositoriet så dybt op som muligt i endetarmen.
- hvis suppositoriet er vanskeligt at få ind, kan du fugte det med vand eller fugtighedscreme.
- hvis det glider ud før der er gået 10 minutter, kan du tage et nyt.
- smid den brugte fingertut ud.

Tag altid Pentasa® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosering er:

Voksne

1 suppositorium (1 g) 1-2 gange daglig.

Børn:

Du må kun give Pentasa® til børn i særlige tilfælde. Børn under 2 år må ikke få Pentasa®. Tal med lægen.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Pentasa®

Der er begrænset erfaring med overdosering.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Pentasa® suppositorier, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

Hvis du har glemt at bruge Pentasa®

Brug aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Pentasa®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Pentasa®.

4. Bivirkninger

Pentasa® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Betændelse i hjertesækken, smerter i brystet, feber, åndenød. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen: Voldsomme mavesmerter, feber. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlig påvirkning af blodet: Blødninger, blå mærker efter stød, småblødninger i huden, træthed, feber, vedvarende halsbetændelse eller andre former for betændelse. Kontakt læge eller skadestue.
- Påvirkning af leveren: Gulsot, træthed, forhøjede levertal. Kontakt lægen.
- Allergiske lungereaktioner blandt andet åndenød og lungebetændelse. Kontakt lægen.
- Påvirkning af nyrerne: Feber, hævelse af fødder, hænder og ansigt, smerter over lænden.
- Misfarvning af urinen. Nyresvigt. Kontakt lægen.
- Alvorlig overfølsomhedsreaktion med åndedrætsbesvær og hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Forhøjet tryk i hjernen: Voldsom hovedpine, kvalme, opkastninger, langsom puls. Kontakt læge eller skadestue omgående.
- Feber, træthed, smerter og hævelse af led, muskelsmerter, udslæt på grund af bindevævssygdom. Kontakt lægen.
- Forværring af tarmsygdom. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine og feber.
- Diarré, mavesmerter, kvalme, opkastning og luft i tarmen.
- Nældefeber og udslæt som eksem.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Øget følsomhed over for lys.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svimmelhed.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Forbigående hårtab.
- Overfølsomhedsreaktioner, feber, føleforstyrrelser i arme og ben. Smerter i muskler og led.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Pentasa® utilgængeligt for børn.

Tag ikke Pentasa® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Pentasa®, suppositorier 1 g indeholder

Det virksomme indholdsstof er mesalazin 1 g.

De øvrige indholdsstoffer er: Polyvidon, macrogol 6000, magnesiumstearat og talcum.

Pakningsstørrelse

28 stk. suppositorier.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark

Pharmason ApS

Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Ompakket og frigivet af

Pharmason ApS

Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Pentasa® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 05/2012