

Indlægsseddel: Information til patienten

Ramipril/hydrochlorthiazid Teva 5 mg/25 mg tabletter

ramipril/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril/hydrochlorthiazid Teva
3. Sådan skal du tage Ramipril/hydrochlorthiazid Teva
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ramipril/hydrochlorthiazid Teva er en kombination af to slags lægemidler, der kaldes ramipril og hydrochlorthiazid.

Ramipril tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ”ACE-hæmmere” (Angiotension Converting Enzyme Inhibitors).

Det virker ved at:

- mindske kroppens produktion af stoffer, der gør, at man får forhøjet blodtryk
- få dine blodkar til at slappe af og udvide sig
- gøre det lettere for dit hjerte at pumpe blodet rundt i din krop.

Hydrochlorthiazid tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes ”thiaziddiuretika” eller vanddrivende lægemidler. Det virker ved at øge produktionen af urin, hvorved blodtrykket falder.

Ramipril/hydrochlorthiazid Teva anvendes ved forhøjet blodtryk. De to aktive lægemidler virker sammen for at nedsætte blodtrykket. De anvendes sammen, hvor behandling med den ene slags medicin ikke har været tilstrækkelig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ramipril/hydrochlorthiazid Teva

Tag ikke Ramipril/hydrochlorthiazid Teva

- hvis du er allergisk over for de aktive stoffer ramipril, hydrochlorthiazid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Ramipril/hydrochlorthiazid Teva (angivet i punkt 6).
- hvis du er allergisk over for anden medicin, der ligner Ramipril/hydrochlorthiazid Teva (andre ACE-hæmmere eller sulfonamiderivater).
Symptomer på allergiske reaktioner kan omfatte rødme, synke- og vejrtrækningsproblemer, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.
- hvis du tidligere har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion, der kaldes ”angioødem”. Symptomerne omfatter kløe, nældefeber, røde pletter på hænderne, fødderne og på halsen, hævelse af halsen og tungen, rundt om øjnene og læberne, vejrtrækningsbesvær og synkebesvær.
- hvis du er i dialysebehandling, eller dit blod på anden vis bliver filtreret. Afhængigt af det apparatur der anvendes, kan det være uhensigtsmæssigt for dig at anvende Ramipril/hydrochlorthiazid Teva.
- hvis du lider af alvorlig leversygdom.
- hvis du har unormale saltværdier (kalcium, kalium, natrium) i blodet.
- hvis du lider af nyresygdom, hvor blodtilførslen til nyrerne er nedsat (renal arteriestenose).
- hvis du er gravid i **andet og tredje trimester** (se afsnittet nedenfor om graviditet og amning).
- hvis du ammer (se afsnittet nedenfor om graviditet og amning).
- hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et andet blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Anvend ikke Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Kontakt din læge, før du anvender Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, hvis du er usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ramipril/hydrochlorthiazid Teva:

- hvis du har dårligt hjerte, dårlig lever eller dårlige nyrer.
- hvis du har mistet store mængder kropsvæske og salt (efter at have kastet op, haft diarré, har svedt mere end normalt, har været på diæt med lavt saltindhold, hvis du har taget vanddrivende medicin over længere tid, eller hvis du har været i dialysebehandling).
- hvis du skal i behandling for bi- eller hvæpsestik for at nedsætte en allergisk reaktion (desensibilisering).
- hvis du skal bedøves. Dette kan være i forbindelse med en operation eller tandlægebesøg. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Ramipril/hydrochlorthiazid Teva en dag i forvejen; spørg din læge.
- hvis du har højt indhold af kalium i dit blod (set i blodprøveresultater).
- du tager medicin, som kaldes mTOR-hæmmere (f.eks. temsirolimus, everolimus, sirolimus) eller vildagliptin, da de kan øge risikoen for angioødem, som er en alvorlig allergisk reaktion.
- hvis du har kollagen vaskulær sygdom, såsom skleroderma eller systemisk lupus erythematosus.
- fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive det. Ramipril/hydrochlorthiazid Teva anbefales ikke de første tre måneder af graviditeten og kan gøre alvorlig skade på dit barn efter de første tre måneder af graviditeten (se afsnittet om "Graviditet og amning").
- hvis dit syn bliver nedsat, eller hvis du får smerter i øjet. Dette kan være symptomer på øget tryk i øjet og kan forekomme inden for timer til uger, efter du har taget Ramipril/Hydrochlorthiazid Teva. Hvis det ikke behandles, kan det medføre permanent synstab. Hvis du har eller har haft penicillin- eller sulfonamidallergi, kan din risiko for at få dette være højere.
- hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk:

- en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
- aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Ramipril/hydrochlorthiazid Teva”.

Børn og unge

Ramipril/hydrochlorthiazid Teva anbefales ikke til børn og unge under 18 år, fordi medicinen ikke har været anvendt til denne aldersgruppe.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), så kontakt din læge, før du anvender Ramipril/hydrochlorthiazid Teva.

Brug af anden medicin sammen med Ramipril/hydrochlorthiazid Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette skal du gøre, fordi Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan påvirke den måde, som anden medicin virker på, ligesom anden medicin kan påvirke den måde, som Ramipril/hydrochlorthiazid Teva virker på.

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. De kan mindske virkningen af Ramipril/hydrochlorthiazid Teva:

- smertestillende medicin (nonsteroid antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er) som f.eks. ibuprofen, indometacin og aspirin)
- medicin mod for lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergi, såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din læge vil tage dit blodtryk.

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. Risikoen for bivirkninger kan øges, hvis de tages sammen med Ramipril/hydrochlorthiazid Teva:

- smertestillende medicin (f.eks. nonsteroid antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er) som f.eks. ibuprofen, indometacin og aspirin).
- medicin, der nedsætter mængden af kalium i blodet, såsom medicin mod forstoppelse, vanddrivende medicin, amphotericin B (mod svampeinfektioner) og ACTH (der bruges til at teste, at binyrerne fungerer).
- medicin mod kræft (kemoterapi).
- medicin mod hjertesygdomme, herunder problemer med hjerteslaget.
- medicin, der stopper afstødning af organer efter en transplantation, såsom ciclosporin.
- vanddrivende medicin, såsom furosemid.
- medicin, der kan øge indholdet af kalium i blodet, såsom spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalte og heparin (blodfortyndende middel).
- steroider mod betændelse, såsom prednisolon.
- kalciumtilskud.
- allopurinol (anvendes til at mindske mængden af urinsyre i blodet).
- procainamid (mod problemer med hjerterytmen).
- colestyramin (der nedsætter fedtindholdet i blodet).
- carbamazepin (mod epilepsi).
- trimethoprim og co-trimoxazol (mod infektioner forårsaget af bakterier)
- temsirolimus (mod kræft).
- sirolimus, everolimus (til forebyggelse af afstødning af transplanterede organer).
- vildagliptin (der nedsætter blodsukkeret).
- Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Ramipril/hydrochlorthiazid Teva” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Tal med din læge, hvis du anvender følgende typer medicin. Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan påvirke virkningen af dem:

- medicin mod sukkersyge, såsom tabletter der nedsætter blodsukkeret eller insulin. Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan nedsætte blodsukkerniveauet. Kontroller derfor dit blodsukker nøje, når du anvender Ramipril/hydrochlorthiazid Teva.
- litium (mod mentalforstyrrelser). Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan øge indholdet af litium i blodet. Dit litiumindhold skal derfor overvåges nøje af din læge.
- medicin, der virker muskelafslappende
- quinin (mod malaria)
- medicin, der indeholder jod. Dette anvendes i forbindelse med scanninger eller røntgenfotografering på hospitalet.
- penicillin (mod betændelse)
- blodfortyndende medicin (heparin, warfarin).

Tal med din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er usikker), før du tager Ramipril/hydrochlorthiazid Teva.

Prøver

Tal med din læge eller dit apotek, før du tager Ramipril/hydrochlorthiazid Teva:

- hvis du skal have testet din biskjoldbruskkirtel. Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan påvirke testresultatet.
- hvis du dyrker sport og skal have foretaget en antidopingtest. Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan give et positivt resultat.

Brug af Ramipril/hydrochlorthiazid Teva sammen med mad og alkohol

- Hvis du drikker alkohol, samtidig med at du anvender Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, kan du blive svimmel. Hvis du er bekymret for, hvor meget alkohol du må drikke, samtidig med at du er i behandling med Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, bør du tale med din læge, da blodtryks-sænkende medicin kan forstærke virkningen af alkohol.
- Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan tages sammen med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du bør ikke anvende Ramipril/hydrochlorthiazid Teva i de første 12 uger af din graviditet, og efter den 13. uge bør du helt undgå at anvende Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, da medicinen kan være skadelig for fosteret.

Hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, skal du fortælle det til din læge med det samme. Et passende alternativ til behandlingen med Ramipril/hydrochlorthiazid Teva bør opstartes før en planlagt graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke anvende Ramipril/hydrochlorthiazid Teva.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ramipril/hydrochlorthiazid Teva kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken (svimmelhed). Dette gælder især i starten af behandlingen, når din dosis ændres. Hvis dette sker for dig, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene visse former for maskiner.

3. Sådan skal du tage Ramipril/hydrochlorthiazid Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Indtagelse af denne medicin

- Indtag medicinen gennem munden på samme tidspunkt på dagen hver dag, almindeligvis om morgenen.
- Slug tabletterne med væske.
- Du må ikke tygge eller knuse tabletterne.
- Tabletten kan deles i to lige store doser.

Hvor meget skal du tage:

For højt blodtryk

Din læge vil justere din dosis, indtil dit blodtryk er under kontrol.

Ældre

Lægen vil nedsætte startdosis og tilpasse behandlingen langsomt.

Hvis du har taget for mange Ramipril/hydrochlorthiazid Teva

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget flere Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Du må ikke selv køre bil; få derfor en anden til at køre dig, eller ring efter en ambulance. Medbring pakningen og denne indlægsseddel, så lægen kan se, hvad du har taget.

Hvis du har glemt at tage Ramipril/hydrochlorthiazid Teva

- Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den normale dosis næste gang.
- Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal stoppe med at tage Ramipril/hydrochlorthiazid Teva og kontakte lægen med det samme, hvis du oplever én af følgende alvorlige bivirkninger – du kan have brug for akut lægehjælp:

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- Hævelse af ansigtet, læberne eller halsen, der gør det svært at trække vejret eller synke, samt kløe eller udslæt. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion mod Ramipril/hydrochlorthiazid Teva
- Alvorlige reaktioner på huden, såsom hududslæt, sår i munden, forværring af eksisterende hudsygdomme, rødme, blæredannelse eller løsning af huden (såsom Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller erythema multiforme).

Kontakt straks lægen, hvis du oplever:

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- Øget puls, hjertebanken (palpitationer), brystmerter, trykken for brystet eller mere alvorlige lidelser såsom hjerteanfald eller slagtilfælde.
- Åndenød, hoste, feber der varer 2 til 3 dage, og hvis du ikke er så sulten som normalt. Dette kunne være tegn på lungeproblemer, herunder lungebetændelse.
- Lettere tendens til blå mærker, længere blødningsperioder, tegn på blødninger (f.eks. blødning fra tandkødet), lilla mærker på huden, pletter på huden eller lettere tendens til at få infektioner, halsbetændelse og feber, træthedsfølelse, svaghed, svimmelhed eller bleghed. Dette kan være tegn på blod- eller knoglemarvsproblemer.
- Alvorlig mavepine, der strækker sig om til ryggen. Dette kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (Pankreatitis).
- Feber, kuldegysninger, træthed, mistet appetit, mavepine, kvalme, gullig hud eller øjne (gulsot). Dette kan være tegn på leverproblemer, såsom leverbetændelse eller leverskade.
- Koncentreret urin (mørkfarvet), kvalme eller opkastning, muskelkramper, forvirring og krampeanfald, hvilket kan være forårsaget af uhensigtsmæssig antidiuretisk hormonudskillelse (ADH).

Andre bivirkninger:

Kontakt straks lægen, hvis én af følgende bivirkninger bliver alvorlige eller varer længere end et par dage:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- Hovedpine, svagheds- eller træthedsfølelse.
- Svimmelhed. Dette er mest sandsynligt, når du starter med at anvende Ramipril/hydrochlorthiazid Teva, eller når dosis øges.
- Tør, kildende hoste eller bronkitis.
- Blodprøveresultater, der viser højere sukkerindhold i blodet end normalt. Hvis du har sukkersyge, kan det forværre din sygdom.
- Blodprøveresultater, der viser højere indhold af urinsyre eller fedtindhold end normalt i blodet.
- Ledsmerter og røde og hævede led.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- Hududslæt med eller uden hævede områder.
- Rødme, besvimelse, unormalt lavt blodtryk, specielt når du rejser eller sætter dig hurtigt op.
- Balanceproblemer.
- Kløe og unormale hudtilstande, såsom følelsesløshed, snurren, prikkende følelse, brændende følelse eller myrekryb.
- Mistet eller ændring i smagssans.
- Søvnproblemer.
- Nedtrykthed, angstfølelse, mere nervøs end sædvanlig.
- Tilstoppet næse, bihulebetændelse, stakåndethed.
- Betændelse i tandkødet, hævet mund.
- Røde, kløende, hævede, fugtige øjne.
- Ringen for ørerne.
- Sløret syn.
- Hårtab.
- Brystmerter.
- Muskelsmerter.
- Forstoppelse og smerter i maveområdet.
- Fordøjelsesbesvær og kvalme.
- Øget urinproduktion.
- Øget svedtendens eller tørst.
- Mistet eller nedsat appetit (anoreksi), mindre sult end normalt.
- Øget eller uregelmæssig hjerterytme.
- Hævede arme og ben. Dette kan være et tegn på, at kroppen tilbageholder mere vand end vanligt.

- Feber.
- Nedsat libido hos mænd.
- Blodprøveresultater, der viser et fald i antallet af røde blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader eller i hæmoglobinmængden.
- Blodprøveresultater, der viser ændring i lever-, bugspytkirtel- og nyrefunktion.
- Blodprøveresultater, der viser mindre kalium i blodet end normalt.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

- Opkastning, diarré eller halsbrand.
- Rød hævet tunge eller mundtørhed.
- Blodprøveresultater, der viser mere kalium i blodet end normalt.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- Koncentrationsbesvær, rastløshed eller forvirring.
- Fingre og tæer, der skifter farve, når du har det koldt og derefter prikker eller gør ondt, når du får varmen. Dette kan være Raynauds fænomen.
- Forstørrelse af brysterne hos mænd.
- Blodpropper.
- Høreforstyrrelser.
- Tørre øjne.
- Nedsat syn eller smerter i øjnene forårsaget af øget tryk i øjnene (dette kan være symptomer på en sygdom, der hedder lukketvinklet glaukom)
- Fornemmelse af, at ting ser gule ud.
- Væskemangel.
- Hævelser, smerter og rødme i kinden (betændelse i spytkirtlerne).
- Hævelse i tarmsystemet kaldet "intestinal angiødem", der medfører symptomer, såsom smerter i maveregionen, opkastning og diarré.
- Større lysfølsomhed i forhold til solen.
- Alvorlig afskalning eller afstødning af hud, kløende, ujævnt udslæt eller andre hudreaktioner, såsom rødt udslæt i ansigtet eller i panden.
- Hududslæt eller blå mærker.
- Hudpletter og kolde hænder og fødder.
- Negleproblemer (f.eks. at de løser sig fra neglelejet).
- Stivhed i bevægeapparatet eller besvær med at bevæge kæben.
- Svaghed eller kramper i musklerne.
- Nedsat seksuallyst hos mænd og kvinder.
- Blod i urinen. Dette kan være tegn på nyresygdom.
- Højere sukkerindhold i urinen end normalt.
- Forhøjet antal af visse hvide blodlegemer i blodet, der kan ses i en blodprøve.
- Blodprøveresultater, der viser for få blodlegemer i blodet.
- Blodprøveresultater, der viser en ændring i indholdet af salte som f.eks. natrium, kalcium, magnesium og klorid i dit blod.
- Nedsat reaktionstid.
- Forstyrrelse af lugtesansen.
- Vejrtrækningsbesvær eller forværring af astma.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ramipril/hydrochlorthiazid Teva efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og yderpakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale yderemballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ramipril/hydrochlorthiazid Teva indeholder:

Aktive stoffer: ramipril og hydrochlorthiazid.

1 tablet indeholder 5 mg ramipril og 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrySTALLinsk cellulose, natriumstearyl fumarat, magnesiumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er hvide og kapselformede og har delekærv på begge sider, printet med "R" og "H" på hver side af delekærven på den ene side.

Ramipril/hydrochlorthiazid Teva fås i pakninger a 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 99 og 100 tabletter.

Hospitalspakning på 300 (30x10) tabletter og prøvepakning på 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Dansk repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne:

Danmark: Ramipril/hydrochlorthiazid Teva

Grækenland: Ramipril/HCTZ Teva 2.5 mg/12.5 mg Δισκία

Ramipril/HCTZ Teva 5 mg/25 mg Δισκία

Holland: Ramipril/Hydrochloorthiazide 2,5/12,5 PCH, tabletten 2,5/12,5 mg
Ramipril/ Hydrochloorthiazide 5/25 PCH, tabletten 5/25 mg
Tyskland: Ramipril–TEVA comp. 2,5 mg/12,5 mg tabletten
Ramipril–TEVA comp. 5 mg/25 mg tabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017