

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Detrusitol® Retard 2,8 mg, depotkapsler

Tolterodin

02-2012
P079222-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Detrusitol® Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Bemærk: Blisterkortene er mærket Detrusitol® XL 4 mg, da det virksomme stof er angivet som 4 mg tolterodintartrat, som svarer til 2,8 mg tolterodin.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Detrusitol® Retard
3. Sådan skal du tage Detrusitol® Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Detrusitol® Retard virker ved at afslappe musklerne i blæren og mindsker derved trykket i blæren, så blæren bedre kan holde på urinen.

Du kan tage Detrusitol® Retard til behandling af ufrivillig vandladning (urgeinkontinens), hyppig vandladning eller pludselig vandladningsstrang.

Lægen kan have givet dig Detrusitol® Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DETRUSITOL® RETARD

Tag ikke Detrusitol® Retard

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for tolterodin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du ikke kan komme af med vandet.
- hvis du lider af grøn stær (forhøjet tryk i øjet, snævervinklet glaukom) og ikke bliver behandlet effektivt for det. Tal med lægen.
- hvis du lider af myastenia gravis (sygdom med alvorlig muskelsvaghed).
- hvis du lider af colitis ulcerosa i svær grad (blødende betændelse med sår i tyktarmen).
- hvis du har en tyktarmslidelse med svær forstoppelse.

Vær ekstra forsigtig med at tage Detrusitol® Retard

Tal med lægen, inden du tager Detrusitol® Retard, hvis du

- ikke kan tømme blæren, f.eks. p.g.a. forstørret blærehalskirtel (prostata).
- har problemer med fødens passage gennem maven eller tarmen, f.eks. p.g.a. forsnævring af maveporten eller nedsat bevægelse i tarmen.
- har en nyre- eller leversygdom.
- lider af nervebetændelse med smerter og føleforstyrrelser.
- har spiserørsbrok.
- eller nogen i din nærmeste familie har en særlig ændring i hjertekurven (QT-forlængelse).
- har lavt indhold af kalium, calcium eller magnesium i blodet. Det kan du f.eks. have, hvis du tager vanddrivende medicin eller medicin mod osteoporose.
- har langsom eller urelmæssig puls, betændelse i hjertemusklen, hjertekrampe eller hjertesvigt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- infektioner (erythromycin, clarithromycin).
- svampeinfektioner (ketoconazol, itraconazol).
- HIV-infektion.
- uregelmæssig hjerterytme (puls) (amiodaron, procainamid, quinidin, sotalol).
- kvalme og opkastninger (metoclopramid, cisaprid).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Detrusitol® Retard, og Detrusitol® Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Detrusitol® Retard sammen med mad og drikke

Du skal tage Detrusitol® Retard depotkapsler med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Detrusitol® Retard. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, skal du normalt ikke tage Detrusitol® Retard. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Detrusitol® Retard kan give bivirkninger, såsom synsforstyrrelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Detrusitol® Retard

Detrusitol® Retard indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DETRUSITOL® RETARD

Tag altid Detrusitol® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Depotkapslerne skal sluges med rigelig vand (1 1/2 dl).

Den sædvanlige dosis er Voksne

1 depotkapsel på 2,8 mg én gang dagligt.

Hvis du får generende bivirkninger, kan dosis eventuelt nedsættes til 1 kapsel på 1,4 mg én gang dagligt. Tal med lægen.

Detrusitol® Retard depotkapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depotkapsler til alle de anførte doseringer.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn må normalt ikke få Detrusitol® Retard.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Detrusitol® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Detrusitol® Retard depotkapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er:

- kræmper.
- hallucinationer, ophidselse, pirrelighed.
- problemer med vejrtrækningen.
- hurtig puls.
- vandladningsbesvær.
- store pupiller.

Hvis du har glemt at tage Detrusitol® Retard

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis Detrusitol® Retard depotkapsler. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Detrusitol® Retard

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis dine vandladningsproblemer bliver værre, efter behandlingen med Detrusitol® Retard er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Detrusitol® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hjertesvigt med smerter i brystet, åndenød evt. rallende åndedræt. Ring 112.
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældent)

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (indenfor minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112, da det kan være livsfarligt.
- Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Mundtørhed. Hvis du tager Detrusitol® Retard i mere end 2-3 uger, skal du passe ekstra på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Bihulebetændelse
- Svimmelhed, hovedpine, træthed, søvnighed.
- Tørre øjne, unormalt syn, nedsat evne til at se skarpt.
- Halsbrand, forstoppelse, mavesmerter, øget tarmluft, diaré.
- Smerter og svien ved vandladningen.
- Hævede fødder, ankler og hænder.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Manglende evne til at tømme blæren, evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen hvis du får besvær med at lade vandet.
- Brystmerter. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Hjertebanken, nervøsitet, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Overfølsomhed.
- Hukommelsessvækkelse.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjældent)

- Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
- Hallucinationer. Kan være alvorlige. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet samt sure opstød p.g.a. tilbageløb af mavesyre i spiserøret.
- Forvirring, desorientering.
- Opkastning.
- Tør hud, hørdrøden.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Detrusitol® Retard ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar Detrusitol® Retard i den originale ydre emballage.

Tag ikke Detrusitol® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Detrusitol® Retard 2,8 mg, depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: 2,8 mg tolterodin (svarende til 4 mg tolterodintartrat).

Øvrige indholdsstoffer: Sukkersfærer (indeholdende saccharose og majsstivelse); hypromellose; surelease E-7-9010 klar (indeholdende ethylcellulose; triglycerider, middelkædelængde og oliesyre). Depotkapslens skal indeholder: Gelatine. Trykkeblæk: Shellak; titandioxid (E171); propylenglycol; simeticon. Farvestoffer i den blå 2,8 mg depotkapsel: Indigocarmin (E 132) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Blå kapsler med hvidt print (symbol og 4-tal). Pakket i blister.

Pakningsstørrelser

Detrusitol® Retard fås i pakningsstørrelser á 28 og 112 depotkapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Detrusitol® Retard er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2012