

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Amitriptylin DAK 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Amitriptylin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Amitriptylin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amitriptylin DAK
3. Sådan skal du tage Amitriptylin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Amitriptylin DAK tilhører gruppen af tricykliske antidepressiva og anvendes til behandling af depression. Begyndende bedring ses typisk efter 2 – 4 ugers behandling.

Lægen kan have givet dig Amitriptylin DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisninger.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE AMITRIPTYLIN DAK

Tag ikke Amitriptylin DAK hvis du:

- er overfølsom over for amitriptylin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- for nylig har haft en blodprop ved hjertet
- har nedsat hjertefunktion eller lider af forstyrrelser i hjertets rytme (ses på hjertekurven, EKG)
- tager eller inden for 2 uger har taget medicin af typen MAO-hæmmere (mod depression eller Parkinsons sygdom)

Der skal gå et døgn, efter at du er holdt op med at tage MAO-hæmmeren moclobemid, før du kan begynde at tage Amitriptylin DAK. Tal med lægen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Amitriptylin DAK

Tal med lægen inden du tager Amitriptylin DAK, hvis du:

- har nedsat hjertefunktion

- har nedsat leverfunktion
- har haft forøget tryk i øjet (grøn stær)
- har fået af vide, at du har fladt forreste øjenkammer eller snæver kammervinkel
- har haft vandladningsbesvær (f.eks ved prostatasygdom)
- har epilepsi eller lider af anden form for kramper
- har for højt stofskifte eller tager medicin for stofskiftet
- har sukkersyge
- har et dagligt alkoholforbrug
- lider af skizofreni

Vær opmærksom på:

- at din tåredannelse nedsættes, hvilket kan medføre skade på øjnene, hvis du bruger kontaktlinser
- at du kan opleve et blodtryksfald, hvor du vil føle dig svimmel og utilpas, hvis du pludseligt ændrer stilling fra liggende/siddende til stående position. Dette ses især hos ældre
- hvis du er maniodepressiv, at du kan blive manisk. Tal med din læge, hvis du oplever dette
- at du jævnligt bør gå til tandlægen, da du har øget risiko for huller i tænderne
- at Amitriptylin DAK kan forstærke den sløvende effekt af alkohol
- at du, hvis du skal opereres eller bedøves, skal fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Amitriptylin DAK
- at Amitriptylin DAK kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol
- at længerevarende behandling med Amitriptylin DAK ved afslutningen skal nedtrappes gradvist efter aftale med lægen

Selvmodstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
- hvis du er **ung**. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, **bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.**

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod mavesår (cimetidin, sucralfat)
- hjertemedicin og medicin mod forhøjet blodtryk (antiarytmika, calciumblokkere, betablokkere, methyldopa, adrenalin, noradrenalin, dopamin, isoprelin, efedrin)
- medicin mod migræne og hestigninger (clonidin)
- medicin mod depression (MAO-hæmmere, SSRI)
- medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere, biperiden)
- medicin mod mani (lithium)
- medicin mod psykoser (f.eks. pimozid, sertindol)
- bedøvelsesmidler (isofluran, droperidol)
- medicin mod allergi (antihistaminer)
- medicin mod svamp (fluconazol, terbinafin)
- stærkt smertestillende medicin
- medicin mod angst, uro eller søvnproblemer
- medicin mod tuberkulose (rifampicin)
- medicin mod hyperaktivitet (ADHD) og uimodståelig søvntrang (narkolepsi) (methyphenidat)
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, valproat, phenytoin, chloralhydrat, phenobarbital, primidon)
- medicin mod sukkersyge
- naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum

Brug af Amitriptylin DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Amitriptylin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Når du behandles med Amitriptylin DAK, skal du undgå at drikke alkohol, da den sløvende virkning af alkohol kan blive forstærket.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun tage Amitriptylin DAK efter lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amitriptylin DAK kan, især i starten af behandlingen og ved øgning af dosis, give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Amitriptylin DAK

Amitriptylin DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager medicinen, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE AMITRIPTYLIN DAK

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan evt. knuse dem.

Der går normalt nogle uger, før du kan mærke, at du får det bedre. Behandlingen skal normalt vare mindst 6 måneder. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan din sygdom vende tilbage. Følg lægens anvisning.

Tag altid Amitriptylin DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Startdosis 1 – 2 tabletter på 25 mg (25 - 50 mg). Medicinen gives som 1 dosis ved sengetid eller fordeles over flere doser daglig. Herefter vil lægen muligvis øge din dosis gradvist til 4 tabletter på 50 mg (200 mg).

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Amitriptylin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Amitriptylin DAK, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er voldsom søvntrang, ophidselse, hallucinationer, store pupiller, tørre slimhinder, hurtig puls, forstoppelse, feber, vandladningsbesvær. Andre symptomer er lavt blodtryk, kramper, bevidstløshed, koma, vejtrækningsbesvær, uregelmæssig hjerterytme, hjertestop.

Hvis du har glemt at tage Amitriptylin DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amitriptylin DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Du skal stoppe behandlingen gradvist for at undgå hovedpine, utilpashed, søvnforstyrrelser og irritabilitet.

4. BIVIRKNINGER

Amitriptylin DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Vægtøgning; hjertebanken; hurtig puls; sløvhed; søvntræng; rysten; svimmelhed; hovedpine; sløret syn og nedsat evne til at fokusere; mundtørhed; forstoppelse; kvalme; øget svedproduktion; øget appetit; svimmelhed/utilpashed ved pludselig ændring fra siddende/liggende til stående position; forvirring hos ældre personer (ses som rastløshed, søvnforstyrrelse, hukommelsesbesvær, uro, bevidsthedsplumring og vrangforestillinger); desorientering; nedsat lyst til sex.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Påvirkninger af hjerterytmen.

Ikke alvorlige: Talevanskeligheder; manglende koordinering af bevægelser; uro i kroppen; rystelser; ufrivillige bevægelser; koncentrationsbesvær; smagsforstyrrelser; snurren og prikken i huden; store pupiller; tandkødssvind; betændelse i mundhulen; huller i tænderne; brændende fornemmelse i munden; vandladningsbesvær; svimmelhed eventuelt besvimmelse på grund af lavt blodtryk; træthed; impotens; rejsningsbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Uregelmæssig hjerterytme og forstyrrelser i hjerterytmen hos personer med hjertesygdom; øget tryk i øjet.

Ikke alvorlige: Kramper; tinnitus; diaré; opkastning; hævet tunge; udslæt; nældefeber; betændelse i blodkar; forhøjet blodtryk; hævelser i ansigt; nedsat evne til at tænke klart; let opstemthed (hypomani); angst; søvnløshed; mareridt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Gulsot med hudkløe; leverbetændelse; åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme på grund af blodprop i hjertet; almen sløjhed, træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, blodudtræden samt infektion og feber på grund af forandringer i blodet; forværring af forhøjet tryk i øjet (grøn stær) hos ældre; tarmslyng.

Ikke alvorlige: Vægttab; tab af evnen til at se skarpt; forstørret spytkirtel; øget følsomhed af huden for lys; hårtab; nedsat appetit; feber; nedsat leverfunktion; forsinket sædafgang; udvikling af bryster hos mænd; mælkesekretion; aggressivitet; forvirring hos ældre; hallucinationer hos skizofrene; forsinket eller tab af evne til at opnå orgasme for kvinder.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ukendt

Alvorlig: Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med amitriptylin eller kort efter behandlingsophør.

Ikke alvorlig: Mindsket urinproduktion.

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Amitriptylin DAK kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Amitriptylin DAK utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for Amitriptylin DAK.
Brug ikke Amitriptylin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Amitriptylin DAK 10 mg, 25 mg eller 50 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Amitriptylinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Amitriptylin DAK er buede, hvide, filmovertrukne tabletter.

Amitriptylin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2010