

**INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**  
**Famvir® 500 mg, filmovertrukne tabletter**  
Famciclovir

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Famvir® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir®
3. Sådan skal du tage Famvir®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

**1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Famvir® er et middel mod infektioner med herpesvirus. Det virker ved at hæmme dannelsen af herpesvirus.

- Du kan tage Famvir® til
- behandling af helvedesild (herpes zoster) også med øjenkomplikationer.
  - forebyggelse af smerter efter helvedesild.
  - behandling af herpes på kønsdelene.
  - forebyggende behandling af hyppigt tilbagevendende herpes på kønsdelene.
  - herpes på hud og slimhinder inkl. forkølelessår, hvis du har nedsat immunforsvar.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FAMVIR®**

**Tag ikke Famvir®**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for famciclovir, penciclovir (andet middel mod herpes) eller et af de øvrige indholdsstoffer.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Famvir®**

- du skal starte med behandling af helvedesild så hurtigt som muligt og senest 3 døgn efter, de første tegn har vist sig.
- tal med lægen, inden du tager Famvir®, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Det kan være nødvendigt at justere dosis.
- hvis du har udbrud af herpes på kønsdelene (herpes genitalis), kan infektioner overføres til din partner ved seksuel kontakt. Selvom du tager Famvir®, skal du undgå seksuel kontakt, så længe du har symptomer.
- hvis du har hyppigt tilbagevendende herpes på kønsdelene (uden udbrud), skal du bruge kondom ved seksuel kontakt, for at undgå at smitte din partner.

**Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

- Tal med din læge, hvis du tager medicin mod
- urinsyreigt (probenecid) eller anden medicin, der kan påvirke dine nyrer. Det er måske nødvendigt at ændre dosis.
  - knogleskørhed (raloxifen).

**Brug af Famvir® sammen med mad og drikke**

Du kan tage Famvir® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Famvir® med et glas vand.

**Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

**Graviditet**

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Famvir®. Tal med lægen.

**Amning**

Hvis du ammer, må du kun tage Famvir® efter aftale med lægen.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Famvir® kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed, forvirring og andre forstyrrelser i centralnervesystemet), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**3. SÅDAN SKAL DU TAGE FAMVIR®**

Tag altid Famvir® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal starte med behandlingen, så hurtigt som muligt, når du har fået symptomer på udbrud/udslæt.

Du skal fortsætte med at tage medicinen, selvom du ikke får det bedre. Der kan gå nogle dage, før medicinen virker.

Famvir® fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer.

**Den sædvanlige dosis er**

**Voksne**

**Helvedesild (herpes zoster) hos patienter med normal immunforsvar:**

Voksne:

1 tablet på 500 mg 3 gange dagligt i 7 dage.

**Helvedesild (herpes zoster) hos patienter med nedsat immunforsvar:**

1 tablet på 500 mg 3 gange dagligt i 10 dage.

**Herpesinfektioner hos patienter med normalt immunforsvar:**

Førstegangstilfælde af herpes på kønsdelene:

2 tabletter på 125 mg (i alt 250 mg) 3 gange dagligt i 5 dage.

Tilbagevendende herpes på kønsdelene:

1 tablet på 125 mg 2 gange dagligt i 5 dage.

Forebyggelse af tilbagevendende udbrud af herpes på kønsdelene:

2 tabletter på 125 mg (i alt 250 mg) 2 gange dagligt. Behandlingstidens længde afhænger af sygdommens sværhedsgrad. Tal med lægen. Hvis du har HIV, skal du måske have 1 tablet på 500 mg 2 gange om dagen. Tal med lægen.

**Herpesinfektioner hos patienter med nedsat immunforsvar:**

1 tablet på 500 mg 2 gange dagligt i 7 dage.

**Ældre**

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

**Børn**

Børn må normalt ikke få Famvir®.

**Nedsat nyrefunktion**

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

**Hvis du har taget for mange Famvir®**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Famvir® tabletter, end der står i denne her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være bivirkningerne beskrevet i afsnit "4. BIVIRKNINGER" og nyresvigt hos patienter med eksisterende nyresygdom.

**Hvis du har glemt at tage Famvir®**

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

**Hvis du holder op med at tage Famvir®**

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

**4. BIVIRKNINGER**

Famvir® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Alvorlige bivirkninger**

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

**Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:**

- Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. Kontakt læge eller skadestue.

**Ikke alvorlige bivirkninger**

**Meget almindelige bivirkninger:** Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter.

- Hovedpine.

**Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Kløe.
- Svimmelhed.
- Kvalme, opkastning.

**Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Forvirring, døsighed. (overvejende hos ældre).
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Famvir®, 3. udgave

**Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:**

- Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben..

Famvir® kan herudover også give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

**5. OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Famvir® ved temperaturer over 30°C. Opbevares i original emballage.

Tag ikke Famvir® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

**6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

**Famvir® 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder:**

- Aktivt stof: Famciclovir 500 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Hydroxypropylcellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat. Filmovertræk: Titandioxid (E171), hypromellose, macrogol 4000 og 6000.

**Udseende og pakningsstørrelse**

Famvir® 500 mg er en hvid, oval, udadbuget, filmovertrukken tablet med skrå kant mærket med "Famvir 500" eller "FV 500" på den ene side og blank på den anden side.

Famvir® 500 mg fås i en blisterpakning med 21 filmovertrukne tabletter.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Famvir® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis International Pharmaceutical Ltd.

Den seneste udgave af indlægssedlen kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)