

Elocom® 1 mg/g, salve

Mometasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Elocom® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Översigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom®
3. Sådan skal du bruge Elocom®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Elocom® salve indeholder et stærkt binyrebarkhormon. Elocom® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.

Du kan bruge Elocom® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have givet dig Elocom® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ELOCOM®

Brug ikke Elocom®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for mometasonfuroat stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pander (rosacea).
- hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- hvis du har akne (bumser).
- hvis du har en hudinfektion forårsaget af svampe eller bakterier, med mindre infektionen behandles samtidig.
- hvis du har en virusinfektion, f.eks. forkølelsessår (herpes simplex) eller skoldkopper (varicella).
- hvis patienten er et barn under et år og har en hudlidelse, f.eks. eksem og bleeksem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Elocom®

- Hvis der opstår irritation eller overfølsomhed, skal du stoppe med at bruge Elocom® og kontakte lægen.
- Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Du bør ikke bruge Elocom® rundt om øjnene eller på øjenlågene.

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden din læge igen har set på din hudsygdom.
- Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Undgå at få Elocom® i øjnene.
- Hvis du har brugt Elocom® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Elocom® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Elocom® salve, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elocom® salve.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Elocom® sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Elocom® salve efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Elocom® efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Elocom® salve på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Elocom® påvirker ikke arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Elocom®

Elocom® salve indeholder propylenglycolmonopalmittostearat, der kan give irritation af huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ELOCOM®

Brug altid Elocom® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Påsmør et tyndt lag 1 gang dagligt.

Salven bruges på meget tør, skælllet og sprukken hud.

Børn:

Du må kun bruge Elocom® til børn efter lægens anvisning.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring.

Undgå at få Elocom® i øjnene.

Hvis du har brugt for meget Elocom®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Elocom® salve, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Har du har glemt at bruge Elocom®

Smør et tyndt lag Elocom® salve på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

Hvis du holder op med at bruge Elocom®

Når du har fået den ønskede virkning af Elocom® salve, bør du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge.

4. BIVIRKNINGER

Elocom® salve kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis du bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed er ikke kendt:

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Betændelse i det behandlede område.
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigt med rødme på næse, kinder, pande og hage (steroid-rosacea).
- Små punktformede eller større blødninger i huden.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Brænden, kløe, prikken/svien.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det

forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Uønsket hårvækst, overfølsomhed overfor det aktive stof i Elocom.

Hyppighed er ikke kendt:

- Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Rødme.
- Udslæt med bumser.

Elocom® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Elocom® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elocom® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Elocom® 1 mg/g, salve indeholder:

- Aktivt stof: Mometasonfuroat 1 mg/g
- Øvrige indholdsstoffer: Hexylenglycol, propylenglycolmonostearat, hvidt voks, hvid vaseline, phosphorsyre og rensset vand.

Pakningsstørrelser

Elocom® 1 mg/g salve 30 g
Elocom® 1 mg/g salve 60 g
Elocom® 1 mg/g salve 90 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Elocom® svarer til Elocon®.

Elocon® er et registreret varemærke, der tilhører Schering-Plough.