

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Venlafaxin AGP 75 mg depottabletter
Venlafaxin AGP 150 mg depottabletter
Venlafaxin AGP 225 mg depottabletter

Venlafaxin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Venlafaxin AGP til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Venlafaxin AGP
3. Sådan skal De tage Venlafaxin AGP
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Venlafaxin AGP er et antidepressivum, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og noradrenalin-reuptake-hæmmere (SNRI'er). Det er en gruppe medicin, der anvendes til at behandle depression og andre lidelser, såsom angstlidelser. Det menes, at personer, som er deprimerede og/eller angste, har et lavere niveau af serotonin og noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu ikke til bunds, hvordan antidepressiva virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin i hjernen.

Venlafaxin AGP er en behandling til voksne med depression. Venlafaxin AGP er også en behandling til voksne med følgende angstlidelse: Socialfobi (frygt for eller undgåelse af sociale situationer). Det er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser, for at De kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles, kan det ske, at Deres lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere alvorlig og vanskeligere at behandle.

Lægen kan have givet Dem Venlafaxin AGP for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE VENLAFAXIN AGP

Tag ikke Venlafaxin AGP

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Venlafaxin AGP.
- hvis De også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget nogen form for medicin, der kaldes irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), som bruges til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. Hvis De tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med anden medicin, herunder også Venlafaxin AGP, kan det give alvorlige eller endda livstruende

bivirkninger. De skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at De er holdt op med at tage Venlafaxin AGP, før De tager en MAO-hæmmer (se også afsnittene "Serotoninsyndrom" og "Brug af anden medicin").

Vær ekstra forsigtig med at tage Venlafaxin AGP

- hvis De tager anden medicin, som sammen med Venlafaxin AGP kan øge risikoen for at udvikle serotonin syndrom (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).
- hvis De har problemer med at synke eller forstyrrelser i mave eller tarm, som nedsætter evnen til at synke eller til at lade føden passere normalt gennem tarmsystemet
- hvis De har problemer med øjnene, såsom visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
- hvis De har eller har haft højt blodtryk.
- hvis De har eller har haft hjerteproblemer.
- hvis De har eller har haft kramper.
- hvis De har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi).
- hvis De har tendens til at få blå mærker eller til nemt at bløde (tidligere blødningslidelser), eller hvis De tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen.
- hvis Deres kolesteroltal stiger.
- hvis De eller nogen i Deres familie tidligere har eller har haft mani eller bipolær affektiv sindslidelse (følelse af at være eksalteret eller euforisk).
- hvis De har eller har haft en aggressiv adfærd.

Venlafaxin AGP kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Fortæl det til lægen, hvis det sker for Dem.

Hvis nogen af disse forhold passer på Dem, skal De tale med Deres læge, før De tager Venlafaxin AGP.

Tanker om selvmord eller forværring af Deres depression eller angst

Hvis De har en depression og/eller lider af angst, kan De nogle gange have selvmordstanker eller tanker om at skade Dem selv. Disse tanker kan blive værre, når De starter med at tage antidepressiv medicin, da det tager tid, før medicinen virker, sædvanligvis omkring 14 dage, men nogle gange længere.

De vil være mere tilbøjelig til at tænke sådan:

- hvis De tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv.
- hvis De er ung. Oplysninger fra kliniske undersøgelser har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos unge mennesker (under 25 år) med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på Dem selv, **bør De straks kontakte Deres læge eller hospitalet.**

Det kan være, De synes, det er en hjælp at tale med en nær ven eller pårørende om, at De er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kan eventuelt bede dem om at fortælle Dem, hvis de synes, at Deres depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i Deres opførsel.

Mundtørhed

Der er set rapporteret om mundtørhed hos 10% af de patienter, som får venlafaxin. Dette kan forøge risikoen for karies. De skal derfor være specielt omhyggelig med Deres tandhygiejne.

Anvendelse til børn og unge under 18 år

Venlafaxin AGP må normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. De skal også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de tager denne type lægemidler. Trods dette kan Deres læge vælge at ordinere Venlafaxin AGP til patienter under 18 år, fordi han/hun beslutter, at det er i deres interesse. Hvis Deres læge har ordineret Venlafaxin AGP til en patient under 18 år, og De gerne vil tale om dette, skal De henvende Dem til Deres læge. I de tilfælde hvor patienten er under 18 år, skal De fortælle det til lægen, hvis nogen af de oven for nævnte symptomer udvikler sig eller bliver værre. Desuden er der – hvad angår vækst, modning samt hjernens og den adfærdsmæssige udvikling – ingen viden om Venlafaxin AGP sikkerhed hos patienter under 18 år, der tager medicinen over længere tid.

Brug af anden medicin

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Deres læge afgør, om De kan tage Venlafaxin AGP sammen med anden medicin.

De må ikke begynde eller holde op med at tage medicin, ej heller medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler, før De har spurgt Deres læge eller på apoteket.

- Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere): Se afsnittet ”Det skal De vide, før De begynder at tage Venlafaxin AGP”
- Serotoninsyndrom:
Serotoninsyndrom, en potentielt livstruende tilstand (se afsnittet ”Bivirkninger”), kan forekomme ved behandling med Venlafaxin AGP, navnlig når det tages sammen med anden medicin. Eksempler på sådan medicin er bl.a.:
 - o triptaner (anvendes mod migræne)
 - o medicin til behandling af depression, f.eks. SNRI, SSRI'er, tricyklisk medicin eller medicin med lithium
 - o medicin med linezolid, et antibiotikum til behandling af infektioner
 - o medicin med moclobemid, en reversibel MAO-hæmmer til behandling af depression
 - o medicin med sibutramin (anvendes til vægttab)
 - o medicin med tramadol (et smertestillende middel)
 - o produkter med perikon (også kaldet hypericum perforatum, et naturlægemiddel eller urtemedicin, som bruges til at behandle mild depression)
 - o produkter med tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og depression)

Tegn og symptomer på serotoninsyndrom kan omfatte en kombination af følgende:

Rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig puls, forhøjet kropstemperatur, hurtige ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning. Søg straks læge, hvis De tror, De er ved at få serotoninsyndrom.

Følgende medicin kan også indvirke på Venlafaxin AGP og skal bruges med forsigtighed. Det er især vigtigt at nævne det over for Deres læge eller apoteket, hvis De tager medicin, der indeholder:

- ketoconazol (et svampedræbende lægemiddel)
- haloperidol eller risperidon (til behandling af psykiatriske lidelser)
- metoprolol (en betablokker til behandling af højt blodtryk og hjerteproblemer)

Brug af Venlafaxin AGP sammen med mad og drikke

Venlafaxin AGP skal tages sammen med mad (se afsnit 3 ”Sådan skal De tage Venlafaxin AGP”). Undgå at drikke alkohol, mens De tager Venlafaxin AGP.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

De skal straks fortælle det til Deres læge, hvis De bliver gravid eller har planer om at blive gravid. De må kun bruge Venlafaxin AGP, efter at De har drøftet de mulige fordele og risici for Deres ufødte barn med Deres læge.

Hvis De tager Venlafaxin AGP, når De er gravid, skal De fortælle det til Deres jordemoder og/eller læge, da Deres barn kan have symptomer, når det fødes. Disse symptomer starter normalt i de første 24 timer, efter at barnet er født. De kan f.eks. være, at barnet ikke spiser rigtigt og har åndedrætsproblemer. Hvis Deres barn har disse symptomer, når det fødes, og De er bekymret, skal De kontakte Deres læge og/eller jordemoder, som vil kunne rådgive Dem.

Venlafaxin AGP kan gå over i modermælken. Der er en risiko for påvirkning af barnet. De skal derfor diskutere det med Deres læge, og han/hun vil beslutte, om De bør holde op med at amme eller stoppe

behandlingen med Venlafaxin AGP.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før De ved, hvordan Venlafaxin AGP påvirker Dem.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Venlafaxin AGP

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE VENLAFAXIN AGP

Tag altid Venlafaxin AGP nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den normalt anbefalede startdosis til behandling af depression og socialfobi er 75 mg dagligt. Denne dosis kan gradvist øges af lægen til 150 mg dagligt, og hvis det er nødvendigt, op til en maksimal dosis på 375 mg dagligt ved depression. Den maksimale dosis ved socialfobi er 225 mg/dag.

Tag Venlafaxin AGP på omtrent samme tidspunkt hver dag, enten om morgenen eller om aftenen. Venlafaxin AGP skal synkes hele sammen med væske og må ikke deles, knuses, tygges eller opløses..

Venlafaxin AGP skal tages sammen med mad.

Hvis De har lever- eller nyreproblemer, skal De tale med Deres læge, fordi Deres Venlafaxin AGP-dosis eventuelt skal ændres.

De må ikke holde op med at tage Venlafaxin AGP uden først at tale med Deres læge (se afsnittet ”Hvis De holder op med at tage Venlafaxin AGP”).

Hvis De har taget for mange Venlafaxin AGP depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket straks, hvis De har taget flere Venlafaxin AGP depottabletter, end der står her eller flere end lægen har foreskrevet, og De af denne grund føler Dem utilpas. Tag æsken med..

Symptomerne på mulig overdosering kan være hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau (varierende fra søvnighed til koma), sløret syn, kramper eller anfald og opkastning.

Hvis De har glemt at tage Venlafaxin AGP

Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage den hurtigst muligt. Hvis det næsten er tid til næste dosis, skal De dog springe den glemte dosis over og kun tage en enkelt dosis som normalt. De må ikke tage mere end den daglige mængde Venlafaxin AGP, som De har fået ordineret, på én dag.

Hvis De holder op med at tage Venlafaxin AGP

De må ikke holde op med at tage Deres behandling eller reducere dosis uden lægens anvisning, heller ikke hvis De har det bedre. Hvis Deres læge mener, at De ikke længere har brug for Venlafaxin AGP, kan han/hun bede Dem reducere Deres dosis langsomt, før De helt holder op med behandlingen. Det er kendt, at der er opstået bivirkninger, når personer er holdt op med at bruge Venlafaxin AGP, navnlig når de pludseligt er holdt op med Venlafaxin AGP, eller når dosis reduceres for hurtigt. Nogle patienter kan opleve symptomer såsom træthed, svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré, nervøsitet, agitation, konfusion, ringen for ørerne, prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk stød, svækkelse, sveden, kramper eller influenza-lignende symptomer.

Deres læge fortæller Dem, hvordan De gradvist skal holde op med Venlafaxin AGP-behandlingen. Hvis De oplever et af disse eller andre symptomer, der er generende, skal De bede Deres læge om råd.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Venlafaxin AGP kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bliv ikke bekymret, hvis du opdager en tablet i din afføring, når du tager Venlafaxin AGP. Hele vejen gennem tarmsystemet udløses venlafaxin langsomt fra tabletten. Tabletkapslen forbliver uopløst og udskilles med afføringen. Derfor har du fået din venlafaxindosis selv om tabletkapslen er synlig.

Allergiske reaktioner

Tag ikke mere Venlafaxin AGP, hvis der opstår noget af det følgende. Fortæl det straks til lægen, eller tag til nærmeste skadestue.

- Trykken for brystet, hvæsende åndedræt, problemer med at synke eller åndedrætsproblemer.
- Hævelse af ansigt, hals, hænder eller fødder.
- Følelse af nervøsitet eller angst, svimmelhed, dunkende fornemmelse, pludselig rødme af huden og/eller en varm fornemmelse.
- Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter i rød eller bleg hud, der ofte klør).

Alvorlige bivirkninger

Hvis De bemærker nogen af de følgende tegn, kan De have brug for omgående lægehjælp:

- Hjerterproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk.
- Øjenproblemer, såsom sløret syn, udvidede pupiller.
- Nerveproblemer, såsom svimmelhed, sovende fornemmelse, bevægelsesforstyrrelse, kramper eller anfald.
- Psykiatriske problemer, såsom hyperaktivitet og opstemthed.
- Abstinenser (se afsnittet "Sådan skal De tage Venlafaxin AGP, Hvis De holder op med at tage Venlafaxin AGP").

Fuldstændig liste over bivirkninger

Hyppigheden af bivirkningerne (sandsynligheden for at de opstår) inddeles som følger:

Meget almindelig	Påvirker flere end 1 ud af 10 patienter
Almindelig	Påvirker 1 til 10 patienter ud af 100
Ikke almindelig	Påvirker 1 til 10 patienter ud af 1.000
Sjælden	Påvirker 1 til 10 patienter ud af 10.000
Ikke kendt	Hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data

Blodsygdomme

<i>Ikke almindelig:</i>	Blå mærker, sort, tjæreagtig afføring (faeces) eller blod i afføringen, hvilket kan være et tegn på indre blødning
<i>Ikke kendt:</i>	Nedsat antal trombocytter i blodet, hvilket fører til øget risiko for blå mærker eller blødning, blodforstyrrelser, som kan medføre øget risiko for infektion

Stofskifte/ernæring

<i>Almindelig:</i>	Vægttab, forhøjet kolesterol
<i>Ikke almindelig:</i>	Vægtøgning
<i>Ikke kendt:</i>	Lette ændringer i blodets indhold af leverenzymmer, nedsat natriumniveau i blodet, kløen, gul hud eller øjne, mørk urin, forkølelseslignende symptomer, som kan være symptom på betændelse i leveren (hepatitis), forvirring, overdreven indtagelse af vand (kendt som SIADH), unormal produktion af modermælk

Nervesystemet

<i>Meget almindelig:</i>	Mundtørhed, hovedpine
--------------------------	-----------------------

<i>Almindelig:</i>	Unormale drømme, nedsat libido, svimmelhed, øget muskeltonus, søvnløshed, nervøsitet, sovende fornemmelse, mathed, rystelser, forvirring, følelse af at være adskilt fra (uden for) sig selv og virkeligheden
<i>Ikke almindelig:</i>	Manglende følelse eller emotion, hallucinationer, ufrivillige muskelbevægelser, ophidselse, svækket koordination og balance
<i>Sjælden:</i>	En følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille, kramper eller anfald, følelse af at være eksalteret eller euforisk
<i>Ikke kendt:</i>	Høj temperatur med stive muskler, forvirring eller ophidselse, svedtendens, eller hvis De oplever rykvisse muskelbevægelser, som De ikke kan kontrollere. Det kan være symptomer på en alvorlig tilstand kendt som malignt neuroleptisk syndrom. Euforiske fornemmelser, dødsighed, vedholdende hurtige øjenbevægelser, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være fuld, svedtendens eller stive muskler, hvilket er symptomer på serotonin syndrom: desorientering og forvirring ofte ledsaget af hallucinationer (delirium). Stivhed, spasmer og ufrivillige muskelbevægelser, tanker om at gøre skade på sig selv eller slå sig selv ihjel

Sanseforstyrrelser

<i>Almindelig:</i>	Sløret syn
<i>Ikke almindelig:</i>	Ændret smagsfornemmelse, ringen for ørerne
<i>Ikke kendt:</i>	Alvorlige smerter i øjnene og nedsat eller sløret syn

Hjerte- eller kredsløbslidelser

<i>Almindelig:</i>	Forhøjet blodtryk, rødme, hjertebanken
<i>Ikke almindelig:</i>	Svimmelhed (især, når man rejser sig for hurtigt), besvimelse, hurtigt hjerteslag
<i>Ikke kendt:</i>	Fald i blodtrykket, unormalt, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, som kan føre til besvimelse

Luftvejssygdomme

<i>Almindelig:</i>	Gaben
<i>Ikke kendt:</i>	Hoste, hvæsen, stakåndethed og høj temperatur, hvilket er symptomer på en betændelseslignende tilstand (inflammation) i lungerne i forbindelse med en stigning i antallet af hvide blodlegemer (pulmonær eosinophili)

Fødselsforstyrrelser

<i>Meget almindelig:</i>	Kvalme
<i>Almindelig:</i>	Nedsat appetit, forstoppelse, opkastning
<i>Ikke almindelig:</i>	Skæren tænder, diarré

Hudlidelser

<i>Meget almindelig:</i>	Svedtendenser (også nattesved)
<i>Ikke almindelig:</i>	Udslæt, unormalt hårtab
<i>Ikke kendt:</i>	Hududslæt, som kan føre til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden, kløe, let udslæt

Knogler, led og muskler

<i>Ikke kendt:</i>	Uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller slaphed (rhabdomyolyse)
--------------------	---

Urinvejslidelser

<i>Almindelig:</i>	Problemer med at lade vandet, hyppigere vandladning
<i>Ikke almindelig:</i>	Ude af stand til at lade vandet

Reproduktive og seksuelle forstyrrelser

<i>Almindelig:</i>	Abnorm sædafgang/orgasme (mænd), manglende orgasme, erektil dysfunktion (impotens), uregelmæssigheder omkring menstruationen som f.eks. forøget blødning eller forøget, uregelmæssig blødning
--------------------	---

Ikke almindelig: Abnorm orgasme (kvinder)

Kroppen som helhed

Almindelig: Svækkelse (asteni), kuldegysninger

Ikke almindelig: Overfølsomhed over for sollys

Ikke kendt: Opsvulmet ansigt eller tunge, stakåndethed eller vejrtrækningsbesvær, ofte med udslæt på huden (dette kan være en alvorlig allergisk reaktion)

Venlafaxin AGP kan give bivirkninger, som De måske ikke bemærker, såsom blodtryksstigninger eller unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af leverenzymmer, natrium eller kolesterol. I mere sjældne tilfælde kan Venlafaxin AGP reducere funktionen af trombocytter i blodet, hvilket forøger risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor ske, at Deres læge vil tage blodprøver fra tid til anden, især hvis De har taget Venlafaxin AGP i lang tid.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Venlafaxin AGP efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30°C.

Blistre: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Plastbeholder: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Venlafaxin AGP indeholder

Aktivt stof: Venlafaxin.

Hver depottablet indeholder 75 mg, 150 mg eller 225 mg venlafaxin (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: Mannitol (E421), povidon K-90, macrogol 400, mikrokrySTALLinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Tabletfilm: Celluloseacetat, macrogol 400, hypromellose, lactosemonohydrat, titandioxid (E171), triacetin..

Venlafaxin AGPs udseende og pakningsstørrelse

Hvide, runde depottabletter.

Venlafaxin AGP fås i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 og 500 tabletter og i plastbeholder med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 og 500 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

A Generic Pharmaceutical AB

Kalendegatan 25

SE-211 35 Malmö

SVERIGE

Fremstiller:

Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), SPANIEN

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Medlemslandets navn	Lægemidlets navn
Danmark	Faxiprol (75/150/225) {translator's note: in Denmark: Venlafaxin AGP}
Finland	Venlafaxine AGP 75/150/225 mg depotabletti
Norge	Venlafaxine AGP 75/150/225 mg depotabletter
Slovakiet	Faxiprol 37,5/75/150/225
Slovenien	Faxiprol 37, 5/75/150/225 mg Tableta s podaljšanim sproščanjem
Spain	Zarelis retard 75/150/225 mg comprimidos de liberación prolongada
Sverige	Venlafaxine AGP 37,5/75/150/225 mg depotabletter
Tjekkiet	Faxiprol 37,5/75/150/225
Tyskland	Venlafaxin - ratiopharm 75/150/225 mg Retardtabletten
Ungarn	Faxiprol 37,5/75/150/225 mg retard tabletta
Østrig	Venaxibene 75/150/225 mg, Retardtabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2009