

# Maxalt<sup>®</sup> 10 mg tabletter

Rizatriptan

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Maxalt<sup>®</sup> til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Maxalt<sup>®</sup>
3. Sådan skal De tage Maxalt<sup>®</sup>
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

**1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Maxalt<sup>®</sup> tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes selektive 5-HT<sub>1B/1D</sub> receptoragonister.

Maxalt<sup>®</sup> mindsker den udvidelse af blodkarrene i hjernen, som forårsager hovedpinen i et migræneanfald.

De kan bruge Maxalt<sup>®</sup> til behandling af hovedpinen i Deres migræneanfald.

Lægen kan have givet dig Maxalt<sup>®</sup> for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

**2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE MAXALT<sup>®</sup>****Tag ikke Maxalt<sup>®</sup>**

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for rizatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De har moderat til svært forhøjet blodtryk eller ubehandlet let forhøjet blodtryk.
- hvis De har eller har haft hjerteproblemer (f.eks. blodprop eller brystmerter (angina pectoris)), eller hvis De har oplevet tegn på hjertesygdom.
- hvis De har alvorlig lever- eller nyrelidelse.
- hvis De tidligere har haft slagtilfælde (hjerneblødning) eller forbigående blodprop.
- hvis De har haft karsygdom i arme eller ben.
- hvis De anvender monoaminoxidase (MAO) hæmmere, såsom moclobemid, phenelzin, tranylcypromin eller pargylin (medicin mod depression), eller linezolid (et antibiotikum), eller har taget disse inden for de sidste 2 uger.
- hvis De tager anden medicin mod migræne såsom ergotamin eller dihydroergotamin, eller methysergid til at forhindre migræneanfald.
- hvis De tager anden medicin fra samme klasse, såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan, til at behandle Deres migræne (se "Brug af anden medicin" nedenfor).

Spørg Deres læge eller på apoteket hvis De er usikker på, om noget af ovenstående passer på Dem, før De tager Maxalt<sup>®</sup>.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Maxalt<sup>®</sup>**

Før De tager Maxalt<sup>®</sup>, skal De fortælle Deres læge eller apotek hvis:

- De har en eller flere af følgende risikofaktorer for hjertesygdom: Forhøjet blodtryk, diabetes, De ryger eller bruger nikotinerstatning, der er nogen i familien der har hjertesygdom, De er en mand over 40 år, eller De er kvinde, som har været i overgangsalderen.
- De har et særligt problem med måden Deres hjerte slår på (grenblok).
- De bruger naturmedicin med perikon.
- De har haft allergisk reaktion såsom hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan give åndedræts- og/eller synkebesvær (angioødem).
- De tager selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI) såsom sertralín, escitalopramoxalat og fluoxetin eller serotonin noradrenalin-genoptagshæmmere (SNRI) såsom venlafaxin og duloxetin mod depression.
- De har kortvarige symptomer som f.eks. brystmerter og strammen i brystet.

Hvis De tager Maxalt<sup>®</sup> for ofte, kan dette resultere i kronisk hovedpine. Hvis det er tilfældet, bør De kontakte Deres læge, da det måske vil være nødvendigt at stoppe med at tage Maxalt<sup>®</sup>. Fortæl Deres læge eller apotek om Deres symptomer. Lægen vil afgøre, om De har migræne. De bør kun tage Maxalt<sup>®</sup> mod migræneanfald. Maxalt<sup>®</sup> bør ikke anvendes til at behandle hovedpine, som kan være forårsaget af andre mere alvorlige tilstande.

**Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

**Tag ikke Maxalt<sup>®</sup>**

- Hvis De allerede tager en 5HT<sub>1B/1D</sub> agonist (også omtalt som "triptaner") såsom sumatriptan, naratriptan eller zolmitriptan.
- Hvis De tager en monoaminoxidasehæmmer (MOA) såsom moclobemid, phenelzin, tranylcypromin, linezolid eller pargylin, eller hvis De har taget en MAO-hæmmer inden for de sidste 2 uger.
- Hvis De tager medicin af ergotamin-typen såsom ergotamin-typen såsom ergotamin eller dihydroergotamin til behandling af Deres migræne.
- Hvis De tager methygersid for at forhindre migræneanfald.
- Hvis De tager SSRI/SNRI'er (mod depression).
- Hvis De tager propranolol, da dette kan forlænge nedbrydningshastigheden i kroppen.

De bør vente mindst 6 timer, efter De har taget Maxalt<sup>®</sup>, før De tager anden medicin af typen ergotamin eller dihydroergotamin eller methysergid.

De bør vente mindst 24 timer med at tage Maxalt<sup>®</sup>, efter De har taget medicin af ergotamin-typen.

**Brug af Maxalt<sup>®</sup> sammen med mad og drikke**

Tabletterne bør sluges hele med væske.

Det kan tage længere tid før Maxalt<sup>®</sup> virker, hvis De tager det efter mad. Selvom det er bedre at tage det på tom mave, kan De stadig tage det, hvis De har spist.

**Graviditet og amning**

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

*Graviditet:*

De må kun tage Maxalt<sup>®</sup> efter lægens anvisning.

*Amning:*

De bør undgå at amme før 24 timer efter De har taget Maxalt<sup>®</sup>.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Brug af Maxalt<sup>®</sup> kan måske give bivirkninger, f.eks. svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Maxalt<sup>®</sup>**

Maxalt<sup>®</sup> indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

**3. SÅDAN SKAL DE TAGE MAXALT<sup>®</sup>**

Maxalt<sup>®</sup> bruges til behandling af migræneanfald. Tag Maxalt<sup>®</sup> så hurtigt som muligt, efter Deres migræneanfald er begyndt. Brug det ikke til at forebygge et anfald.

Tag altid Maxalt<sup>®</sup> nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (10 mg). Tabletten skal sluges hel sammen med væske.

Hvis Deres migræne vender tilbage inden for 24 timer, kan De tage yderligere én dosis Maxalt<sup>®</sup>. De bør altid vente mindst 2 timer mellem doserne.

Hvis De stadig har migræne 2 timer efter De har taget Maxalt<sup>®</sup>, skal De ikke tage endnu en dosis Maxalt<sup>®</sup> til behandling af det samme anfald. De vil dog højst sandsynlig have effekt af Maxalt<sup>®</sup> ved næste anfald.

De må højst tage 2 doser Maxalt<sup>®</sup> inden for 24 timer.

#### Børn og unge (under 18 år):

Børn og unge under 18 år, må normalt ikke få Maxalt®. Tal med lægen.

#### Ældre (over 65 år):

Sikkerhed og effekt af Maxalt® til patienter over 65 år er ikke fuldstændigt undersøgt.

Hvis De tager propranolol eller har nyre- eller leversygdom, bør De tage Maxalt® 5 mg. Følg lægens anvisninger.

#### Hvis De har taget for mange Maxalt® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Maxalt® en der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med. Symptomer for overdosering er oftest svimmelhed og søvnighed. Derudover kan også forekomme besvimelse, langsom puls, opkastning, ufrivillig vandladning, forhøjet blodtryk og alvorlige hjerte-kar symptomer.

#### Hvis De har glemt at tage Maxalt®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

## 4. BIVIRKNINGER

Maxalt® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Koma, ustabil blodtryk, ekstremt høj kropstemperatur, manglende evne til at koordinere musklerne, ophidselse og hallucinationer (serotoninsyndrom). Kontakt læge eller skadestue.
- Andenød, angst, brystsmerte med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
- Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppighed ikke kendt:

- Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludselige mavesmerter, opkastninger og blodig diarré pga. dårlig blodtilførsel til tarmen. Kontakt læge eller skadestue.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svimmelhed, døsighed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelseløshed i huden, hovedpine, nedsat følelse ved berøring, nedsat opmærksomhed, rysten.
- Hjertebanken.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hedeture.
- Ubehag i svælget.
- Åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Kvalme, tør mund, opkastning, diarré.
- Rødmen, svedtendens, udslæt.
- Lokal tyngdefornemmelse.
- Kraftesløshed, svaghed, træthed, smerter i mave eller bryst.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner.
- Forvirring, søvnløshed, nervøsitet.
- Usikre bevægelser, svimmelhed (vertigo).
- Sløret syn.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Tørst, sure opstød/halsbrand.
- Kløe, nældefeber.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Nakkesmerter, lokal trykken, stivhed, muskelsvaghed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Smagsforstyrrelser/dårlig smag i munden.
- Hvæsende vejrtrækning.
- Ansigtssmerter.

Hyppighed ikke kendt:

- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Kramper i blodkarrene i arme og ben, herunder kolde hænder og fødder, samt følelseløshed i hænder og fødder. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Muskelsmerter.
- Ændringer i EKG.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved over 30°C.

Brug ikke Maxalt® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

#### Maxalt® 10 mg tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Rizatriptan 10 mg svarende til 14,53 mg rizatriptanbenzoat.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLINSK cellulose (E460a), pregelatineret majsstivelse, rød jernoxid (E172) og magnesiumstearat (E572).

#### Udseende og pakningsstørrelser

Maxalt® 10 mg er kapselformede, svagt lyserøde tabletter mærket med "MAXALT" på den ene side og "MSD 267" på den anden side.

Maxalt® 10 mg tabletter findes i pakninger med 6 og 18 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

#### Indehaveren af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  
Tarp Byvej 81-83  
6715 Esbjerg N.

#### Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  
Tarp Byvej 81-83  
6715 Esbjerg N.

Maxalt® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)