

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN PERGOLID COPYFARM

Pergolidmesilat 0,05 mg, 0,25 mg og 1,0 mg tabletter



Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Pergolid Copyfarm til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Pergolid Copyfarm og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pergolid Copyfarm
3. Sådan skal du tage Pergolid Copyfarm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Pergolid Copyfarm
6. Yderligere oplysninger

1. Virkningen af Pergolid Copyfarm og hvad du skal bruge det til

Pergolid Copyfarm er et middel mod Parkinsons sygdom, som du normalt vil få sammen med levodopa. Pergolid Copyfarm øger virkningen af dopamin (et signalstof i hjernen), så symptomer på Parkinsons sygdom som rysten og muskelstivhed bliver mindre udtalte. Du kan tage Pergolid Copyfarm mod Parkinsons sygdom.

Lægen kan have givet dig Pergolid Copyfarm til anden anvendelse. Følg lægens anvisning.

1. Det skal du vide, før du begynder at tage Pergolid Copyfarm

Tag ikke Pergolid Copyfarm hvis

- du er overfølsom over for pergolid, stoffer der ligner pergolid (andre ergolinderivater), eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- du tidligere har haft fortykkelse af bindevævet (fibrose) i et organ (f.eks. i lunger, hjertehinde eller bughulen)
- du har en sygdom i hjertets klapper
- du har meget dårlig lever.

Vær ekstra forsigtig med at tage Pergolid Copyfarm

Behandling med Pergolid Copyfarm kan gøre, at du pludseligt falder i søvn, nogle gange uden at være søvning. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil, motorcykel eller cykel eller betjener maskiner, mens du tager Pergolid Copyfarm. Tal med lægen.

Fortæl dine pårørende, at du er i behandling med Pergolid Copyfarm, lad dem evt. læse indlægssedlen.

Du vil normalt få Pergolid Copyfarm i kombination med anden medicin mod Parkinsons sygdom.

Tal med lægen, inden du tager Pergolid Copyfarm, hvis du har eller har haft:

- hjerteproblemer
- lungeproblemer.

Du skal straks kontakte lægen, hvis du får

- åndenød, uforklarlig vedvarende hoste, brystmerter som evt. stråler ud i armen
- smerter i lænden eller siden og hævede fødder eller ben samt smerter eller ømhed i maven
- meget høj feber (over 41 °C), udtalt muskelstivhed, ændret psykisk tilstand, svingende blodtryk, svedtendens, bevægelsesforstyrrelser, forvirring og hallucinationer. Tilstanden kan være livsfarlig og kræver øjeblikkelig lægehjælp
- hallucinationer.

Vær opmærksom på følgende

- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pergolid Copyfarm. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
- Lægen vil løbende undersøge dit hjerte, mens du er i behandling med Pergolid Copyfarm. Tal med lægen.
- Du kan få for lavt blodtryk under behandlingen med Pergolid Copyfarm, særligt i starten af behandlingen. Det kan vise sig ved svimmelhed, når du rejser dig eller ved besvimelse og træthed.

- Hvis du er i samtidig behandling med anden medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa), kan det medføre eller forværre ufrivillige bevægelser, forvirring og hallucinationer. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod skizofreni og andre psykiske sygdomme (phentiaziner, butyrophenoner, thioxantener)
- medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid)
- blodfortyndende medicin (warfarin).

Brug af Pergolid Copyfarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Pergolid Copyfarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Pergolid Copyfarm med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin,

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Pergolid Copyfarm efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Pergolid Copyfarm efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pergolid Copyfarm kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal være opmærksom på, at behandling med Pergolid Copyfarm kan gøre, at du pludseligt falder i søvn, nogle gange uden at være søvning.

Hvis du bliver søvning eller pludseligt falder i søvn, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykel og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe dit eget eller andres liv og helbred i fare. Tal med lægen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pergolid Copyfarm

Pergolid Copyfarm indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Pergolid Copyfarm

Du skal tage Pergolid Copyfarm med et glas vand.

Tag altid Pergolid Copyfarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. Den sædvanlige dosis er:

Voksne, behandling sammen med levodopa:

Den sædvanlige startdosis er 1 tablet på 0,05 mg 1 gang daglig i 2 dage.

Herefter sætter lægen normalt dosis gradvist op hver 3. dag.

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 1 tablet på 1 mg 3 gange daglig.

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Børn:

Du må ikke anvende Pergolid Copyfarm til børn, hvis det ikke er foreskrevet af lægen.

Hvis du har taget for mange Pergolid Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pergolid Copyfarm, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er opkastning, svimmelhed evt. besvimmelse pga. for lavt blodtryk, ophidselse, alvorlige hallucinationer, alvorlige ufrivillige bevægelser, hjertebanken og hurtig eller uregelmæssig puls.

Hvis du har glemt at tage Pergolid Copyfarm
Hvis du har glemt en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med din sædvanlige dosering.

Hvis du holder op med at tage Pergolid Copyfarm
Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal nedtrapning af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører, eller din dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række farlige symptomer som meget høj feber (over 41 °C), udtalt muskelstivhed, ændret psykisk tilstand, bevægelsesforstyrrelser, forvirring og hallucinationer. Symptomerne kan være livsfarlige og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

4. Bivirkninger

Pergolid Copyfarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hurtig puls og andre forstyrrelser i hjerterytmen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Søvnliggende sløvhed. Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt læge.

Hyppigheden er ikke kendt

- Betændelse eller væske i hjertesækken med feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Smerter i brystet, åndenød, hævede ben, hoste, pludselig besvimelse pga. lidelse i hjerteklapperne. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Dannelse af bindevæv i lungerne med tiltagende åndenød. Kontakt læge eller skadestue.
- Åndenød pga. fortykkelse af lungehinden med bindevæv. Kontakt læge.
- Betændelse eller væske i lungehinden, med smerter i brystet, åndenød, hoste og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Træthed, vægttab, feber, smerter i lænd eller bækken, evt. aftagende urinemængde pga. fortykkelse af bindevævet bagest i bughulen. Kontakt læge.
- Alvorlig tilstand med meget høj feber (over 41 °C), muskelstivhed, ændret sindstilstand og påvirkning af nervesystemet. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Bevægelsesforstyrrelser, ufrivillige, vridende bevægelser af kroppen. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Svimmelhed.
- Kvalme, forstoppelse.
- Træthed, forvirring.
- Snue.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Blegthed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Åndenød. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Besvimelse. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
- Hjertebanken.
- Søvnløshed.
- Dobbeltsyn.
- Diare, opkastning, sure opstød, mundtørhed, appetitløshed.
- Angst.
- Hævede fødder og ben. Kontakt læge.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Feber.
- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Hyppigheden er ikke kendt

- Udslæt.

Pergolid Copyfarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer du Pergolid Copyfarm

Opbevar Pergolid Copyfarm utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Pergolid Copyfarm ved over 25 °C.
Brug ikke Pergolid Copyfarm efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Pergolid Copyfarm 0,05 mg, 0,25 mg, 1 mg tabletter indeholder
Aktivt stof: Pergolidmesilat.
Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, pregelatineret stivelse, natriumstivelsesglycollat (Type A), mikrokrySTALLinsk cellulose, magnesiumstearat, jernoxider (E 172).
Pergolid Copyfarm 0,25 mg tabletter indeholder desuden: Indigocarmín (E 132).

Pergolid Copyfarms udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Pergolid Copyfarm 0,05 mg tabletter er en elfenbensfarvet, kapselformet tablet. Tabletten har delekærv på den ene side samt trykt 9 på venstre side og 3 på højre side af delekærven. På modsatte side af tabletten er trykt 7160.

Pergolid Copyfarm 0,25 mg tabletter er en marmoreret grøn, kapselformet tablet. Tabletten har delekærv på den ene side samt trykt 9 på venstre side og 3 på højre side af delekærven. På modsatte side af tabletten er trykt 7159.

Pergolid Copyfarm 1,00 mg tabletter er en marmoreret rosa, kapselformet tablet. Tabletten har delekærv på den ene side samt trykt 9 på venstre side og 3 på højre side af delekærven. På modsatte side af tabletten er trykt 7161.

Pakningsstørrelser
10, 14, 28, 30, 56, 98, 100 tabletter i blister.
100 tabletter i plastbøtte.
Ikke alle pakningsstørrelser eller styrker er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen
Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@copyfarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret den 03/2008

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Copyfarm A/S.



(03) 2098301