

Flasken åbnes og tilsættes omhyggeligt vand op til flaskens røde streg.

# NORIT<sup>®</sup> CARBOMIX

Granulat til oral suspension 50 g  
50 g aktivt kul

## Inhaltsfortegnelse

**Hvad er Norit Carbomix og hvad virker det mod?**

**Inden indtagelse af Norit Carbomix**

**Sådan indtages Norit Carbomix**

**Eventuelle bivirkninger**

**Opbevaring af Norit Carbomix**

**Yderligere information**

**1. Hvad er Norit Carbomix og hvad virker det mod?**

Den virksomme bestanddel i Norit Carbomix kan binde (adsorbere) skadelige eller uønskede stoffer i mave-tarmkanalen.

Norit Carbomix anvendes i tilfælde af akut oral forgiftning og overdosering af medicin.

**2. Inden indtagelse af Norit Carbomix**

**Indtag ikke Norit Carbomix**

- Hvis du er allergisk over for kul eller et af indholdsstofferne.  
- Hvis forgiftningen helt sikkert skyldes ætsende stoffer (stærke syrer som f.eks. saltsyre eller baser som f.eks. allsbræns). Det vil kunne vaskelagere undersøgelse af spiserør (oesofagogoskopi) og undersøgelse af maven (gæstroskopi).

**Særlige advarsler ved indtagelse af Norit Carbomix**

Tag kontakt til læge eller giftcenter. Norit Carbomix kan anvendes ved mange typer forgiftning. Men nogle forbindelser og opløsninger, som f.eks. jernforbindelser, lithium-, thallium-, cyanid-, methanol-, ethanol-, ethylenglykol- og petroleumsholdige opløsninger adsorberes i mindre grad af Norit Carbomix. I tilfælde af forgiftning med sådanne stoffer skal anden form for afgiftning foretages (f.eks. maveskylling). De mest almindelige forgiftninger af denne type er angivet nedenfor med den for disse stoffer relevante behandling:

**Særlig modgift:**

Cyanid	Særlig modgift:
Jernforbindelser	Natriumnitrit/4-dimethylaminofenol
Lithium	Deferoxamin
Methanol/denatureret alkohol	Kalciumpolystyrenulfonat
Ethylenglykol/frostvæske	Alkohol (ethanol)
	Alkohol (ethanol)

Ved mange typer forgiftning anvendes både Norit Carbomix og en særlig modgift (f.eks. ved paracetamolforgiftning: Norit Carbomix og acetylcystein).

Norit Carbomix kan give stort afføring.

**Reaktion med andre præparater**

Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre oralt indtagne præparater. Aktivt kul kan nedsætte virkningen af p-piller. Alternativ, effektiv og sikker prævention er i så fald nødvendig under behandlingen.

**Graviditet og amning**

Aktivt kul kan så vidt vides anvendes efter forskrifterne uden risiko for foster eller barn under graviditet og amning. Spørg læge eller apoteker til råds inden indtagelse af nogen form for medicin. Fortæl det til læge eller apoteker, hvis du tager, eller for nyligt har taget, anden medicin - dette gælder også medicin, der ikke er receptpligtig.

**Kørsel og betjening af maskiner**

Indtagelse af aktivt kul påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Batch-nummer: se pakningens bund.

Anvendes inden: se pakningens bund.

**Læs denne etiket grundigt igennem, da den indeholder vigtige oplysninger**  
Dette præparat er ikke receptpligtigt. Alligevel er det vigtigt at bruge Norit Carbomix rigtigt for at opnå det bedste resultat.

- Behold denne etiket. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekeren, om du har brug for yderligere information og rådgivning. Søg omgående læge eller giftcenter i tilfælde af akut forgiftning gennem munden eller overdosis af medicin. Straks efter, forudsat lægens/giftcentrets godkendelse, indtages Norit Carbomix.

Hvis nogen form for bivirkninger bliver alvorlig, eller hvis du oplever bivirkninger, der ikke er nævnt i denne etiket, bedes du informere læge eller apoteker.

**Ved forgiftning**  
Indtages oralt

**Anvendelse:** Ved akut oral forgiftning og overdosering af medicin.

Hjælpstoffer: citronsyremonohydrat (E330), glycerol (E422) og gummi arabicum (E414).

Læs etiket inden brug.

Opbevares utilgængeligt for børn. Der er ingen krav til opbevaringstemperatur.

Tilberedt suspension skal opbevares ved 2 °C - 8 °C (i køleskab) og kan maks. holde sig 3 dage efter tilberedelse.

Distributør i Danmark:

Aage Christensen A/S, Skelmosøvej 10, 2500 Valby.

Varenummer 070327

Revideret i juli/august 2008

**3. Sådan indtages Norit Carbomix**

**Dosering og indtagelse**

Voksne og børn over 12 år: Ved akut forgiftning og overdosering indtages 1-2 flasker Norit Carbomix så hurtigt som muligt (= 50-100 g aktivt kul). Ved alvorlig forgiftning tilsættes behandlingen i et par dage med en dosis på 20 g Norit Carbomix hver 4-6 time (20 g aktivt kul svarer ca. til 160 ml af suspensionen). Hvis indholdet indtages af flere gange, skal flasken rystes grundigt for hver gang. Suspensionen skal indtages oralt (= gennem munden). Indtagelse gennem munden må ikke ske, hvis patienten ikke er i stand til (ved tilstrækkelig bevidsthed) at drikke produktet uden risiko. Ved bevidstløse patienter eller patienter, der ikke er helt ved bevidsthed, skal en læge, eller en sygeplejerske under lægeledelse, give suspensionen ved hjælp af en sonde.

Børn mellem 4 og 12 år: Ved akut forgiftning og overdosering hos børn under 12 år gives en halv flaske oralt.

Børn under 4 år: Der startes med at give en dosis på en kvart (1/4) flaske, hvilket gentages flere gange i samråd med lægen. Ved flere gange behandling rystes flasken grundigt for hver gang.

For at modvirke optagelse af giftstoffer i kroppen og for at fjerne de allerede oparbejdede giftstoffer er det vigtigt, at Norit Carbomix indtages hurtigt. Dog kan længere indtagelse også have en positiv virkning. Ved alvorlig forgiftning anbefales det at indtage flere doser aktivt kul. Hvis indholdet indtages af flere gange, skal flasken rystes grundigt for hver gang.

Norit Carbomix kan også gives efter opkastning eller maveskylling.

**Tilberedelse af suspension:** flasken åbnes og tilsættes omhyggeligt vand op til flaskens røde streg. Luk flasken igen og ryst den, således at granulatet ikke klister sammen. Flasken åbnes forsigtigt og indholdet indtages omgående.

Flasken er udstyret med en special top, der kan bruges ved hurtig og direkte sondetildning. Ventilér flasken og skær delvis toppen af inden sondetildning.

Hvis Norit Carbomix virker for voldsomt eller ikke virker i tilstrækkelig grad, rådføres med læge eller apoteker.

**Hvis du tager mere Norit Carbomix end foreskrevet:** Hvis du har taget for meget Norit Carbomix, skal du omgående søge læge eller kontakte en apoteker. Efter indtagelse af for høj en dosis aktivt kul kan der opstå mavespine og alvorlig mave/tarm-forstoppelse.

**Hvis du glemmer at tage Norit Carbomix:** Hvis du glemte at tage en dosis Norit Carbomix, tages dette snarest muligt. Men hvis det er lige ved at være tid til næste dosis, springes den manglende dosis over, og du fortsætter indtagningen plangmæssigt. Tag aldrig dobbelt dosis som kompensation for en glemt dosis. Søg læge eller kontakt en apoteker, hvis du er i tvivl.

**4. Eventuelle bivirkninger**

Som det også gælder alle andre præparater, kan Norit Carbomix give bivirkninger. Der opstår ofte forstoppelse (i mere end 1 af 100 tilfælde, men i under 1 af 10 tilfælde). Hvis du oplever en bivirkning, der ikke fremgår af denne folder, bedes du informere læge eller apoteker.

**5. Opbevaring af Norit Carbomix**

Opbevares utilgængeligt for børn og i originalemballage. Der er ingen krav til opbevaringstemperatur. Bør ikke anvendes efter pakkens udløbsdato.

Tilberedt suspension skal opbevares ved 2 °C - 8 °C (i køleskab) og kan maks. holde sig 3 dage efter tilberedelse.

**6. Yderligere information**

**Hvad består Norit Carbomix af?**

Den virksomme bestanddel i Norit Carbomix er aktivt kul baseret på plantemateriale ('carbo activatus'). En flaske indeholder 50 g aktivt kul. De vigtige ingredienser er citronsyremonohydrat (E330), glycerol (E422) og gummi arabicum (E414).

**Hvordan ser Norit Carbomix ud, og hvad er det i pakningen?**

Det aktive kul er sort til mørkebrunt og pakket i en plastikflaske med skruelåg.

**Registreringsindehaver og fabrikant**

Registreringsindehaver: Norit N.V., Amersfoort, Holland

Fabrikant: Norit Nederland B.V., Amersfoort, Holland

Opdaget i registret under nr.: MI 18215

Al information om dette præparat kan fås hos den lokale repræsentant af markedsføringsstilledele:

Aage Christensen A/S

Skelmosøvej 10

DK-2500 Valby

Danmark

Tlf. + 45 36 44 24 44

info@agechristensen.dk

Denne patientvejledning er senest blevet revideret/godkendt i juli 2008.

109.001/08-10

DOBBE|PHARMA COMMUNICATIONS

## ATTENTIE!

Eventuele correcties duidelijk leesbaar angeven. **PAS NA ONTVANGST VAN DE ONDERTEKENDE PROEF ZAL TOT DE VOLGENDE PRODUCTIEFASE WORDEN OVERGEGAAN.** Na telefonische goedkeuring deze ondertekende proef s.v.p. aan ons adres retourneren.

Ordernr.: 170027 **Proefnr.: 2**

Plano formaat: 192 x 120 mm

Gevouwen formaat: -

Itemnummer: 109.001/08-10

Artikel nr. Dobber: N02344

Drukkleur(en): Zwart/PMS 032/286

Opt. code/Pharmacode: -

Font: -

Corps: -

Interlinie: -

Datum: 06 - 08 - 2010

Naam en handtekening:

T. Zuurbier

**Door cliënt in te vullen**

Voor akkoord:

Datum:

Naam en handtekening:

