

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Escitalopram ratiopharm 5 mg fillovertrukne tabletter
Escitalopram ratiopharm 10 mg fillovertrukne tabletter
Escitalopram ratiopharm 15 mg fillovertrukne tabletter
Escitalopram ratiopharm 20 mg fillovertrukne tabletter

Escitalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Escitalopram ratiopharm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram ratiopharm
3. Sådan skal du tage Escitalopram ratiopharm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Escitalopram ratiopharm tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoningenoptagshæmmere). Disse midler påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin. Forstyrrelser af serotoninsystemet anses for at være et vigtigt element i udviklingen af depression og lignende sygdomme.

Escitalopram ratiopharm indeholder escitalopram, der bruges til behandling af depression (moderate til svære depressive episoder) og angst (såsom panikangst med eller uden agorafobi (angst for at befinde sig på steder eller i situationer, hvor det er vanskeligt at komme bort eller skaffe hurtig hjælp), socialfobi, generaliseret angst og obsessiv-kompulsiv tilstand (tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger)).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ESCITALOPRAM RATIOPHARM

Tag ikke Escitalopram ratiopharm

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for escitalopramoxalat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Escitalopram ratiopharm (se pkt. 6 "Yderligere oplysninger").

- Hvis du tager anden medicin, der tilhører en gruppe lægemidler ved navn MAO-hæmmere og omfatter selegilin (mod Parkinsons sygdom), moclobemid (mod depression) og linezolid (antibiotikum).
- Hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).
- Hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen (se også afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Escitalopram ratiopharm" nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, hvis du har andre sygdomme eller lidelser, så lægen eventuelt kan tage højde for dette. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen:

- hvis du har epilepsi. Behandling med Escitalopram ratiopharm bør stoppes, hvis du får anfald for første gang, eller hvis anfaldshyppigheden stiger (se også afsnit 4 "Bivirkninger").
- hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. I så fald kan lægen være nødt til at ændre dosis.
- hvis du har diabetes. Behandling med Escitalopram ratiopharm kan påvirke blodsukkeret. Derfor kan det blive nødvendigt at ændre doseringen af insulin og/eller tabletter til behandling af diabetes.
- hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet.
- hvis du let kommer til at bløde eller let får blå mærker.
- hvis du får elektrochok (elektrokonvulsiv behandling).
- hvis du har en hjertesygdom, der berører en af kranspulsårerne.
- Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.
- Hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
- Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
- Hvis du har øjenproblemer, såsom visse typer af glaukom (forhøjet tryk i øjet)

OBS!

Ligesom med anden medicin til behandling af depression eller lignende sygdomme opnås der ikke bedring med det samme. Efter start på behandlingen med Escitalopram ratiopharm kan der gå flere uger, før du mærker bedring. Ved behandling af panikangst går der sædvanligvis 2-4 uger, før der opnås bedring. I begyndelsen af behandlingen kan nogle patienter opleve tiltagende angst, som dog forsvinder under den fortsatte behandling. Det er derfor vigtigt, at du nøje følger lægens anvisninger og ikke stopper med behandlingen eller ændrer dosis uden at rådføre dig med din læge.

Selvmodstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
- Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at det var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, **bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende** om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Nogle patienter med mani-depressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette.

Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første ugers behandling. Fortæl det straks til lægen, hvis du får disse symptomer.

Somme tider vil du måske ikke være opmærksom på disse symptomer, og det kan derfor være en hjælp at bede en ven eller pårørende om også at være opmærksom på tegn på forandringer i din adfærd.

Du bør omgående fortælle det til din læge eller kontakte det nærmeste hospital, hvis du har foruroligende tanker eller oplevelser, eller hvis du får nogle af de nævnte symptomer under behandlingen.

Børn og unge under 18 år:

Escitalopram ratiopharm bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Din læge kan alligevel vælge at ordinere Escitalopram ratiopharm til patienter under 18 år ud fra en vurdering af, at det vil det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Escitalopram ratiopharm, og du ønsker at tale om dette. Du bør informere lægen, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der får Escitalopram ratiopharm. Der foreligger endnu ikke langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og udvikling af åndsevner og adfærd, når Escitalopram ratiopharm gives til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram ratiopharm

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

TAG IKKE ESCITALOPRAM RATIOPHARM hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

- MAO-hæmmere (non-selektive monoaminoxidasehæmmere), der indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid eller tranlycypromin som det aktive stof. Hvis du har taget et af disse midler, skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Escitalopram ratiopharm. Efter behandlingen med Escitalopram ratiopharm skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse midler.
- RIMA-præparater (reversible selektive MAO-A-hæmmere), der indeholder moclobemid (til behandling af depression).
- Irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (til behandling af Parkinsons sygdom). Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.
- Linezolid, som er et antibiotikum.
- Lithium (til behandling af mani-depressive lidelser) og tryptophan.
- Imipramin og desipramin (til behandling af depression).
- Sumatriptan og lignende medicin (til behandling af migræne) og tramadol (mod kraftige smerter). Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.

- Cimetidin og omeprazol (til behandling af mavesår), fluvoxamin (mod depression) og ticlopidin (nedsætter risikoen for slagtilfælde). Disse midler kan øge mængden af Escitalopram ratiopharm i blodet.
- Prikbladet perikon (*Hypericum perforatum*) – et naturlægemiddel mod modløshed.
- Acetylsalicylsyre og NSAID (nonsteroid antiinflammatoriske midler) (medicin til at lindre smerter eller fortynde blodet, såkaldte antikoagulanter). Disse kan øge blødningstendensen.
- Warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (medicin til at fortynde blodet, såkaldte anti-koagulanter). Lægen vil sikkert undersøge, hvor længe blodet er om at størkne (koagulationstiden), ved indledning og afslutning af behandling med Escitalopram ratiopharm for at sikre, at du stadig får den rette dosis af det blodfortyndende middel.
- Mefloquin (til behandling af malaria), bupropion (til behandling af depression) og tramadol (til behandling af svære smerter) på grund af en øget risiko for, at du får kramper.
- Medicin til behandling af skizofreni og andre psykoser (antipsykotika) på grund af en øget risiko for, at du får kramper, samt midler mod depression.
- Flecainid, propafenon og metoprolol (mod hjerte- og karsygdomme), desipramin, clomipramin og nortriptylin (mod depression) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Det kan være nødvendigt at ændre dosis af Escitalopram ratiopharm.
- Medicin, der kan nedsætte mængden af kalium eller magnesium i blodet (især vandrivende lægemidler). Spørg lægen eller apoteket, om den medicin, du tager eller anvender samtidig med Escitalopram ratiopharm, hører til denne gruppe.

Brug af Escitalopram ratiopharm med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Escitalopram ratiopharm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt (se afsnit 3 "Sådan skal du tage Escitalopram").

I lighed med en række lægemidler bør Escitalopram ratiopharm ikke kombineres med alkohol, selv om medicinen ikke forventes at reagere med alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis du er gravid eller ammer, må du kun tage Escitalopram ratiopharm efter aftale med lægen.

Tag ikke Escitalopram ratiopharm, med mindre du og din læge har diskuteret de involverede risici og fordele.

Hvis du tager Escitalopram ratiopharm under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at det kan indebære følgende virkninger for den nyfødte: vejrtrækningsbesvær, blålig hud, anfald, forandringer i kropstemperatur, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet, sløvhed, konstant gråd, søvnighed og søvnbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer. Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager escitalopram. Når medicin som escitalopram tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Escitalopram ratiopharm, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat.

Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det anbefales, at du ikke færdes i trafikken eller betjener maskiner, før du ved, hvordan Escitalopram ratiopharm påvirker dig.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ESCITALOPRAM RATIOPHARM

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne:

Depression

Den sædvanlige dosis Escitalopram ratiopharm er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt.

Panikangst

Startdosis af Escitalopram ratiopharm er 5 mg én gang dagligt i den første uge, hvorefter doseringen øges til 10 mg dagligt. Lægen kan øge denne dosis yderligere op til højst 20 mg dagligt.

Socialfobi

Den sædvanlige dosis Escitalopram ratiopharm er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan enten nedsætte dosis til 5 mg dagligt eller øge dosis op til højst 20 mg dagligt afhængigt af, hvordan du reagerer på medicinen.

Generaliseret angst

Den sædvanlige dosis Escitalopram ratiopharm er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt.

Obsessiv-kompulsiv tilstand

Den sædvanlige dosis Escitalopram ratiopharm er 10 mg én gang dagligt. Lægen kan øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt.

Ældre (over 65 år)

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg Escitalopram ratiopharm, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 10 mg dagligt.

Børn og unge under 18 år:

Børn under 18 år må normalt ikke få Escitalopram ratiopharm. Yderligere oplysninger: se afsnit 2 "Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram ratiopharm".

Du kan tage Escitalopram ratiopharm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag tabletten med lidt vand. Lad være med at tygge den, da smagen er bitter.

Om nødvendigt kan tabletterne deles ved, at du først anbringer tabletten på en plan overflade med delekærven opad. Dernæst brydes tabletten ved at trykke nedad med en pegefingertip i hver ende.

Behandlingens varighed

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Escitalopram ratiopharm, selv om der går nogen tid, før du mærker bedring.

Du må ikke ændre doseringen af Escitalopram ratiopharm uden først at have talt med lægen.

Bliv ved med at tage Escitalopram ratiopharm i den periode, lægen har anbefalet. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har igen fået det godt.

Hvis du har taget for mange Escitalopram ratiopharm tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Escitalopram ratiopharm tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet - også selv om du ikke føler dig utilpas. . Tegn på en overdosis kan for eksempel være svimmelhed, skælven, ophidselse, krampe, koma, kvalme, opkastning, forandringer i hjerterytmen, blodtryksfald eller forandringer i kroppens salt- og væskebalance. Tag æsken/holderen med Escitalopram ratiopharm med hen til lægen eller på hospitalet.

Hvis du har glemt at tage Escitalopram ratiopharm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, og du kommer i tanke om det lige før sengetid, skal du tage den med det samme. Fortsæt med den sædvanlige dosis næste dag. Hvis du først kommer i tanke om det om natten eller næste dag, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte, som du plejer.

Hvis du holder op med at tage Escitalopram ratiopharm

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Når du har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at stoppe med Escitalopram ratiopharm ved at nedtrappe dosis i løbet af nogle uger.

Når du holder op med at tage Escitalopram ratiopharm - og især hvis det sker brat - kan du få seponeringssymptomer. Det er ganske almindeligt ved stop af behandlingen med Escitalopram ratiopharm. Risikoen er større efter brug af Escitalopram ratiopharm i længere tid eller i store doser, eller når doseringen nedtrappes for hurtigt. De fleste oplever, at symptomerne er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle patienter kan de dog være svære eller langvarige (2-3 måneder eller længere). Kontakt lægen, hvis du får svære seponeringssymptomer, når du holder op med at tage Escitalopram ratiopharm. Lægen kan foreslå, at du begynder på tabletterne igen og dernæst bruger længere tid på at nedtrappe dem.

Seponeringssymptomer omfatter svimmelhed (usikker på benene eller mister balancen), prikken/stikken, svien og (mindre almindeligt) fornemmelse som ved elektrisk stød også i hovedet, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst, hovedpine, kvalme, svedudbrud (også om natten), rastløshed eller ophidselse, skælven/rysten, forvirring eller desorientering, letpåvirkelig eller irritabel, diarré (tynd afføring), synsforstyrrelser, hjertebanken (palpitationer).

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne går normalt over efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder at få det bedre.

Kontakt lægen, hvis du får nogle af følgende bivirkninger under behandlingen:

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- usædvanlige blødninger, herunder mave-tarm-blødninger.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet, hvis du oplever hævelser i hud, tunge, læber eller ansigt eller har besvær med at trække vejret eller synke (allergisk reaktion).
- Hvis du får høj feber eller lider af ophidselse, forvirring, skælven og pludselige muskel-sammentrækninger, kan det være tegn på en sjælden tilstand, der kaldes et serotonergt syndrom. Kontakt lægen, hvis du har det sådan.

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du stoppe med at tage Escitalopram ratiopharm: og kontakte din læge eller hospitalet omgående:

- vandladningsbesvær
- kramper (anfald) – se også afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler"
- hvis huden og det hvide i øjnene bliver gult, kan det være tegn på nedsat leverfunktion/hepatitis.
- hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes

Endvidere er der indberettet følgende bivirkninger:

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- hovedpine
- kvalme

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- tilstoppet næse eller snue (sinuitis)
- nedsat eller øget appetit
- angst, rastløshed, unormale drømme, problemer med at falde i søvn, søvnighed, svimmelhed, gaben, skælven, prikken i huden
- diarré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed
- øget svedtendens
- muskel- og ledsmerter (artralgi og myalgi)
- seksuelle forstyrrelser (forsinket sædudtømmning, rejsningsproblemer, nedsat lyst til sex samt hos kvinder problemer med at få orgasme)
- træthed, feber
- vægtstigning.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- nældefeber (urticaria), udslæt, kløe (pruritus)
- tænderskæren, ophidselse, nervøsitet, panikangst, forvirring
- søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, besvimelse (synkope)
- forstørrede pupiller (mydriase), synsforstyrrelser, ringen for ørerne (tinnitus)
- hårtab
- blødning fra skeden
- vægttab
- hurtig puls
- hævelser i arme eller ben
- næseblod.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- aggressivitet, depersonalisering, hallucinationer
- langsom puls
- selvmordsadfærd – se også under "Advarsler og forsigtighedsregler".

Nogle patienter har indberettet følgende bivirkninger (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne er kvalme og utilpashed med muskelsvækkelse eller forvirring)
- svimmelhed på grund af blodtryksfald, når man rejser sig (ortostatisk hypotension)
- unormal leverfunksionsprøve (forhøjede leverenzymmer i blodet)
- bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige muskelbevægelser)
- smertefuld rejsning (priapisme)
- blødningsforstyrrelser herunder blødninger i hud og slimhinder (ekchymose) og nedsat antal blodplader (trombocytopeni)
- pludselige hævelser i hud og slimhinder (Quinckes ødem)
- stigning i urinmængden ved vandladning (uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon)
- mælkeflåd hos kvinder, der ikke ammer
- mani
- ændring af hjerterytmen (kaldet "forlænget QT-interval", som kan ses på et elektrokardiogram (EKG) – hjertets elektriske aktivitet).

Tanker om at skade sig selv eller tage sit eget liv (der er indberettet tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd under behandling med escitalopram eller ved tidligt behandlingsstop). (Se også afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler").

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Endvidere er der kendskab til en række bivirkninger af lægemidler, der virker på tilsvarende måde som escitalopram (det aktive indholdsstof i Escitalopram ratiopharm). Det drejer sig om:

- Motorisk uro (akatisi)
- Manglende appetit.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten eller æsken. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Escitalopram ratiopharm filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Escitalopram. 1 Escitalopram ratiopharm filmovertrukket tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som escitalopramoxalat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), croscarmellosenatrium (E 468), kolloid vandfri silica, magnesiumstearat (E 470b).

Filmovertræk: hypromellose (E 464), titandioxid (E 171) og macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Escitalopram ratiopharm fås som 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter. Tabletterne beskrives nedenfor:

Escitalopram ratiopharm 5 mg er runde, hvide filmovertrukne tabletter

Escitalopram ratiopharm 10 mg er ovale (ca. 8,1 x 5,6 mm), hvide filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. Tabletterne kan deles i to lige store dele.

Escitalopram ratiopharm 15 mg er ovale (ca. 10,4 x 5,6 mm), hvide filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge.

Escitalopram ratiopharm 20 mg er ovale (ca. 11,6 x 7,1 mm), hvide filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. Tabletterne kan deles i to lige store dele.

Escitalopram ratiopharm fås i følgende pakningsstørrelser:

14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 500 tabletter (blisterpakninger)

30 x 1, 49 x 1, 100 x 1 tablets (blisterpakning med enkeltdosis)

HDPE tabletkholder med

Escitalopram ratiopharm 5/15/20 mg filmovertrukne tabletter: 100 tabletter

Escitalopram ratiopharm 10 mg filmovertrukne tabletter: 100, 200 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D89079 Ulm, Tyskland

Fremstiller:

Merckle GmbH, Ludvig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 3680 Martin, Slovakiet

Dette lægemiddel er godkendt i EEA's medlemslande under følgende navne:

Danmark:	Escitalopram ratiopharm
Estland:	Escitalopram-ratiopharm 10/20 mg
Finland:	Esciratio 5/10/15/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Norge:	Escitalopram ratiopharm 5/10/15/20 mg tablet, filmdrasjert
Portugal:	Escitalopram ratiopharm
Slovakiet:	Escitalopram ratiopharm 5/10/15/20 mg
Spanien:	Escitalopram ratiopharm 5/10/15/20 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Ungarn:	Escitralix 5/10/15/20 mg filmtabletta
Østrig:	Escitalobene 5/10/15/20 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2013.