

Laktulose "PS", oral opløsning 667 mg/ml

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen.

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

1. Virkning og anvendelse:

Laktulose "PS", oral opløsning er en klar, farveløs til svagt gulligbrun væske. Laktulose "PS" binder vand i tarmen og blødgør afføringen. Du kan bruge Laktulose "PS" mod kronisk forstoppelse. Du kan også bruge Laktulose "PS" til at forebygge og behandle hjernesvækkelse ved leversvigt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, inden du tager Laktulose "PS"

Tag ikke Laktulose "PS" hvis:

- Tarmen er blokeret (ved svulst eller betændelse).
- Du har blindtarmsbetændelse.
- Du er overfølsom over for galactose.
- Du er overfølsom over for lactulose.

Særlige forholdsregler

Du må ikke tage Laktulose "PS" dagligt i længere tid, da Laktulose "PS" kan virke vanedannende og svække tarmfunktionen.

Tal med lægen, hvis du har brug for afføringsmiddel hver dag, så årsagen til forstoppelsen kan blive undersøgt.

Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Laktulose "PS" daglig, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Brug af Laktulose "PS" sammen med mad og drikkevarer:

Du kan tage Laktulose "PS" uafhængigt af måltiderne.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du kan tage Laktulose "PS" under graviditet

Amning: Du kan amme, selv om du tager Laktulose "PS".

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen hvis du tager vanddrivende midler, digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B.

3. Sådan skal du tage Laktulose "PS"

• Dosering

Mod forstoppelse:

Voksne og børn over 14 år: Du begynder med at tage 15-30 ml daglig.

Når Laktulose "PS" virker, kan du nøjes med den halve dosis. Hvis Laktulose "PS" ikke virker efter 3 dage, kan du fordoble dosis. Tal med din læge, hvis det ikke hjælper.

Du skal tage en dosis, så din afføring bliver halvfast.

Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt

Akut behandling: Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer daglig. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange daglig.

Kronisk behandling: Du begynder med at tage 30-45 ml 3-4 gange daglig. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer daglig.

Børn

Mod forstoppelse:

Børn under 5 måneder: 3-6 ml daglig fordelt på 2 doser.

Børn 5-12 måneder: 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser.

Børn 1-14 år: 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser.

Barnet skal have Laktulose "PS", indtil afføringen er blevet normal. Det sker normalt i løbet af 7-10 dage. Derefter skal barnet have mindre og mindre doser de følgende uger og behandlingen stoppe.

Du må ikke bruge Laktulose "PS" til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Har du taget for meget Laktulose "PS"?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Laktulose "PS", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Lactulose "PS", kan du få diaré og tab af vand og salte.

4. Bivirkninger

Laktulose "PS" kan som al anden medicin give bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger:

- **Meget almindelige bivirkninger** (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen.
- **Almindelige bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).
Kvalme, opkastning og diaré ved høje doser.

Hvis du igennem lang tid tager Lactulose "PS", og du har tynd afføring, kan du miste vand og salte.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller på apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

Opbevar Laktulose "PS" utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Laktulose "PS" ved over 25 °C.

Anvend ikke Laktulose "PS" efter den udløbsdato, som står på flasken.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Laktulose "PS", oral opløsning 667 mg/ml indeholder:

Det aktive stof er lactulose.

Derudover indeholder Lactulose "PS" rensset vand.

Markedsføring i Danmark

Pharma-Skan

Adelgade 27

8660 Skanderborg.

Revideret november 2005.