

APPROUVÉ
Par A. GAZEAU , 16:37, 07/02/2011

Vnr 06 70 34



AKTIVT INDHOLD

1 ml indeholder:
101,2 mg Tiamulin svarende til 125 mg Tiamulin hydrogenfumarat
15 mg benzylalkohol
Klar, farveløs til lysegul opløsning.

INDIKATIONER

Kyllinger og kalkuner:
Behandling og forebyggelse af kroniske respirationsvejslidelser; forårsaget af tiamulinfølsomme stammer: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis.
Svin:

Behandling af smitsom lungebetændelse forårsaget af tiamulinfølsomme stammer : Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis.
Behandling af blodig tarmbetændelse forårsaget af eller kompliceret af tiamulinfølsomme stammer: Brachyspira hyodysenteriae.

KONTRAINDIKATIONER

Præparatet må ikke anvendes sammen med monensin, salinomycin og narasin eller andre monovalente ionophor antibiotika

7 dage før; under og 7 dage efter behandling af dyr.
BIVIRKNINGER

I sjældne tilfælde er der efter oral behandling observeret overfølsomhed overfor tiamulin, bestående af akut hudbetændelse med rødme og intens kløe. Bivirkningerne er oftest milde og forbigående, men kan i sjældne tilfælde være alvorlige. Hvis denne type bivirkninger iagttages, stoppes behandlingen omgående og både dyrene og stien vaskes med vand.

Normalt vil dyrene herefter hurtigt bedres. Symptomatisk behandling som f.eks. elektrolyt behandling og antiinflammatorisk behandling kan være gavnlige. Hvis der iagttages alvorlige bivirkninger, skal den ordinerende dyrlæge orienteres.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

DYREARTER: Kyllinger, kalkuner og svin.

DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE

Oral anvendelse.

Kyllinger og kalkuner: 20 mg tiamulinbase pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 24,7 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg legemsvægt/dag), ved oral indgivelse via drikkevand, svarende til 19,75 ml opløsning pr. 100 kg legemsvægt pr. dag i 3-5 dage, afhængig af graden af sygdom.

Svin: 6,48-8,1 mg tiamulinbase pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 8 til 10 mg tiamulinhydrogenfumarat/kg legemsvægt/dag), i 5 dage ved oral indgivelse via drikkevand, svarende til 6,40 til 8 ml opløsning pr. 100 kg legemsvægt pr. dag i 5 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

TILBAGEHOLDESESTID

Slagtning:

Svin: 6 dage

Kyllinger: 6 dage

Kalkuner: 6 dage

Æg: 0 dage

SÆRLIGE

OPBEVARINGSFORHOLD

Ubrugt produkt kasseres 3 måneder efter anbrud.
Ubrugt produkt kasseres 24 timer efter fortynding i drikkevand.

Veterinærlægemidlet bør ikke anvendes efter den angivne udløbsdato.

Ingen særlige opbevaringsforhold.

Opbevares utilgængeligt for børn.

SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvendelse af produktet bør baseres på resistensundersøgelse.

Strategisk behandling bør begrænses til dyr i

5 liter



TIAMVET 125 MG 5 L DK
DANMARK
ETIQUETTE : 5 L
CODE ARTICLE : 51751/02
FORMAT/TYPE 150 x 370
STD : 150 x 370 B2B

2 COULEURS PANTONE
PANTONE BLACK C
PANTONE 205 C

CORP : 7,7

DAVID 24/01/11 - 28/01/11 - 07/02/11

besætninger; hvor tiamulinfølsomme patogener er isoleret. Længerevarende eller gentagen anvendelse bør undgås via forbedring af management samt grundig rengøring og desinfektion. Anvendelsen af dette præparat til drægtige eller diegivende søer er ikke undersøgt. Bør kun anvendes i overensstemmelse med den ordinerende dyrlæges vurdering.

Uforlidelighed med bestemte ionophor antibiotika (se Kontraindikationer) kan forekomme. Symptomer på forgiftning, som f.eks. vækstnedsættelse, paralysse og død er mulige ved samtidig administrering.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af kontakt, vask grundigt med vand og søg om nødvendigt læge.

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

ØVRIGE INFORMATIONER

Information til dyrlægen

Farmakologiske egenskaber.

Tiamulin er et semisyntetisk derivat af et antibiotikum tilhørende klassen af pleuromutiliner. Tiamulin er et bakteriostatisk antibiotikum og virker ved at inhibere proteinsyntesen ved reversibel binding til 50S ribosom subunit.

Tiamulin er aktivt over for Brachyspira (Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli), Mycoplasma (Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma Gallisepticum, Mycoplasma synoviae), Lawsonia intracellularis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Clostridium perfringens.

Resistensmekanismen er kromosomal. Udvikling af resistens sker langsomt og progressivt. Der er ingen krydsresistens til makrolider eller relaterede substanser.

MT nr. 39138

Til dyr - kræver recept.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE:

Ceva Animal Health A/S -

Ladegaardsvej 2 - 7100 Vejle - Danmark

FREMSTILLER:

Ceva Santé Animale - ZI Très le Bois

22600 Loudéac - Frankrig



7 046260 670341

51751/02

Batchnummer:

Udløbsdato: