

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hyderm 1% creme

hydrocortison

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette legemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hyderm
3. Sådan skal du bruge Hyderm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Hyderm creme er en hvid, mild hydrocortisoncreme (svagt steroid), der hæmmer betændelsestilstande i huden og virker kløestillende. Den kan bruges til behandling af let eksem, såsom kontakteksem, insektbid og soleksem. Cremen kan også bruges til behandling af væskende hudområder. Efter aftale med lægen kan den anvendes til at lindre kløe ved endetarmsåbningen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE HYDERM

Brug ikke Hyderm

- hvis du er allergisk over for hydrocortison eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hyderm (angivet i afsnit 6)..

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Hyderm.

Hyderm bør ikke påføres åbne sår eller omkring øjnene. Kortikosteroider bør ikke anvendes til behandling af betændelse i huden omkring munden, rosacea (kronisk acnelignende sygdom) og acne. Hvis du har betændelse i huden, må du anvende Hyderm hvis betændelsen behandles samtidigt. Rådfør dig med lægen, som kan anviser en mere hensigtsmæssig behandling.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Der er ingen kendte risici ved brug under graviditet.

Hydrocortison bliver udskilt i modermælken, men hvis det bruges efter den angivne dosering, er det usandsynligt, at det vil påvirke barnet. Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du bruger Hyderm mere end lejlighedsvis, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hyderm påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Hyderm indeholder cetostearylalkohol

Cetostarylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE HYDERM

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Cremen skal påføres i tyndt lag morgen og aften eller efter lægens anvisning. Efter få dage kan antallet af påføringer nedsættes, og Hyderm kan bruges skiftevis med en fugtighedscreme uden hydrocortison.

Cremen bør ikke anvendes i mere end 4-6 uger, medmindre lægen har foreskrevet det.

Brug til børn

Børn under 2 år må kun behandles med Hyderm, hvis lægen har foreskrevet det.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere): *Hud og subkutane væv*: Kontakteksem (hydrocortison) med tiltagende kløe, rødme og irritation.

Ikke kendt (*kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data*): *Øjne*: Sløret syn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Hyderm utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25° C

Brug ikke Hyderm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hyderm indeholder:

- Aktivt stof: hydrocortison
- Øvrige indholdsstoffer: hvid vaseline, hydreret rapsolie, isopropylisostearat, myristyl-myristat, glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, macrogolstearat 100, vandfri citronsyre, natriumcitrat, butylenglycol og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Hvid creme

Pakningsstørrelser: 30 g i plasttube med skruelåg, 100 g i plasttube med snap-on låg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige

Fremstiller:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017