

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Serevent® 50 mikrogram/dosis, inhalationspulver afdelt i Diskos®

Salmeterol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Serevent® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Serevent®.
3. Sådan skal De bruge Serevent®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Serevent® inhalationspulver indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og herved ophæver forsnævringen i bronkierne. Denne optræder pludseligt i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

De kan bruge Serevent® til

- Forebyggelse af astma, herunder natlig astma, som tillægsbehandling, hvor tilstrækkelig kontrol ikke opnås med inhalationssteroider.
- Forebyggelse af anstrengelsesudløst astma.
- Behandling af rygerlunger (KOL).

Det er vigtigt at De bruger Deres medicin hver dag. De skal bruge Serevent® morgen og aften – også når De ikke har symptomer.

Lægen kan have givet Dem Serevent® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Serevent® Brug ikke Serevent®

- Hvis De er overfølsom (allergisk) over for salmeterol eller lactose.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Serevent®

Serevent® er en forebyggende behandling og virker ikke på pludselige anfald af åndenød. Mod dette skal De bruge Deres korttidsvirkende anfaldsmedicin, som De altid bør have på Dem.

Hvis De får Serevent® for Deres astma, er det vigtigt at fortsætte med den astmamedicin, De får i forvejen, især binyrebarkhormon (som inhalation eller tabletter). De skal fortsætte med medicinen, nøjagtigt som De plejer, med mindre Deres læge siger noget andet, og selvom De har fået det bedre. **Hold ikke op med at bruge Deres medicin med binyrebarkhormon, når De begynder at bruge Serevent®.**

Gå jævnlige til lægen, så De får Serevent® i den dosis, der passer til sværhedsgraden af Deres astma. De skal helst ikke have anfald eller vågne om natten af Deres astma. Tal med lægen, hvis De bruger mere anfaldsmedicin end De plejer. De bør kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med Deres læge.

Hvis De samtidig lider af diabetes, forhøjet stofskifte (Basedow) eller utilstrækkelig hjertefunktion bør Serevent® tages med forsigtighed.

Hvis De har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis De samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin eller binyrebarkhormoner.

Serevent® bør ikke anvendes som førstevalgsbehandling ved astma, og behandlingen bør ikke påbegyndes under akut svær forværring af Deres astma.

Ved pludselig og tiltagende forværring af Deres astma eller ved opståen af alvorlige bivirkninger, skal De fortsætte behandlingen, og hurtigst muligt kontakte Deres læge, da behandlingen muligvis skal ændres. De kan eventuelt dagligt måle peak-flow.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Serevent®. Det kan påvirke prøveresultaterne. Hvis De er af afrikansk eller afrocaribisk oprindelse har De større risiko for alvorlige vejrtrækningsrelaterede hændelser.

Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Serevent®. Tue skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

De kan bruge Serevent® sammen med anden medicin, men tal først med lægen hvis De er i behandling med:

- Medicin mod hjerte-karsygdomme, herunder grøn stær (betablokkere).
- Anden medicin mod astma (xantinderivater).
- Binyrebarkhormoner (kortikosteroider).
- Vanddrivende medicin.
- Medicin mod svamp (itraconazol, ketoconazol).
- Antibiotika (telithromycin).
- Medicin mod HIV (ritonavir).

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun bruge Serevent® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun bruge Serevent® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Serevent® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Serevent®

Serevent® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Serevent®

Brug altid Serevent® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Serevent® er kun til inhalation. Serevent® virker efter 10-20 minutter og i mindst 12 timer.

De må først gøre doserne klar, lige før De skal bruge dem.

Astma

Voksne og unge fra 12 år:

1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig. Ved mere alvorlig astma kan lægen ordinere, 2 sug (100 mikrogram) 2 gange daglig.

Børn over 4 år:

1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig.

Børn under 4 år:

Serevent® bør ikke anvendes til børn under 4 år.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Voksne:

1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig.

Ældre:

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har brugt for meget Serevent®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Serevent® inhalationspulver, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer: Rysten, hovedpine, hurtig puls og lavt kalium i blodet.

Hvis De har glemt at bruge Serevent®

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Serevent®

Kontakt lægen, hvis De ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Serevent[®].

Kontakt straks lægen, hvis Deres symptomer ændrer sig, efter behandlingen med Serevent[®] er stoppet.

4. Bivirkninger

Serevent[®] kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Kortåndethed/Vejtrækningsbesvær/Astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Arterieflimmer

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hjertebanken.
- Hovedpine.
- Rysten.
- Muskelkrampe.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Allergiske reaktioner, f. eks. udslæt (kløe og rødme).
- Nervøsitet.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Svimmelhed.
- Søvnløshed/søvnforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglucose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Ekstra hjerteslag.
- Kvalme.
- Svælgirritation.
- Smerte i leddene.
- Uspecifikke brystsmerte.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Serevent[®] utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Serevent[®] ved temperaturer over 25° C.
- Tag ikke Serevent[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Serevent[®], 50 mikrogram/dosis, inhalationspulver indeholder:

Aktivt stof: Salmeterolxinafoat svarende til salmeterol

50 mikrogram/dosis

Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat.

Pakningsstørrelse:

Serevent[®] 50 mikrogram/dosis findes i en pakningsstørrelse 60 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

SinGad Pharma ApS, Vibe Allé 5 blok 2B, 2980 Kokkedal

Ompakket og frigivet af

SinGad Pharma ApS, Vibe Allé 5 blok 2B, 2980 Kokkedal


Serevent[®] er et registreret varemærke, der tilhører GlaxoSmithKline Plc koncernen.

Brugsanvisning:

- Få lægen, sygeplejersken eller apoteket til at vise Dem, hvordan De skal bruge Diskos[®]. De bør jævnligt tjekke, at De bruger den korrekte. Hvis De ikke bruger Diskos[®] rigtigt eller ikke følger lægens anvisning, kan det bevirke, at medicinen ikke hjælper, som den skal.
- Diskos[®] indeholder et folieblisterbånd med Serevent[®] inhalationspulver.
- Diskos[®] er med dosistæller, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dem om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskos[®] tom.

Sådan bruger De Diskos[®]:

1. Sådan åbner De Diskos[®]: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på fingergrebet. Skub fingergrebet helt i bund – til det siger klik. Så er mundstykket åbnet.



2. Hold Diskos[®] med mundstykket ind imod Dem. De kan holde den i enten højre eller venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund – til det siger klik.

Nu er der frigjort en dosis i mundstykket.

Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når De skal have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan gå tabt.




3. Hold Diskos[®] væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos[®].

4. Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og dybt som muligt gennem munden – ikke gennem næsen.


Tag Diskos[®] væk fra munden.

Hold vejret i ca. 10 sekunder. Pust langsomt ud.



5. Sådan lukker De Diskos[®]: skub fingergrebet tilbage mod Dem selv, så langt som muligt – indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.

Diskos[®] er nu klar til brug igen.



Rengøring af Diskos[®]:

Tør mundstykket af med en tør klud.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2011

Se også den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk