

ELOCOM®, CREME, 0,1 %

mometasonfuroat

Receptpligtig medicin:

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Elocom® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom®
3. Sådan skal du bruge Elocom®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse.

Elocom® indeholder et stærkt binyrebarkhormon. Elocom® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis. Du kan bruge Elocom® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocom® creme

Brug ikke Elocom® hvis:

- du er overfølsom overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Elocom® creme.
- du har betændelse i huden, som skyldes parasit- og svampeinfektion (f.eks. candida eller dermatofyter), bakterieinfektion (f.eks. børnesår eller en hudlidelse med dannelse af pus i huden).
- hvis du har tuberkulose eller syfilis

Brug ikke Elocom® mod:

- en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, hagen, kinderne og i panden (rosacea).
- betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- bumser eller områder med bumser.
- områder med tynd hud, der let går i stykker/skør hud.
- kløe ved endetarmen eller kønsdele.
- friktionsudslæt
- sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssår, skoldkopper, vorter, kønsvorter eller en sjælden hudsygdom med gullige hårde svulster.)
- hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller ble-eksem.
- på hudreaktion efter vaccination.
- På sår eller hud fyldt med sår

Særlige forholdsregler

- behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
- du bør ikke bruge hormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigtet, hvor brugen skal begrænses til 5 dage ad gangen, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Elocom®creme skal anvendes med forsigtighed til børn fra 2 år og ikke længere end 3 uger, uden aftale med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Elocom®creme anbefales ikke til børn under 2 år.
- langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- du bør ikke bruge Elocom® rundt om øjnene herunder øjenlåg, pga. meget sjælden risiko for synstab eller grå stær.
- undgå at få Elocom® i øjnene.
- hvis du har brugt Elocom® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Elocom® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Elocom® creme, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elocom® creme.
- Elocom®creme anbefales ikke til behandling af psoriasis pga. mulighed for forværring af sygdom, udvikling af tolerance, risiko for udvikling af en bestemt type psoriasis, med pus holdige blærer, samt mulighed for allergi.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Elocom® sammen med anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Elocom® efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer må du kun bruge Elocom® creme efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Elocom® på brystet, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elocom®creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Elocom® creme.

Elocom® creme indeholder propylenglycolmonopalmitostearat, der kan give irritation af huden.

Elocom® creme indeholder stearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Elocom®

Den sædvanlige dosering er:

Voksne

Påsmør Elocom® i et tyndt lag én gang dagligt.

Børn:

Du må kun bruge Elocom® til børn efter lægens anvisning.

Når du har fået den ønskede virkning af Elocom® creme, bør du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring. Undgå at få Elocom® creme i øjnene.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Elocom® creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Elocom® creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag emballagen med.

Symptomer:

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Elocom®

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Smør et tyndt lag Elocom® creme på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

Hvis du holder op med at tage Elocom®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Elocom®.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Elocom® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig brug, samt ved brug af lufttæt forbindelse.

Alvorlige bivirkninger ved brug af Elocom® creme.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.

Kontakt lægen.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Elocom® creme.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.
- Betændelse i det behandlede område.
- betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder, pande og hage (steoridrosacea)
- Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.

Sjældne bivirkninger (det forekommer mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigtet, på krop samt arme og ben.
- overfølsomhed over for det aktive stof i Elocom® creme

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- prikken/svien, kløe.
- betændelse i hårsække

Hyppighed er ikke kendt:

- udvidelse af de små blodkar i huden.
- rødmen af huden.
- udslæt med bumser
- sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden og bylder.
- kontakteksem
- hypopigmentering (lokal afblegning af huden)
- prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
- Smerte eller reaktion fra det behandlede område.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Elocom® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elocom® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Elocom® creme, 0,1 % indeholder

Aktiv stof: mometasonfuroat 1 mg/g

Øvrige indholdsstoffer: hexylenglycol, propylenglycolmonostearat, stearylalkohol og cetareth-20, titandioxid (E171), aluminiumstivelseoctenylsuccinat, hvid voks, hvid vaseline, fosforsyre og rensed vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Elocom® er en hvid/råhvid creme.

Elocom® creme fås i pakningsstørrelserne 30 og 60 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark

Pharmason ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Ompakket og frigivet af

Pharmason ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg