



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

7878030336

Emconcor® 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter



bisoprololhemifumerat

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen, du får måske brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide.
- Lægen har ordineret Emconcor til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægsseddel.

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide før du begynder at tage Emconcor.
3. Sådan skal du tage Emconcor.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Emconcor er medicin af typen betablokkere. Du kan bruge Emconcor til behandling af:

- Forhøjet blodtryk.
- Hjertekramper (angina pectoris).

Lægen kan have givet dig Emconcor for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE EMCONCOR

Tag ikke Emconcor hvis:

- Du er overfølsom over for bisoprololhemifumarat, anden medicin af samme type (betablokkere) eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt.6).
- Du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb.
- Du har uregelmæssig eller langsom puls.
- Du har lavt blodtryk.
- Du lider af alvorlig astma eller alvorlig KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
- Du har nedsat blodomløb, som giver "hvide" eller "døde" fingre eller tæer.
- Du har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom).

Vær ekstra forsigtig med at tage Emconcor.

Du må ikke selv stoppe behandling med Emconcor pludseligt. Du skal stoppe behandlingen ved gradvist at nedsætte dosis i samråd med din læge.

Fortæl altid lægen, at du tager Emconcor, hvis du skal bedøves, eller du skal have indsprøjet kontrastmiddel ved røntgenundersøgelse.

Tal med din læge hvis:

- Du har svær hjertesygdom.
- Du har diabetes. Emconcor kan skjule og forlænge symptomerne på for lavt blodglukose (hypoglykæmi).
- Du har kolde hænder og fødder og snurren i fingre og tæer (Raynauds syndrom).
- Du har smerter i benene, når du går, på grund af åreforkalkning (Claudicatio intermittens).
- Du lider af en stofskiftesygdom (tyrotoksikose).
- Du lider af astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
- Du har en alvorlig leversygdom.
- Du faster.
- Du lider af voldsom allergi eller har haft en alvorlig allergisk reaktion.
- Du lider af ustabile tilfælde af hjertekramper (Printzmetals Angina).
- Du har eller har haft psoriasis, eller du har familiemedlemmer, som har psoriasis.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du tager Emconcor. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, stærke vitaminer og mineraler, naturlægemidler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- Alzheimers sygdom
- forhøjet tryk i øjet, grøn stær
- diabetes. Emconcor kan skjule og forlænge symptomerne på for lavt blodglukose (hypoglykæmi).
- depression og psykoser (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere)
- malaria (meflochin)
- gigtt eller smerter (smertestillende medicin af typen NSAID)
- epilepsi (phenobarbital)
- voldsomme allergiske reaktioner (Epi-pen med adrenalin).

Hvis du tager anden medicin mod for højt blodtryk eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og kredsløb (verapamil, diltiazem, methyl-dopa, quinidin, clonidin, lidocain, phenytoin, flecainid, propafenon, amiodaron, visse calciumantagonister, andre betablokkere – også øjendråber) kan det være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug af Emconcor sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Emconcor sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid skal du normalt ikke tage Emconcor. Tal med lægen.

Amning:

Du må ikke tage Emconcor, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emconcor kan hos enkelte give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og enden til at færdes sikkert i trafikken. Det gælder især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis eller ændring af medicinering.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE EMCONCOR

Dosering

Du skal tage tabletterne sammen med en rigelig mængde vand (1½ dl). Du må ikke tygge eller knuse tabletterne. Du bør tage tabletterne om morgenen.

Den sædvanlige dosis er 10 mg én gang dagligt. Maksimal daglig dosis er 20 mg.

Voksne:

Emconcor 5 mg: 1-4 tabletter (5-20 mg) 1 gang dagligt.

Emconcor 10 mg: ½ - 2 tabletter (5-20 mg) 1 gang dagligt.

Ældre:

Dosisjustering er normalt ikke nødvendigt, det anbefales at begynde med lavest mulige dosis.

Børn:

Der er ingen erfaring med at give Emconcor til børn, hvorfor det ikke anbefales til børn.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Tag altid Emconcor nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Har du taget for mange Emconcor?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Emconcor, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

- Langsom puls.
- Svimmelhed på grund af lavt blodtryk.





- Mathed, koldsved, sult, forvirring på grund af lavt blodsukker.
- Vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Har du glemt at tage Emconcor?

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt behandlingen som anvist af lægen.

Hvis du holder op med at tage Emconcor

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Emconcor.

4. BIVIRKNINGER

Emconcor kan som al anden medicin give bivirkninger selvom ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Forværring af hjerteproblemer (åndenød ved anstrengelse evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte). Meget langsom, evt. uregelmæssig puls, tendens til besvimelse. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Astmaanfald hos patienter med astma, bronkitis eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svimmelhed, hovedpine, træthed, (især i starten af behandlingen, forsvinder oftest inden for 1-2 uger).
- Kuldefølelse eller følelseløshed i lemmer.
- Lavt blodtryk.
- Kvalme, opkastninger, diaré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Søvnforstyrrelser.
- Svimmelhed, når du rejser dig op.
- Muskelsvaghed, kramper, udmattelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Måreidt.
- Nedsat tåreflåd (kan være et problem, hvis du bruger kontaktlinser).
- Nedsat hørelse.
- Allergisk snue.
- Overfølsomhedsreaktioner: Kløe, rødme, udslæt.
- Potensforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Øjenbetændelse.
- Hårtab.
- Psoriasis eller psoriasislignende udslæt. Forværring af psoriasis.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Emconcor utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Emconcor ved over 30° C.

Brug ikke Emconcor efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Emconcor 5 mg og 10 mg filmovertukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: bisoprololhemifumarat.

Øvrige indholdsstoffer: MikrokrySTALLINSK cellulose, vandfri kolloid silica, majsstivelse, magnesiumstearat, crospovidon, vandfri calciumhydrogenphosphat.

Filmovertæk: Macrogol 400, titandioxid (E171), gult jernoxid (E172), hypromellose, dimeticon. 10 mg tabletterne indeholder desuden: Rødt jernoxid (E172).

Produktets udseende og pakningsstørrelse

Emconcor 5 mg: Lysegule, hjerteformede, filmovertukne tabletter med delekærv.

Emconcor 10 mg: Let orange, hjerteformede, filmovertukne tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelser:

5 mg: 30, 100 tabletter.

10 mg: 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstilleren

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Tyskland

Repræsentant:

Merck A/S, Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup

Fremstilleren:

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Tyskland

Denne indlægsseddel er sidst revideret september 2010



7878030336

